

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่อง ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระยะ
ตั้งครรภ์ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยในลักษณะตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน
คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 1

ตอนที่ 2 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านร่างกายกับระดับ
การศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส ระดับเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 2 - 6

ตอนที่ 3 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์
กับระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับเศรษฐกิจ
ของกลุ่มตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 7 - 11

ตอนที่ 4 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านสังคมกับระดับการ
ศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 12 - 16

ตอนที่ 5 คำร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านคำแนะนำกับระดับ
การศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 17 - 21

ตอนที่ 6 อาการนิฟกติในระยะตั้งครรภ์ และความต้องการคำแนะนำเมื่อมีอาการ
นิฟกติเกิดขึ้นของกลุ่มตัวอย่าง เสนอไว้ในตารางที่ 22

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไป

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุ (ปี)		
15	5	3.3
16	10	6.7
17	30	20.0
18	36	24.0
19	69	26.0
รวม	150	100.0
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	6	4.0
ประถมศึกษา	103	68.7
มัธยมศึกษา	27	18.0
อาชีวศึกษา	14	9.3
อุดมศึกษา	0	0.0
รวม	150	100.0
ลักษณะครอบครัว		
ครอบครัวขยาย	89	59.3
ครอบครัวเดี่ยว	61	40.7
รวม	150	100.0
สถานภาพการยอมรับการสมรส		
ตั้งครรถ์ในสมรส	126	82.7
ตั้งครรถ์นอกสมรส	24	17.3
รวม	150	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อาชีพของสามี		
รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ	19	12.7
ค้าขาย	22	14.7
รับจ้าง	95	63.3
เกษตรกรรม	2	1.3
ไม่ได้ทำงาน	12	8.0
รวม	150	100.0
อาชีพของภรรยา		
รับราชการ	1	0.7
ค้าขาย	11	7.3
รับจ้าง	27	18.0
แม่บ้าน	106	70.7
เกษตรกรรม	2	1.3
อื่น ๆ (นักเรียน)	3	2.0
รวม	150	100.0
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)		
ต่ำกว่า 2,000	50	33.3
2,000 - 5,000	86	57.3
สูงกว่า 5,000	14	9.3
รวม	150	100.0
สภาพการตั้งครุภคครั้งนี้		
ตั้งครุภคโดยบังเอิญ	72	48.0
ต้องการที่จะมีบุตร	78	52.0
รวม	150	100.0

จากตารางที่ 1 ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยรุ่นตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.0 ใ้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.7 ส่วนระดับอุดมศึกษาไม่มีเลย ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวขยายร้อยละ 59.3 อาชีพของสามีของวัยรุ่นตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 63.3 ส่วนวัยรุ่นตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 70.7 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.3 และการตั้งครรภ์ครั้งนี้ จำนวนวัยรุ่นที่ต้องการมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 52.0 และที่ตั้งครรภ์โดยบังเอิญ คิดเป็นร้อยละ 48.0



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดำรงกายกับระดับการศึกษา
ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับเศรษฐกิจฐานะ

ตารางที่ 2 คำร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการการดำรงกาย

ความต้องการการดำรงกาย	ร้อยละของผู้ต้องการ N = 150
1. ให้อุปการะเหมือนเดิมภายหลังคลอด	94.0
2. ทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า	90.7
3. ทำได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาช่วย	90.0
4. คลอดได้เองโดยธรรมชาติ	88.7
5. คีมน้ำนม	84.0
6. ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย	81.3
7. นอนพักกลางวัน	80.7
8. รับประทานอาหารรสจืด เช่น เผือกจืด เค็มจืด เป็รียวจืด	76.0
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรก ของการตั้งครรภ์	72.7
10. อ่านหนังสือ และ/หรือ ฟังเพลงอยู่ในบ้าน	71.3
11. รับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ไขมัน นม	68.0
12. ชมภาพยนตร์และ/หรือ ทีวี	65.3
13. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 4 - 6 เดือน ของการตั้งครรภ์	62.0
14. อาศัยอยู่กับสามีตามลำพัง	61.3
15. กินแต่น้ำ - ข้าว	54.7
16. คีมน้ำหวาน หรือ น้ำอัดลม	50.0
17. อาศัยรวมอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติ	40.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ความต้องการด้านร่างกาย	ร้อยละของผู้ตอบการ N = 150
18. ท้องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ	29.3
19. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 7 - 9 เดือน ของการตั้งครรภ์	22.7
20. ซ้อมรับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย	16.7
21. รับประทานยาระบายเป็นบางครั้ง	11.3
21. ให้แพทย์ช่วยโดยการผ่าตัดเล็กออกทางหน้าท้อง หรือ ใช้เครื่องมือเล็ก หรือดึงเล็กออกมา	11.3
23. กิมของมีนเมา เช่น สุรา เบียร์	8.7
24. รับประทานอาหารที่แปลกไปจากเคยรับประทาน เช่น กินเผาะ ข้าวสาร กินสอพอง	8.0
25. วิ่งอยู่กับที่	6.0
26. อื่น ๆ (ระบุ) ให้บุตรในครรภ์แข็งแรง ให้บุตรในครรภ์ปลอดภัย	1.3

จากตารางที่ 2 ความต้องการด้านร่างกายที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากกว่าร้อยละ 50 เรียงตามลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้ ต้องการให้รูปร่างเหมือนเดิมภายหลังคลอดบุตร ร้อยละ 94.0 ต้องการทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า ร้อยละ 90.7 ต้องการถ่ายได้เองโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือ ร้อยละ 90.0 ต้องการคลอดได้เองโดยธรรมชาติ ร้อยละ 88.7 ต้องการกินน้ำธรรมดา ร้อยละ 84.0 ต้องการปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 81.3 ต้องการนอนพักกลางวัน ร้อยละ 80.7 ต้องการรับประทานอาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด ร้อยละ 76.0 ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับสามี

ในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ร้อยละ 72.7 ต้องการอ่านหนังสือและ/หรือ
 ฟังเพลงอยู่ในบ้าน ร้อยละ 71.3 ต้องการรับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์
 ผัก ไขมัน นม ร้อยละ 68.0 ต้องการชมภาพยนตร์และ/หรือ โทรทัศน์ ร้อยละ 65.3 ต้องการ
 มีเพศสัมพันธ์กับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์ ร้อยละ 62.0 ต้องการอาศัย
 อยู่กับสามีตามลำพัง ร้อยละ 61.3 และต้องการกินเล่นเช้า - เย็น ร้อยละ 54.7



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านร่างกายกับระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้รูปร่างเหมือนเดิมภายหลังคลอด	5.24	0.16
2. ทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า	3.44	0.32
3. ทำได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาช่วย	0.68	0.88
4. คลอดได้เองโดยธรรมชาติ	2.07	0.56
5. กินน้ำธรรมดา	2.22	0.53
6. ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย	1.34	0.72
7. นอนพักกลางวัน	5.06	0.16
8. รับประทานอาหารสุกๆ เช่น เนื้อสุก เปรี้ยวสุก เค็มสุก	4.62	0.20
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์	10.48	0.01*
10. อ่านหนังสือและ/หรือฟังเพลงอยู่ในบ้าน	11.31	0.01*
11. รับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ไขมัน นม	5.23	0.15
12. ชมภาพยนตร์และ/หรือ โทรทัศน์	0.10	0.99
13. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์	8.10	0.04*
14. อาศัยอยู่กับสามีตามลำพัง	2.06	0.56
15. กินเล่นเช้า - เย็น	3.36	0.34
16. กินน้ำหวาน หรือ น้ำอัดลม	1.93	0.58
17. อาศัยรวมอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติ	1.95	0.58

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ความต้องการด้านร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
18. ท้องเที้ยวพักผ่อนหย่อนใจ	14.21	0.002*
19. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 7 - 9 เดือนของการตั้งครรภ์	0.84	0.84
20. ซ้อมารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย	0.89	0.82
21. รับประทานยาระบายเป็นบางครั้ง	2.50	0.48
22. ให้แพทย์ช่วยโดยการผ่าตัดเล็กออกทางหน้าท้อง หรือใช้เครื่องมือดึง หรือดูดเล็กออก	2.07	0.56
23. คืมของมีนเมา เช่น สุรา เบียร์	6.42	0.09
24. รับประทานอาหารที่แปลกไปจากเคยรับประทาน เช่น กินเผาะ ข้าวสาร กินสอพอง	1.38	0.71
25. ว่างอยู่กับที่	2.53	0.46
26. อื่น ๆ (ระบุ) ให้บุตรในครรภ์แข็งแรง ให้บุตรในครรภ์ปลอดภัย	4.14	0.24

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 3 \quad \chi^2_{(3)} = 7.81$

จากตารางที่ 3 ปรากฏว่าความต้องการด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาซึ่งแบ่งเป็น ไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ "ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์" "ต้องการอ่านหนังสือและ/หรือฟังเพลงอยู่ในบ้าน" "ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์" "ต้องการท้องเที้ยวพักผ่อนหย่อนใจ" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้นร่างกายกับลักษณะครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการค้นร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้อู่ปร่างเหมือนเดิมภายหลังคลอด	2.28	0.13
2. ทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า	0.01	0.91
3. ถ่ายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาช่วย	0.04	0.82
4. คลอดได้เองโดยธรรมชาติ	0.09	0.76
5. คัดน้ำนมตาม	0.01	0.90
6. ปรีกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย	0.14	0.70
7. นอนพักกลางวัน	0.08	0.76
8. รับประทานอาหารรสจืด เช่น เนื้อจืด เค็มจืด เป็รียวจืด	0.20	0.66
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์	1.11	0.29
10. อ่านหนังสือและ/หรือฟังเพลงอยู่ในบ้าน	0.13	0.72
11. รับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ไขมัน นม	2.01	0.16
12. ชมภาพยนตร์และ/หรือ ทีวี	0.05	0.82
13. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์	0.63	0.42
14. อาศัยอยู่กับสามีตลอดเวลา	5.85	0.01*
15. เล่นเล่นเซา - เบ็น	7.41	0.006*
16. คัดน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม	0.11	0.74

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ความต้องการด้านร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
17. อาศัยรวมอยู่กับบิดา มารดา หรือ ญาติ	7.18	0.007*
18. ท้องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ	2.57	0.10
19. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 7 - 9 เดือนของการตั้งครรภ์	0.44	0.50
20. ซอยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย	0.35	0.55
21. รับประทานยาหรือนายเป็นบางครั้ง	0.54	0.46
22. ให้แพทย์ช่วยโดยการผ่าตัดเด็กออกทางหน้าท้อง หรือใช้เครื่องลูก หรือดึงเด็กออกมา	0.09	0.76
23. คิมของมีนเมา เช่น สุรา เบียร์	0.51	0.47
24. รับประทานอาหารที่แปลกไปจากเคยรับประทาน เช่น กินเผาะ ข้าวสาร กินสอทอง	0.14	0.70
25. ว่างอยู่กับที่	0.01	0.91
26. อื่น ๆ (ระบุ) ให้บุตรในครรภ์แข็งแรง. ให้บุตรในครรภ์ปลอดภัย	0.20	0.64


*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 1$ $\chi^2(1) = 3.84$

จากตารางที่ 4 ปรากฏว่าความต้องการด้านร่างกายของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ "ต้องการอาศัยอยู่กับสามีตามลำพัง" "ต้องการกินเล่นเช้า - เย็น" "ต้องการอาศัยรวมอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติ" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกำนรางกายกับสถานภาพการ
ยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการกำนรางกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้รูปร่างเหมือนเดิมภายหลังคลอด	0.002	0.96
2. ทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า	0.002	0.96
3. ใกล้เคียงเองโดยไม่ต้องการช่วย	0.62	0.42
4. คลอดใกล้เคียงโดยธรรมชาติ	0.09	0.76
5. กินน้ำธรรมดา	0.04	0.84
6. ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วย	0.04	0.84
7. นอนพักผ่อนวัน	0.06	0.80
8. รับประทานอาหารรสจืด เช่น เนื้อจืด เค็มจืด เปรี้ยวจืด	0.02	0.90
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์	0.03	0.84
10. อ่านหนังสือและ/หรือฟังเพลงอยู่ในบ้าน	0.86	0.35
11. รับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ไขมัน นม	0.006	0.93
12. ชมภาพยนตร์และ/หรือ ทีวี	0.45	0.50
13. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์	2.58	0.10
14. อาศัยอยู่กับสามีตามลำพัง	0.06	0.80
15. เกินเตนเช่า - เบ็น	0.01	0.90
16. กินน้ำหวาน หรือ น้ำอัดลม	0.42	0.52

ตารางที่ 5 (ต่อ)



ความต้องการด้านร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
17. อาศัยร่วมกับบิดา มารดา หรือ ญาติ	0.16	0.69
18. ท้อง เที้ยวพักผอนหย่อนใจ	1.85	0.17
19. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 7 - 9 เดือนของการตั้งครรภ์	0.51	0.47
20. ซื่อสัตย์ประจานเอง เมื่อเจ็บป่วย	0.009	0.92
21. รับประทานยาละลายเป็นบางครั้ง	0.09	0.76
22. ให้แพทย์ช่วยโยกการผ่าตัดเด็กออกทางหน้าท้อง หรือใช้เครื่องสูด หรือคิง เค็ดออกมา	0.09	0.76
23. คืมของมีเงินเมา เช่น สุรา เบียร์	0.03	0.85
24. รับประทานอาหารที่แปลกไปจากเคยรับประทาน เช่น กินเฒ่า ข้าวสาร กินสอพอง	0.11	0.74
25. วิ่งอยู่กับที่	0.10	0.08
26. อื่น ๆ (ระบุ) ให้บุตรในครรภ์แข็งแรง ให้บุตรในครรภ์ปลอดภัย	0.08	0.77

จากตารางที่ 5 ปรากฏว่าความต้องการด้านร่างกายทุกข้อของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามสถานภาพการยอมรับการสมรสพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่นัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการออกกำลังกายกับระดับเศรษฐกิจ
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการการออกกำลังกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้อุปกรณ์เหมือนเดิมภายหลังคลอล	1.04	0.59
2. ทำงานเบา ๆ ที่บ้าน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า รีดผ้า	1.19	0.55
3. ว่ายน้ำเองโดยไม่ต้องการช่วย	2.04	0.36
4. คลอดได้เองโดยธรรมชาติ	3.96	0.14
5. คั้นน้ำธรรมชาติ	8.32	0.01*
6. ปฏิเสธแพทย์ทุกครั้ง เมื่อเจ็บป่วย	3.64	0.16
7. นอนพักกลางวัน	1.98	0.36
8. รับประทานอาหารรสจืด เช่น เนื้อจืด เค็มจืด เป็รียวจืด	8.04	0.02*
9. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 1 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์	0.42	0.81
10. อ่านหนังสือ และ/หรือฟังเพลงอยู่ในบ้าน	0.47	0.78
11. รับประทานอาหารทุกอย่าง เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ไขมัน นม	1.24	0.54
12. ชมภาพยนตร์และ/หรือทีวี	4.70	0.09
13. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 4 - 6 เดือนของการตั้งครรภ์	2.54	0.28
14. อาศัยอยู่กับสามีตามลำพัง	0.36	0.83
15. เล่นเล่นเซ้า - เย็น	0.45	0.80
16. คั้นน้ำหวาน หรือ น้ำอัดลม	5.85	0.05*

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ความต้องการด้านร่างกาย	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
17. อาศัยรวมอยู่กับบิดา มารดา หรือ ญาติ	0.66	0.72
18. ท้องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ	3.24	0.20
19. มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีในระยะ 7 - 9 เดือนของการตั้งครรภ์	3.85	0.14
20. ซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย	1.16	0.56
21. รับประทานยาระบายเป็นบางครั้ง	0.20	0.90
22. ให้แพทย์ช่วยโดยการผ่าตัดเล็กออกทางหน้าท้อง หรือใช้เครื่องมือ หรือดึงเล็กออกมา	3.96	0.14
23. คืมของมีนเมา เช่น สุรา เบียร์	1.05	0.59
24. รับประทานอาหารที่แปลกไปจากเคมรับประทาน เช่น กินเผาะ ข้าวสาร กินสอพอง	0.87	0.64
25. ว่างอยู่กับที่	5.04	0.08
26. อื่น ๆ (ระบุ) ให้บุตรในครรภ์แข็งแรง ให้บุตรในครรภ์ปลอดภัย	0.38	0.82

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 2$ $\chi^2_{(2)} = 5.99$

จากตารางที่ 6 ปรากฏว่าความต้องการด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับเศรษฐฐานะ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ "ต้องการกินน้ำขรรพลา" "ต้องการรับประทานอาหารรสจืด เช่น เนื้กจืด เค็มจืด เปรี้ยวจืด" "ต้องการกินน้ำหวานหรือน้ำอัดลม" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 3 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ กับระดับ
การศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับ
เศรษฐกิจฐานะ ของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 7 คำร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์

ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์	ร้อยละของผู้ต้องการ N = 150
1. ให้อีก มารดา ญาติพี่น้อง พุฒกัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ ของท่านกลัวความมิตินดี	94.7
2. ให้สามีเป็นอุปถัมภ์คุ้มครองท่านตลอดไป	90.0
3. ให้คนที่รู้จักแสดงความยินดีที่ท่านตั้งครรภ	87.3
3. ดูแลบุตรด้วยกันเอง	87.3
5. เลี้ยงบุตรด้วยกันแม่	86.7
6. ให้สามีเป็นเพื่อนไปในที่ต่าง ๆ เช่น เกินชื่อของ พามาฝากครรภ	77.3
7. ให้อุครในครรภมีเพศตรงกับความต้องการของสามี	73.3
7. ปรึกษาหารือปัญหาใจกับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล	73.3
9. ขกบุตรให้คนอื่น	9.3
10. อื่น ๆ (ระบุ) ต้องการให้สามีเข้าใจ, ต้องการปรึกษา ปัญหาที่สะใจ, ต้องการให้มารดาเยี่ยม	2.0

จากตารางที่ 7 ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
มากกว่าร้อยละ 50 เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ต้องการให้อีกมารดา ญาติพี่น้อง

พุทธศุขเกี่ยวกับการตั้งครรภกวยความมิตินที ร้อยละ 94.7 ต้องการให้สามีเป็นผู้ปกครอง
 ตลอดไป ร้อยละ 90.0 ต้องการดูแลบุตรด้วยตนเอง ร้อยละ 87.3 ต้องการให้คนรู้จัก
 แสดงความยินดีที่ตั้งครรภ ร้อยละ 87.3 ต้องการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ร้อยละ 86.7
 ต้องการให้สามีเป็นเพื่อนไปในที่ต่าง ๆ เช่น เดินซื้อของ พามาฝากครรภ ร้อยละ 77.3
 ต้องการให้บุตรมีเพศตรงกับความต้องการของสามี ร้อยละ 73.3 และต้องการปรึกษานัก
 กานจิตใจกับบุคลากรทางการแพทย ร้อยละ 73.3



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ กับระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้อีก หารค่า ญาติพี่น้อง พุฒกัยเกี่ยวกับการ คังครรกของทานก้วยความมิตินันท์	2.64	0.45
2. ให้อามีเป็นนุ่ปกป้องคัมครรกทานคคอกไป	3.96	0.26
3. ให้อคนรู้จักแสดกความมิตินันท์ทานคังครรก	3.04	0.38
4. กูแลมคฺรก้วยคนเอง	3.58	0.31
5. เลี้ยงมคฺรก้วยนมแม่	9.53	0.02 *
6. ให้อามีเป็นเพื่อนไปในที่ค่าง ๆ เช่น เกินช้อของ พามาฝากครรก	0.30	0.96
7. ให้อมคฺรรกในครรกมีเพศตรงก้วยความต้องการของอามี	2.12	0.54
8. ปรึกษาหารือมัญหาคันจิติใจ ก้วยมคฺรรกทางการแพทย ไกแก แพทย พยาบาล นักสังคสมสงเคระะห นุ่ชวยพยาบาล	2.09	0.55
9. มกมคฺรรกให้อคนอื่น	9.90	0.02*
10. อื่น ๆ (ระบุม) คังครรกให้อมารคามาเบี่ยม คังครรกให้อามีเข้าใจ. คังครรกปรึกษามัญหาก้วยพีสะโก 8.14	8.14	0.04*

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 3$ $\chi^2(3) = 7.81$

จากตารางที่ 8 ปรากฏว่าความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ
"ต้องการเลี้ยงมคฺรก้วยนมแม่" "ต้องการมกมคฺรรกให้อคนอื่น" "ต้องการให้อมารคามาเบี่ยม"
"ต้องการให้อามีเข้าใจ" "ต้องการปรึกษามัญหาก้วยพีสะโก" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความ
สัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ กับลักษณะ
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้ความเคารพ ญาติพี่น้อง พุดคุยเกี่ยวกับการ ตั้งครมรของทานควยความมิตินดี	0.31	0.58
2. ให้สามีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองท่านตลอดไป	3.98	0.04*
3. ให้คนรู้จักแสดงความยินดีที่ท่านตั้งครมร	1.24	0.25
4. ดูแลบุตรด้วยตนเอง	0.01	0.90
5. เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่	0.44	0.50
6. ให้สามีเป็นเพื่อนไปในที่ต่าง ๆ เช่น เงินซื้อของ พามาฝากครมร	4.47	0.03*
7. ให้บุตรในครมรมีเพศตรงกับความต้องการของสามี	1.08	0.29
8. ปรึกษาหารือปัญหาด้านจิตใจ กับบุคลากรทางการแพทย์ ไคแก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล	1.08	0.30
9. ยกบุตรให้คนอื่น	0.46	0.49
10. อื่น ๆ (ระบุ) ให้มารทมาเยี่ยม, ให้สามีเข้าใจ, ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสามี	0.73	0.39

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 1 \quad \chi^2(1) = 3.84$

จากตารางที่ 9 ปรากฏว่าความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามลักษณะครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ
"ต้องการให้สามีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองตลอดไป" "ต้องการให้สามีเป็นเพื่อนไปในที่ต่าง ๆ
เช่น เงินซื้อของ พามาฝากครมร" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ กับสถานภาพ
การยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้นึก มาตรา ญาติพี่น้อง พุทศุยเกี่ยวกับ กิจกรรมของท่านกลัวความอึดอัด	1.14	0.24
2. ให้สามีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองท่านตลอดไป	12.41	0.0004 *
3. ให้คนรู้จักแสดงความยินดีที่ท่านกิจกรรม	4.32	0.04 *
4. ดูแลบุตรด้วยตนเอง	7.44	0.006*
5. เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่	10.20	0.001 *
6. ให้สามีเป็นเพื่อนไปในที่ต่าง ๆ เช่น เดินช้อปปิ้ง พามาฝากกรรม	3.45	0.06
7. ให้นุเคราะห์ในกรรมพิเศษตรงกับความต้องการของสามี	0.08	0.78
8. ปรึกษาหารือปัญหาด้านจิตใจ กับบุคลากรทางการแพทย์ ไต่ถาม แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล	0.04	0.83
9. ยกย่องให้คนอื่น	20.28	0.0000 *
10. อื่น ๆ (ระบุ) ให้ มารดามาเยี่ยม. ให้สามีเข้าใจ. ปรึกษานักจิตวิทยาที่ปรึกษา	2.28	0.13

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 1 \quad \chi^2(1) = 3.84$

จากตารางที่ 10 ปรากฏว่าความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนก
ตามสถานภาพการยอมรับการสมรส มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ
"ต้องการให้สามีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองท่านตลอดไป" "ต้องการให้คนรู้จักแสดงความยินดีที่ท่านกิจกรรม"
"ต้องการดูแลบุตรด้วยตนเอง" "ต้องการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่" และ "ต้องการยกย่องให้คนอื่น"
สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ กับระดับ
เศรษฐกิจฐานะของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ให้อีก มารดา ญาติพี่น้อง พุคคุยเกี่ยวกับการ กิจกรรมของท่านควยความมีคิยินคิ	0.21	0.90
2. ให้อามีเป็นผู้อยู่ป้องคุมครอง ท่านกลออกไป	2.04	0.36
3. ให้อนรู้จักแสดงควมยินคิที่ท่านกิจกรรม	0.97	0.61
4. ให้อนบุงคยควนเอง	1.07	0.58
5. ให้อนบุงคยควนแม่	0.12	0.94
6. ให้อามีเป็นเพื่อนไปในที่ค่าง ๆ เช่น เกินช้อของ พามาฝากกรรม	0.48	0.78
7. ให้อนบุงคยในกรรมมีเพศตรงกับควมต้องการของอามี	2.23	0.32
8. ปรึกษารือบ้ญหาค้นจิตใจกับบุงคยการทางกรรมแพทย ค้แก แพทย พยาบาล นักสังคยสง เควระห ผูชวยพยาบาล	1.38	0.50
9. บกบุงคยให้อนอื่น	0.64	0.72
10. อื่น ๆ (ระนุ) ให้อนบุงคยควน, ให้อามี เข้าใจ, ปรึกษารือบ้ญหาค้นจิตใจ	2.20	0.33

จากตารางที่ 11 ปรากฏว่า ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ ทุกข้อของกลุ่ม
ตัวอย่างจำแนกตามระดับเศรษฐกิจฐานะ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

ตอนที่ 4 คำร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านสังคมกับระดับการศึกษา
ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระดับเศรษฐกิจฐานะของ
กลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 12 คำร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการด้านสังคม

ความต้องการด้านสังคม	คำร้อยละของผู้ตอบการ N = 150
1. ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลังคลอดบุตร	93.3
2. ให้เพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านบ่อย ๆ	78.0
3. มีแหล่งให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน	77.3
4. คุยกับหญิงตั้งครรภ์	74.7
5. ใหญ่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคม สงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน	72.7
6. ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน เช่น เติม	72.0
7. เก็บตัวอยู่กับบ้าน	71.5
8. มีสถานที่รับช่วยดูแลบุตรสักระยะหนึ่ง	66.0
9. แยกกายกับบุตรที่มีสติ สติสัมปชัญญะของวัยรุ่น	46.7
10. เรียนหนังสือต่อไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว	43.3
11. เห็นว่าเนื้อโล้นคนตรี หรือเสียงเพลงที่เข้าใจ	14.0
12. อื่น ๆ (ระบุ) คุยกับหญิงที่เคยมีบุตรแล้ว. ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ	1.3

จากตารางที่ 12 ความต้องการด้านสังคมที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ต้องการ
เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ต้องการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลังคลอดบุตร
แล้ว ร้อยละ 93.3 ต้องการให้เพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านบ่อย ๆ ร้อยละ 78.0 ต้องการมีแหล่ง

ช่วยเหลือด้านการเงิน ร้อยละ 77.3 ต้องการคุยกับหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 74.7 ต้องการ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ไปเยี่ยมที่บ้าน ร้อยละ 72.7 ต้องการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน
เช่นเดิม ร้อยละ 72.0 ต้องการเก็บตัวอยู่กับบ้าน ร้อยละ 71.3 และต้องการมีสถานที่
รับช่วยเหลือดูแลครูให้สักกระยะหนึ่ง ร้อยละ 66.0



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกำนัลสังคมกับระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการกำนัลสังคม	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลัง คลอดบุตรแล้ว	5.90	0.12
2. ให้อุปการะแก่บิดามารดาที่บั้นปลาย	4.42	0.22
3. มีแหล่งช่วยเหลือทางการเงิน	0.87	0.83
4. คุยกับหญิงตั้งครรภ์	1.37	0.71
5. ใ้บุตรลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน	10.43	0.01*
6. ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน เช่น เติม	1.64	0.65
7. เก็บตัวอยู่กับบ้าน	17.07	0.0007*
8. มีสถานที่รับช่วยเหลือบุตรให้สักกระยะหนึ่ง	1.82	0.61
9. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสัน สดงามแฟชั่นของวัยรุ่น	1.30	0.72
10. เรียนหนังสือต่อไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว	20.70	0.001*
11. เห็นว่าเมื่อใดมีคนคนหรือเสียงเพลงที่เร้าใจ	17.17	0.0007*
12. อื่น ๆ (ระบุ) คุยกับหญิงที่เคยมีบุตรแล้ว, ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ	4.14	0.24

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 3$ $\chi^2(3) = 7.81$

จากตารางที่ 13 ปรากฏว่าความต้องการกำนัลสังคมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ "ต้องการ

ให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน" "ต้องการเก็บตัวอยู่กับบ้าน" "ต้องการเรียนหนังสือต่อไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว" "ต้องการเห็นราเมื่อได้ยินดนตรีหรือเสียงเพลงที่เร้าใจ" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ศูนย์วิทยพัชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านสังคมกับลักษณะครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านสังคม	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลังคลอดบุตรแล้ว	0.91	0.34
2. ให้เพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านบ่อย ๆ	0.14	0.71
3. มีแหล่งช่วยเหลือด้านการเงิน	0.01	0.89
4. คุยกับหญิงตั้งครรภ์	0.0003	0.96
5. ไปบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน	1.40	0.24
6. ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน เช่น เกม	0.34	0.56
7. เก็บตัวอยู่กับบ้าน	2.14	0.14
8. มีสถานที่รับช่วยเหลือบุตรให้สักระยะหนึ่ง	0.07	0.78
9. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันตามแฟชั่นของวัยรุ่น	0.0001	0.99
10. เรียนหนังสือต่อไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว	0.42	0.52
11. เห็นว่าเมื่อใดขึ้นดนตรีหรือเสียงเพลงที่เราใจ	0.24	0.62
12. ชื่น ๆ (ระบุ) คุยกับหญิงที่มีบุตรแล้ว, ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ	0.20	0.64

จากตารางที่ 14 ปรากฏว่าความต้องการด้านสังคมทุกข้อของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะครอบครัว พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านสังคมกับสถานภาพการยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านสังคม	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลังคลอดบุตรแล้ว	0.04	0.84
2. ให้เพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านบ่อย ๆ	0.16	0.68
3. มีแหล่งช่วยเหลือด้านการเงิน	1.52	0.22
4. คุยกับหญิงตั้งครรภ์	0.001	0.96
5. ใ้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน	0.04	0.84
6. ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนเล่นเกม	0.01	0.92
7. เก็บตัวอยู่กับบ้าน	0.0005	0.98
8. มีสถานที่รับช่วยเหลือดูแลบุตรให้ถึงระยะหนึ่ง	1.14	0.28
9. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสัน สดตามแฟชั่นของวัยรุ่น	1.04	0.30
10. เรียนหนังสือออกไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว	1.98	0.16
11. เต้นรำเมื่อได้ยินดนตรีหรือเสียงเพลงที่เร้าใจ	1.34	0.24
12. อื่น ๆ (ระบุ) คุยกับหญิงที่เคยมีบุตรแล้ว, ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ	0.08	0.77

จากตารางที่ 15 ปรากฏว่าความต้องการด้านสังคมทุกข้อของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพการยอมรับการสมรส พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านสังคมกับระดับเศรษฐฐานะ
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านสังคม	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายหลัง คลอดบุตรแล้ว	0.05	0.97
2. ให้อุปการะแก่ผู้สูงอายุในบ้านน้อย ๆ	1.70	0.42
3. มีแหล่งช่วยเหลือด้านการเงิน	8.64	0.01*
4. คุยกับหญิงตั้งครรภ์	3.34	0.18
5. ใ้หม่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล ไปเยี่ยมที่บ้าน	1.88	0.39
6. ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนเช่นเกม	0.48	0.78
7. เก็บตัวอยู่กับบ้าน	5.05	0.08
8. มีสถานที่รับช่วยเหลือผู้พิการให้สักกระยะหนึ่ง	0.56	0.75
9. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสตามแฟชั่นของวัยรุ่น	1.30	0.52
10. เวียนหนังสือออกไปภายหลังคลอดบุตรแล้ว	1.69	0.42
11. เสนอว่าเมื่อใดเป็นนครหรือเสียงเพลงที่เราใจ	0.80	0.66
12. อื่น ๆ (ระบุ) คุยกับหญิงที่มีบุตรแล้ว, ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ	1.50	0.47

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 2$ $\chi^2(2) = 5.99$

จากตารางที่ 16 ปรากฏว่าความต้องการด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับ
เศรษฐฐานะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ คือ "ต้องการมีแหล่ง
ช่วยเหลือด้านการเงิน" สำหรับข้ออื่น ๆ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 5 ค่าร้อยละและความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการคำแนะนำ กับระกัยการ
ศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอมรับการสมรส และระกัย
เศรษฐกิจฐานะของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 17 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการการคำแนะนำ

ความต้องการการคำแนะนำ	ร้อยละของผู้ต้องการ N = 150
1. การเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์	98.0
2. การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์	96.0
3. การเตรียมตัวก่อนคลอด	96.0
4. การวางแผนครอบครัว	86.0
5. อื่น ๆ (ระบุ) การเลี้ยงบุตร	4.0

จากตารางที่ 17 ความต้องการการคำแนะนำที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากกว่าร้อยละ
50 เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ
เด็กในครรภ์ ร้อยละ 98.0 ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ
96.0 ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนคลอด ร้อยละ 96.0 และต้องการคำ
แนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ร้อยละ 86.0

ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านคำแนะนำกับระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านคำแนะนำ	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. การเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์	0.81	0.84
2. การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์	1.03	0.79
3. การเตรียมตัวก่อนคลอด	0.62	0.89
4. การวางแผนครอบครัว	3.58	0.31
5. อื่น ๆ (ระบุ) การเลี้ยงบุตร	1.74	0.62

จากตารางที่ 18 ปรากฏว่าความต้องการด้านคำแนะนำทุกข้อของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการด้านคำแนะนำกับลักษณะครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการด้านคำแนะนำ	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. การเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์	0.11	0.74
2. การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์	0.80	0.36
3. การเตรียมตัวก่อนคลอด	0.002	0.96
4. การวางแผนครอบครัว	0.12	0.14
5. อื่น ๆ (ระบุ) การเลี้ยงบุตร	0.002	0.96

จากตารางที่ 19 ปรากฏว่าความต้องการด้านคำแนะนำทุกข้อของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะครอบครัว พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการคำแนะนำกับสถานภาพการยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการคำแนะนำ	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - value
1. การเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์	9.30	0.002*
2. การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์	2.58	0.10
3. การเตรียมตัวก่อนคลอด	0.26	0.61
4. การวางแผนครอบครัว	0.007	0.93
5. อื่น ๆ (ระบุ) การเลี้ยงบุตร	2.58	0.10

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $df = 1$ $\chi^2_{(1)} = 3.84$

จากตารางที่ 20 ปรากฏว่าความต้องการคำแนะนำของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพการยอมรับการสมรส มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหัวข้อ "ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์" ส่วนข้ออื่น ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการคำแนะนำกับระดับ
เศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง

ความต้องการคำแนะนำ	ค่าไคสแควร์ (χ^2)	P - vaule
1. การเจริญเติบโตของเค็กในครรภ์	0.33	0.84
2. การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์	3.18	0.20
3. การเตรียมตัวก่อนคลอด	0.68	0.71
4. การวางแผนครอบครัว	2.06	0.36
5. อื่น ๆ (ระบุ) การเลี้ยงบุตร	1.84	0.40

จากตารางที่ 21 ปรากฏว่าความต้องการคำแนะนำทุกข้อของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับเศรษฐกิจ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 6 อาการผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ และความต้องการคำแนะนำเมื่อมีอาการผิดปกติ
เกิดขึ้นของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 22 อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นและความต้องการคำแนะนำ

อาการผิดปกติ	อาการผิดปกติ N = 150		ต้องการคำแนะนำ N = 150	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. วิงเวียนศีรษะ หรือเป็นลม	99	66.0	96	64.0
2. แพ้ท้อง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนในคอนเช้า หรือ หลังอาหาร	98	65.33	97	64.66
3. เป็นตะคริว	76	50.66	72	48.0
4. พันผุ	61	40.66	62	41.33
5. ชีค	54	36.0	56	37.33
6. ปวดศีรษะมากและ/หรือตาพร่ามัว	50	33.33	52	34.66
7. ตกขาวมีสี กลิ่น ผิดปกติ และ/หรือ มีอาการคันบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมด้วย	34	22.66	36	24.0
8. บวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง	34	22.66	39	26.0
9. หัวนมผิดปกติ เช่น แบน บอด หรือบวม	22	14.66	24	16.0
10. ลูกในท้องกินน้อยลง	15	10.0	18	12.0
11. มีเลือดออกจากระปริงกระปรอยจากช่องคลอด	9	6.0	13	8.66
12. เส้นเลือดดำที่ขาโป่งพอง	4	2.66	9	6.0
13. อื่น ๆ (ระบุ) ปวดหลัง	2	1.33	2	1.33
เสียดท้อง	1	0.66	1	0.66
Condyloma	1	0.66	1	0.66

จากตารางที่ 22 ปรากฏว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่พบมากที่สุดคือ อาการวิงเวียนศีรษะ หรือเป็นลม คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคืออาการแพทอง คิดเป็นร้อยละ 65.33 และอาการที่พบน้อยที่สุดคือ เส้นเลือดดำที่ขาโป่งพอง คิดเป็นร้อยละ 2.66 ส่วนความต้องการคำแนะนำเมื่อมีอาการผิดปกติ ปรากฏว่า วัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ ต้องการคำแนะนำเมื่อมีอาการแพทองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.66 รองลงมาคือคำแนะนำเมื่อมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม คิดเป็นร้อยละ 64.0 ที่ต้องการคำแนะนำน้อยที่สุดคือ อาการเส้นเลือดดำที่ขาโป่งพอง คิดเป็นร้อยละ 6.0 ส่วนอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ได้แก่ อาการปวดหลัง 2 ราย เสียกทองและพบ Condyloma ที่อวัยวะสืบพันธุ์ อย่างละ 1 ราย ซึ่งทุกคนต่างก็ต้องการคำแนะนำในอาการที่ตนเป็นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.33, 0.66 และ 0.66 ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย