

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

การวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการวิเคราะห์และแจกแจงจำนวนผู้ป่วยกามโรคในแต่ละภาค, แต่ละกลุ่มอายุ, แต่ละปีงบประมาณ, และแต่ละเพศ นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์และแจกแจงจำนวนผู้ป่วยกามโรคในกรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร), ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ปีงบประมาณพุทธศักราช 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 แต่ละเพศ และแต่ละกลุ่มอายุอีกด้วย

ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยกามโรคที่ไปรับการตรวจและรักษายังหน่วยควบคุมกามโรค และหน่วยงานทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการควบคุมกามโรคที่ตั้งดำเนินการอยู่ในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 91 หน่วยงาน ใน 58 จังหวัด ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2510 ถึง 2514 รวม 5 ปีงบประมาณ วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกามโรคในแต่ละภาค, แต่ละกลุ่มอายุ, แต่ละปีงบประมาณ, แต่ละเพศ, และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกามโรคในกรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร), ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ปีงบประมาณพุทธศักราช 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 แต่ละเพศ และแต่ละกลุ่มอายุ ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยกามโรคโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน ( Analysis of Variance Technique ) หากปรากฏว่าค่า F มีนัยสำคัญทางสถิติแล้วหมายความว่า ค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยกามโรคทุก ๆ กลุ่มแตกต่างกัน จึงใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มผู้ป่วยกามโรคด้วยวิธีของดักัน ( Duncan's Multiple Range Test ) ทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันในทางสถิติ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในปีงบประมาณต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงภาค ปรากฏว่าปีงบประมาณพุทธศักราช 2514 มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 27.02 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และปีงบประมาณพุทธศักราช 2510 มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 10.57 และมี

จำนวนไม่แตกต่างจากปีงบประมาณพุทธศักราช 2511 (ร้อยละ 16.21) แต่มีจำนวนแตกต่างจากปีงบประมาณพุทธศักราช 2513 (ร้อยละ 24.33), และปีงบประมาณพุทธศักราช 2512 (ร้อยละ 21.87)

2. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคที่อยู่ตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เมื่อไม่คำนึงถึงปีงบประมาณ ปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 36.01 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และภาคใต้ มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 5.73 ซึ่งมีจำนวนแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 21.54), ภาคเหนือ (ร้อยละ 18.91), และภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) (ร้อยละ 17.81)

3. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 38.96 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.05 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.05), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.16), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.33), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.54), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 1.02), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.32) แต่มีจำนวนแตกต่างจากกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 21.04), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 20.57), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 10.02), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.94)

4. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายกับหญิง เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่าผู้ป่วยกามโรคชายมีจำนวนสูงกว่าผู้ป่วยกามโรคหญิง คือ ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 66.00 ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 34.00

5. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในกรุงเทพมหานครตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 38.91 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.05 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.07), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.07), แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 22.27), กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 15.52), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 11.60), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.94)

ละ 5.76), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 3.06), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 1.45), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.44)

6. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในกรุงเทพมหานคร เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิง คือ มีผู้ป่วยกามโรคชายร้อยละ 78.43 สูงกว่าผู้ป่วยกามโรคหญิงซึ่งมีร้อยละ 21.57

7. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 39.17 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.02 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 0.02), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.18) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 26.57), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 18.25), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 8.74), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.04), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 1.63), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.72), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.34), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.32)

8. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงมีจำนวนแตกต่างกัน เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย คือ มีผู้ป่วยกามโรคชายร้อยละ 58.14 และมีผู้ป่วยกามโรคหญิงร้อยละ 41.86

9. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในภาคเหนือ ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 39.94 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี กับกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.04 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.25), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.26), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.40), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.79) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 25.88), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 17.62), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 8.40), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.46), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 1.92)

10. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในภาคเหนือ เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของ

ผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 69.74 ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงซึ่งมี ร้อยละ 30.26

11. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 39.20 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.02 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.03), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.06) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 21.73), กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 21.23), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 9.37), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.61), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.06), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.91), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.44), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.34)

12. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 49.32 และไม่แตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 50.68

13. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในภาคใต้ ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 34.25 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.03 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.04), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.19), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.31), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.36), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.70) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 22.59), กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 21.81), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 11.76), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 5.48), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.19)

14. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในภาคใต้ เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 62.63 และไม่แตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 37.37

15. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในฝั่งบประมาณพุทธศักราช 2510 ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ

เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 35.21 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.05 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.06), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.16) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 21.37), กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 18.54), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 10.69), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 5.88), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 3.32), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 2.22), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 1.46), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 1.04)

16. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในโรงพยาบาลพุทธศักราช 2510 เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 62.07 ซึ่งสูงกว่าและแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 37.93

17. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในโรงพยาบาลพุทธศักราช 2511 ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 38.00 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.04 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.06), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.12), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.32), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.43), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.89), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.02) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 22.08), กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 20.04), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 10.67) กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.97)

18. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในโรงพยาบาลพุทธศักราช 2511 เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 60.76 สูงกว่าและแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 39.24

19. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในโรงพยาบาลพุทธศักราช 2512 ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 37.45 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อย

ละ 0.02 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.03), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.20), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.26), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.57), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 1.15), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.46) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 21.19), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 20.76), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 10.61), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 5.30)

20. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในโรงพยาบาลพระศรีภักธรราช 2512 เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 64.53 สูงกว่าและแตกต่างจาก ผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 35.47

21. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในโรงพยาบาลพระศรีภักธรราช 2513 ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 40.64 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.04 ซึ่งมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (ร้อยละ 0.05), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.18), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.19), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี (ร้อยละ 0.36), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.72), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 1.96) แต่มีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 22.50), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 19.59), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 9.42), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.35)

22. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในโรงพยาบาลพระศรีภักธรราช 2513 เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 66.26 สูงกว่าและแตกต่างจาก ผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 33.74

23. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคในโรงพยาบาลพระศรีภักธรราช 2514 ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ เมื่อไม่คำนึงถึงเพศของผู้ป่วย ปรากฏว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี มีจำนวนผู้ป่วยกามโรคสูงสุด คือ ร้อยละ 40.72 และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีจำนวนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.03 ของผู้ป่วยกามโรคทั้งหมด และมีจำนวนไม่แตกต่างจาก กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (ร้อยละ 0.04), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (ร้อยละ 0.11), กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.24), กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี



(ร้อยละ 0.37), กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี (ร้อยละ 0.35), กลุ่มอายุ 40 - 44 ปี (ร้อยละ 2.35), กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี (ร้อยละ 4.81) และมีจำนวนแตกต่างจาก กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (ร้อยละ 20.96), กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี (ร้อยละ 20.10), กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 9.42)

24. การแจกแจงผู้ป่วยกามโรคชายและหญิงในปีงบประมาณพุทธศักราช 2514 เมื่อไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุของผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยกามโรคชายมีร้อยละ 71.64 สูงกว่าและแตกต่างจากผู้ป่วยกามโรคหญิงที่มีร้อยละ 28.36

ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ขอคนพบที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น

1. ผู้ป่วยกามโรคชายและหญิง ในภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ
2. ผู้ป่วยกามโรคชายและหญิง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ
3. ผู้ป่วยกามโรคชายและหญิง ในภาคใต้ มีจำนวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ขอเสนอแนะ

ควรจะได้มีการวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยกามโรคนี้ ในด้านระดับการศึกษาของผู้ป่วย, อาชีพของผู้ป่วย เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ป่วยกามโรคในระดับการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ จะปรากฏผลอย่างไร ทั้งนี้ อาจจะได้ขอคนพบที่เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่สามารถจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนงานควบคุมกามโรคได้ต่อไป นอกจากนี้ ก็ควรจะได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปของโครงการควบคุมกามโรค ระยะ 5 ปี วงศ์ที่ 2 (พุทธศักราช 2515 ถึง 2519) แล้วคว่าจะปรากฏผลเหมือนหรือต่างกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ เพียงใดด้วย และเพื่อที่จะช่วยให้การวิจัยผิดพลาดได้น้อยที่สุด จึงควรที่จะได้มีการเลือกตัวอย่างประชากร โดยที่ให้ประชากรมีโอกาสได้รับเลือกเป็นตัวอย่างเท่ากัน ถ้าสุ่มตัวอย่างโดยตรงจากประชากร และจัดให้มีการสัมภาษณ์ขึ้นด้วยในกรณีที่เป็น ก็จะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น.