



บทที่ 4

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง "ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างประชากรที่เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวนนักศึกษา 380 คน เป็นนักศึกษาชายจำนวน 173 คน และนักศึกษาหญิง จำนวน 207 คน โดยผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เอกซ์ ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

1. สถานภาพทั่วไปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. ความรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยศึกษาและเปรียบเทียบตามตัวแปรต่อไปนี้
  - 2.1 ศึกษาความรู้ โดยส่วนรวมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  - 2.2 การเปรียบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามตัวแปรเพศ

3. ทศนคติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเปรียบเทียบตามตัวแปรดังนี้

3.1 ศึกษาทศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.2 การเปรียบเทียบทศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามตัวแปรเพศ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ บุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยการศึกษาของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา อาชีพของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย สถานภาพของบิดามารดา หรือผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุ						
ต่ำกว่า 15 ปี	3	0.80	3	1.73	0	0.00
15-19 ปี	325	85.50	148	85.55	177	85.51
20-24 ปี	51	13.40	21	12.41	30	14.49
25-29 ปี	1	0.30	1	0.58	0	0.00

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย						
บิดา	10	2.60	4	2.31	6	2.90
มารดา	40	10.50	18	10.40	22	10.63
บิดา มารดา	263	69.20	120	69.36	143	69.08
ญาติ	36	9.50	13	7.52	23	11.11
พี่น้อง	18	4.70	12	6.94	6	2.90
พระ	2	0.50	2	1.16	0	0.00
เพื่อน	9	2.40	4	2.31	5	2.42
อื่น ๆ	2	0.50	0	0.00	2	0.96
การศึกษาของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย						
ไม่ได้เรียนหนังสือ	2	3.00	1	3.34	1	2.78
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	19	28.40	7	22.53	12	33.34
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	13	19.40	8	25.80	5	13.88
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	16	23.80	8	25.80	8	22.22
อุดมศึกษา	17	25.40	7	22.53	10	27.78
การศึกษาของบิดา						
ไม่ได้เรียนหนังสือ	14	3.70	9	5.20	5	2.42
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	188	49.40	85	49.14	103	49.76
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	90	23.70	39	22.54	51	24.64

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อนุปริญาหรือเทียบเท่า	38	10.00	17	9.83	21	10.14
อุดมศึกษา	50	13.20	23	13.29	27	13.04
การศึกษาของมารดา						
ไม่ได้เรียนหนังสือ	22	5.80	9	5.20	13	6.28
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	238	62.60	110	63.58	128	61.84
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	63	16.60	28	16.77	34	16.43
อนุปริญาหรือเทียบเท่า	30	7.90	13	7.15	17	8.21
อุดมศึกษา	27	7.10	12	6.94	15	7.24
อาชีพของบิดา						
รับจ้าง	139	36.60	55	31.80	84	40.58
รับราชการ	98	25.80	45	26.01	53	25.60
เกษตรกร	22	5.80	9	5.20	13	6.28
ธุรกิจส่วนตัว	90	23.70	45	26.01	45	21.74
อื่น ๆ	31	8.20	19	10.98	12	5.80
อาชีพของมารดา						
รับจ้าง	93	24.50	45	26.01	48	23.19
รับราชการ	46	12.10	18	10.40	28	13.53

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกร	25	6.60	10	5.78	15	7.25
ธุรกิจส่วนตัว	112	29.50	57	32.95	55	26.57
อื่น ๆ (ได้แก่ แม่บ้าน)	104	27.40	43	24.86	61	29.46
อาชีพของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย						
(เฉพาะที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือบิดามารดา)						
รับจ้าง	20	29.80	9	29.04	11	30.56
รับราชการ	18	26.90	8	25.80	10	27.78
เกษตรกร	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ธุรกิจส่วนตัว	15	22.40	7	22.58	8	22.22
อื่น ๆ	14	20.90	7	22.58	7	19.44
สถานภาพของบิดามารดา หรือผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย						
โสด	16	4.20	8	4.62	8	3.86
คู่	300	79.00	136	78.61	164	79.23
หม้าย	21	5.50	11	6.36	10	4.83
หย่า	34	8.90	16	9.25	18	8.70
แยก	9	2.40	2	1.16	7	3.38
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน						
ต่ำกว่า 1,000 บาท	124	32.60	59	34.11	65	31.40

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1,001-2,000 บาท	201	52.89	88	50.87	113	54.59
2,001-3,000 บาท	40	10.53	18	10.40	22	10.63
3,001-4,000 บาท	10	2.63	4	2.31	6	2.90
4,000 บาทขึ้นไป	5	1.35	4	2.31	1	0.48

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.50 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.40 นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 69.20 รองลงมาพักอาศัยอยู่กับมารดา คิดเป็นร้อยละ 10.50 การศึกษาของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28.40 รองลงมาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.40 การศึกษาของบิดาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.70 การศึกษาของมารดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 16.60 อาชีพของบิดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 25.80 อาชีพของมารดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.40 อาชีพของผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 26.90 สถานภาพของบิดามารดา หรือผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาไม่มีสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ

8.90 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายระหว่าง 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.89 รองลงมาค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60

เมื่อพิจารณาแยกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.50 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.14 นักศึกษาชายส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 69.36 รองลงมาพักอาศัยอยู่กับมารดา คิดเป็นร้อยละ 10.40 การศึกษาของผู้ที่นักศึกษาชายอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับอนุปริญญา และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.80 รองลงมาจบชั้น ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.53 การศึกษาของบิดา ของนักศึกษาชายส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.14 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.54 การศึกษาของมารดา ของนักศึกษาชายส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 63.58 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 16.77 อาชีพของบิดาของนักศึกษาชาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 31.80 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการและ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.01 อาชีพของมารดานักศึกษาชายส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 32.95 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 26.01 อาชีพของผู้ที่นักศึกษาชายอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.04 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.80 สถานภาพของบิดามารดาหรือผู้ที่ นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 78.61 รองลงมา มีสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 9.25 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาชายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 1,001- 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.87 รองลงมาค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.11

ส่วนนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.51 รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.49 นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 69.08 รองลงมาพักอาศัยอยู่กับญาติ คิดเป็นร้อยละ 11.11 การศึกษาของผู้ที่ นักศึกษาหญิงพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.78 การศึกษาของบิดาของ นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.76 รอง-

ลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 24.64 การศึกษาของมารดา  
ของนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.84  
รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 16.43 อาชีพของบิดาของ  
นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.58 รองลงมาประกอบอาชีพ  
รับราชการคิดเป็นร้อยละ 25.60 อาชีพของมารดาของนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน คิดเป็น  
ร้อยละ 29.50 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.57 อาชีพของผู้ที่นักศึกษา  
หญิงพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.56 รองลงมาประกอบอาชีพ  
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 27.78 สถานภาพของบิดามารดาหรือผู้ที่นักศึกษาหญิงอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่  
มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 79.23 รองลงมา มีสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 8.70 ค่าใช้จ่าย  
ส่วนตัวของนักศึกษาหญิงเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 54.59 รองลงมา ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.40

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 2 จำนวน และค่าร้อยละ ของนักศึกษาที่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สถานเริงรมย์ที่นักศึกษาไปเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา						
บาร์	45	10.79	39	13.59	6	4.62
ผับ	70	16.79	49	17.08	21	16.15
ไนท์คลับ	37	8.87	31	10.80	6	4.62
อาบอบนวด	29	6.95	29	10.10	0	0.00
ดิสโก้เธค	142	34.05	70	24.39	72	55.38
คอกเทลเล้าจ์	33	7.93	26	9.06	7	5.38
โรงแรมที่มีหญิงบริการ	36	8.63	36	12.54	0	0.00
อื่น ๆ	25	5.99	7	2.44	18	13.85

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า สถานเริงรมย์ที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ไปเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คือ ดิสโก้เธค คิดเป็นร้อยละ 34.05 รองลงมาคือ ผับ คิดเป็นร้อยละ 16.79 สถานเริงรมย์ที่นักศึกษาชายไปเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คือ ดิสโก้เธค คิดเป็นร้อยละ 24.39 รองลงมาคือ ผับ คิดเป็นร้อยละ 17.08 สถานเริงรมย์ที่นักศึกษาหญิงไปเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือ ดิสโก้เธค คิดเป็นร้อยละ 55.38 รองลงมาคือ ผับ คิดเป็นร้อยละ 16.15

ตารางที่ 3 จำนวนและค่าร้อยละของแหล่งข่าวสารข้อมูลที่นักศึกษาได้รับ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แหล่งข่าวสารข้อมูล						
โทรทัศน์	341	18.09	157	17.60	184	18.53
หนังสือพิมพ์	287	16.18	128	14.35	159	16.01
วารสารหรือนิตยสารทั่วไป	272	14.48	123	13.79	149	15.01
ญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว	120	6.36	61	6.84	59	5.94
เพื่อน	215	11.40	110	12.33	105	10.57
วิทยุ	222	12.38	107	11.99	115	11.58
วารสารทางการแพทย์	194	10.89	100	11.21	94	9.47
ครู	229	12.15	105	11.77	124	12.49
อื่น ๆ	5	0.27	1	0.12	4	0.40

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า แหล่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ได้รับทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 18.09 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 16.18 นักศึกษาชายได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ได้รับจากทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 17.60 รองลงมาได้รับจากทางหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 14.35 นักศึกษาหญิงได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ ได้รับจากทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 18.53 รองลงมาได้รับจากทางหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 16.01

ตารางที่ 4 จำนวน และร้อยละ ของนักศึกษาที่รู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ประสบการณ์ทางเพศของนักศึกษา และการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น จำแนกตามเพศ

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
นักศึกษาที่รู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
เคยรู้จัก	102	26.80	73	42.20	29	14.01
ไม่เคยรู้จัก	278	73.20	100	57.80	178	85.99
ประสบการณ์ทางเพศของนักศึกษา						
เคย	81	21.32	74	42.77	7	3.38
ไม่เคย	299	78.68	99	57.23	200	96.62
เพศของผู้ที่นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ด้วย						
ชาย	8	9.88	1	1.35	7	100.00
หญิง	70	86.42	70	94.59	0	0.00
ทั้งชายและหญิง	3	3.70	3	4.06	0	0.00
ผู้ที่นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
เพื่อน	53	65.43	46	62.16	7	100.00
หญิงบริการ	28	34.57	28	37.84	0	0.00

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
นักศึกษาเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
เคย	12	3.16	12	6.94	0	0.00
ไม่เคย	368	96.84	161	93.06	207	100.00
นักศึกษาเคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น						
เคย	3	0.80	3	1.73	0	0.00
ไม่เคย	377	99.20	170	98.27	207	100.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักบุคคลที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 73.20 และเคยรู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 26.80 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 78.68 และเคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 21.32 นักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ด้วยคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.42 รองลงมา มีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 9.88 ผู้ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกคือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมาคือหญิงบริการคิดเป็นร้อยละ 34.57 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 96.84 และที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 3.16 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 99.20 และเคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

เมื่อพิจารณาแยกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 57.80 และเคยรู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 42.20 นักศึกษาชายส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 57.23 และไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 42.77 นักศึกษาชายที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้วส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94.59 รองลงมา มีเพศสัมพันธ์กับทั้งเพศชายและหญิง คิดเป็นร้อยละ 4.06 นักศึกษาชายส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 62.16 รองลงมา มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ คิดเป็นร้อยละ 37.84 นักศึกษาชายส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 93.06 และเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 6.94 นักศึกษาชายส่วนใหญ่ไม่เคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 98.27 และเคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 1.73

ส่วนนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 85.99 และเคยรู้จักบุคคลที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 14.01 นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 96.62 และเคยมีประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 3.38 นักศึกษาหญิงที่มีประสบการณ์ทางเพศแล้ว มีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาหญิงไม่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษาหญิงไม่เคยฉีดยาเสพติดเข้าเส้น คิดเป็นร้อยละ 100

ศูนย์วิทยพัทธยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตอนที่ 2** ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 5 จำนวน และค่าร้อยละ ของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

เกณฑ์ระดับความรู้	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความรู้ระดับดีมาก (32.00-40.00 คะแนน)	1	0.30	0	0.00	1	0.48
มีความรู้ระดับดี (28.00-31.99 คะแนน)	49	12.90	15	8.67	34	16.43
มีความรู้ระดับปานกลาง (24.00-27.99 คะแนน)	113	29.70	58	33.53	55	26.57
มีความรู้ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (20.00-23.99 คะแนน)	119	31.30	55	31.79	64	30.92
มีความรู้ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (0.00-19.99 คะแนน)	98	25.80	45	26.01	53	25.60
รวม	380	100.00	173	100.00	207	100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ มีความรู้อยู่ในระดับคะแนน 20.00-23.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีความรู้อยู่ในระดับคะแนน 24.00-27.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.70

ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักศึกษาชายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีคะแนนอยู่ในระดับคะแนน 24.00-27.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.53 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ มีคะแนนอยู่ในระดับคะแนน 20.00-23.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.79

สำหรับนักศึกษาหญิง มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ มีความรู้อยู่ในระดับคะแนน 20.00-23.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.92 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีความรู้อยู่ในระดับคะแนน 24.00-27.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.57

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชาย กับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมายถึง ข้อใด	0.71	0.46	0.69	0.46	0.72	0.45	-0.56
2	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรง และยังไม่มียารักษาให้หายคืออะไร	0.84	0.37	0.91	0.29	0.78	0.41	3.45*
3	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่ ติดต่อได้ทั้งทางมีเพศสัมพันธ์และ ผ่านทางเลือด	0.34	0.47	0.47	0.47	0.37	0.49	-1.59
4	จากสถิติปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงอายุใด มากที่สุด	0.38	0.48	0.35	0.47	0.41	0.49	-1.27
5	โรคเอดส์หมายถึงข้อใด	0.80	0.41	0.77	0.42	0.81	0.39	0.77
6	เชื้อโรคเอดส์พบมากที่สุดที่ใด	0.67	0.47	0.68	0.47	0.66	0.47	0.52
7	เชื้อโรคเอดส์ มีลักษณะของการ แพร่เชื้อคล้ายกับโรคใด	0.31	0.46	0.25	0.44	0.35	0.48	-1.98*
8	อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยโรคเอดส์ คือข้อใด	0.70	0.46	0.68	0.47	0.70	0.46	-0.39
9	โรคเอดส์ติดต่อได้โดยวิธีใด	0.75	0.43	0.78	0.41	0.72	0.45	1.49



ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
10	กลุ่มที่ติดเชื้อโรคเอดส์ในเมืองไทย มากที่สุดขณะนี้คือข้อใด	0.32	0.47	0.31	0.47	0.33	0.47	-0.34
11	บุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ มากที่สุดคือข้อใด	0.66	0.48	0.64	0.48	0.67	0.47	-0.73
12	ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิต เนื่องจาก สาเหตุใดเป็นสำคัญ	0.85	0.36	0.93	0.25	0.78	0.41	4.27*
13	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่มี อันตรายร้ายแรงมากและสามารถ เป็นแต่กำเนิดได้	0.59	0.49	0.55	0.50	0.62	0.49	-1.46
14	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สามารถ ตรวจพบปฏิกิริยาต่อเชื้อได้จากตรวจ เลือดคือโรคใด	0.70	0.45	0.72	0.45	0.72	0.45	-0.05
15	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดมีชื่อ เรียกว่า "แพลริมแข็ง"	0.13	0.34	0.14	0.35	0.13	0.34	0.24
16	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดมี ชื่อเรียกว่า "ฝีมะม่วง"	0.25	0.42	0.27	0.44	0.20	0.40	1.57
17	โรคหนองในเทียมเกิดจากสาเหตุใด	0.37	0.48	0.37	0.48	0.37	0.48	-0.04
18	ข้อใดเป็นอาการของโรค หนองในเทียม	0.35	0.48	0.30	0.46	0.38	0.49	-1.75

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
19	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่ อาจทำให้ผู้ป่วยเป็นหมันได้	0.41	0.50	0.41	0.50	0.42	0.50	-0.10
20	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด ทำให้ปีกมดลูกของเพศหญิงอักเสบ ก่อรังไข่ติดตัน เป็นสาเหตุของการ ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือไม่สามารถ มีบุตรได้	0.31	0.46	0.24	0.43	0.37	0.49	-2.85*
21	มีหนองไหลทางท่อปัสสาวะ ชัดเบา หรือแสบล้าก ล้วงเวลาถ่ายปัสสาวะ คือ อาการของโรคใด	0.54	0.50	0.61	0.50	0.48	0.50	2.42*
22	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด ถ้า ไม่รีบรักษาให้หายขาด จะทำให้สถิติ ปัญหาเสื่อม เป็นอัมพาต และเป็น โรคระบบประสาทในที่สุด	0.48	0.50	0.50	0.50	0.47	0.50	0.66
23	มีอาการเป็นแผลเล็ก ๆ ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร ที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ขอบแผลกระรุ้งกระริ่ง คล้ายแผล							

## ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
24	เปื่อย เป็นอาการของโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด ต่อม้ำน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต เป็นฝี มีน้ำเหลืองไหล ลำไส้ใหญ่ ตอนล่างอักเสบ เป็นอาการของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.62	0.49	0.65	0.48	0.60	0.49	0.87
25	เป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะสืบพันธุ์ ที่ ขาหนีบ ฝึเย็บ ถ้าไม่รักษาจะทำลาย อวัยวะสืบพันธุ์ หรือลุกลามไปยังส่วน อื่นของร่างกาย เป็นอาการของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.57	0.50	0.58	0.49	0.56	0.49	0.55
26	มีตุ่มเล็ก ๆ ขึ้นเป็นกลุ่มที่บริเวณ อวัยวะสืบพันธุ์ ปวดแสบปวดร้อน ต่อมาตุ่มจะโตขึ้น มีน้ำใส ๆ แล้ว จะกลายเป็นหนอง เป็นอาการ เริ่มแรกของโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.41	0.49	0.35	0.48	0.46	0.50	-2.22*
27	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่เกิด จากเชื้อไวรัส มีลักษณะเป็นเนื้องอก	0.43	0.50	0.39	0.49	0.47	0.50	-1.59

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
	ที่อวัยวะสืบพันธุ์ และปลายท่อน้ำนม ถ้าไม่รักษาเนื้อที่งอกจะอักเสบมี กลิ่นเหม็นเน่า และมีเลือดไหล	0.38	0.49	0.41	0.49	0.36	0.48	0.96
28	แมลงตัวเล็ก ๆ ชอบอาศัยอยู่ตาม โคนขนในที่ลับ จะดูดเลือดบริเวณนั้น กิน ทำให้มีอาการคันบริเวณหัวหน่าว คือข้อใด	0.75	0.44	0.75	0.43	0.74	0.44	0.27
29	ซิฟิลิสระยะใดที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดกว่า ระยะอื่น	0.51	0.50	0.45	0.50	0.55	0.50	-1.94
30	บุคคลประเภทใด ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด	0.73	0.45	0.69	0.46	0.75	0.43	-1.31
31	การหยุดตาให้ทารกแรกเกิดด้วย ซิลเวอร์ไนเตรต เป็นการป้องกันการ การติดเชื้อของโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.29	0.45	0.25	0.43	0.32	0.47	-1.61
32	ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อยา รักษาเอง ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์คือ ข้อใด	0.56	0.50	0.58	0.50	0.43	0.50	1.02

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
33	ข้อใดต่อไปนี่ ที่ควรแนะนำให้ผู้ป่วย งดโดยเด็ดขาดระหว่างรักษาโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะจะ ทำลายฤทธิ์ของยาและจะทำให้ อาการรุนแรงขึ้น	0.46	0.50	0.50	0.50	0.43	0.50	1.21
34	วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ดีที่สุดคืออะไร	0.85	0.36	0.86	0.35	0.84	0.37	0.56
35	การเลือกใช้ถุงยางอนามัยควร พิจารณาข้อใด	0.82	0.38	0.83	0.38	0.82	0.38	0.14
36	วิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องคือข้อใด	0.41	0.49	0.38	0.49	0.43	0.50	-0.86
37	ถ้าท่านสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ท่านจะทำอะไรเป็น สิ่งแรก	0.84	0.37	0.83	0.38	0.85	0.36	-0.34
38	ถ้าบุคคลในบ้านของท่านป่วยเป็นโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านจะปฏิบัติตน อย่างไร	0.58	0.49	0.50	0.50	0.66	0.48	-3.18*
39	นักศึกษาจะช่วยควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหมู่นักศึกษาด้วยกันโดยวิธีใด	0.74	0.40	0.70	0.46	0.77	0.42	-1.63

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
40	เมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราจะรับการตรวจรักษาได้ที่ใด	0.81	0.38	0.80	0.40	0.85	0.36	-1.20
	รวม	22.22	18.12	21.89	17.91	22.35	18.25	-1.12

\*  $p < .05$  (.05  $t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ( $\bar{X} = 22.22$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนมากตอบได้ถูกต้องได้แก่ ข้อที่ 12, 34, 37 และ 2 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนน้อยตอบถูกต้อง ได้แก่ข้อ 15

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชาย กับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2, 7, 12, 20, 21, 25 และ 38 โดยนักศึกษาชายมีความรู้ดีกว่านักศึกษาหญิง ในข้อที่ 2, 12, 21, และนักศึกษาหญิงมีความรู้ดีกว่านักศึกษาชายในข้อที่ 7, 20, 25, และ 38


ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หมายถึงข้อใด	0.70	0.46	0.69	0.46	0.72	0.45	-0.56
2	จากสถิติปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยู่ในช่วงอายุใดมากที่สุด	0.38	0.48	0.35	0.47	0.41	0.49	-1.27
3	กลุ่มที่ติดเชื้อเอดส์ในเมืองไทยมากที่สุดขณะนี้คือข้อใด	0.32	0.47	0.31	0.47	0.33	0.47	-0.34
4	บุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์มากที่สุดคือข้อใด	0.66	0.48	0.64	0.48	0.67	0.47	-0.73
5	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สามารถตรวจพบปฏิกิริยาต่อเชื้อได้จากการตรวจเลือดคือข้อใด	0.70	0.45	0.72	0.45	0.72	0.45	-0.05
6	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่มีชื่อเรียกว่า "แผลริมแข็ง"	0.13	0.34	0.14	0.35	0.13	0.34	-0.24
7	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่มีชื่อเรียกว่า "ฝีมะม่วง"	0.23	0.42	0.27	0.44	0.20	0.40	1.57
	รวม	3.13	3.10	3.12	3.12	3.18	3.07	-0.54

$p > .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนรวม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ( $\bar{X} = 3.13$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนมากตอบถูกต้อง ได้แก่ ข้อที่ 1 และ 5 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนน้อยตอบถูกต้อง ได้แก่ข้อ 6, 7 และ 3 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชาย กับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ว่า นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ในด้านสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ	0.85	0.36	0.93	0.25	0.78	0.41	4.27*
2	โรคเอดส์หมายถึงอะไร	0.80	0.41	0.77	0.42	0.81	0.39	-0.77
3	โรคหนองในเทียมเกิดจากสาเหตุใด	0.37	0.48	0.37	0.48	0.37	0.48	-0.44
4	แมลงตัวเล็ก ๆ ชอบอาศัยอยู่ตามโคนขนในที่ลับ จะดูดเลือดบริเวณนั้นกิน ทำให้มีอาการคันบริเวณหัวหน้าว คือข้อใด	0.75	0.44	0.75	0.43	0.74	0.44	0.27
	รวม	2.77	1.69	2.82	1.58	2.70	1.72	1.33

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 8 พบว่า โดยส่วนรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.77$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความรู้นักศึกษาส่วนมากตอบถูกต้อง ได้แก่ข้อที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้นักศึกษาส่วนน้อยตอบถูกต้อง ได้แก่ ข้อที่ 3

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ในด้านสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้ ในด้านสาเหตุเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 1 โดยนักศึกษาชายมีความรู้ดีกว่านักศึกษาหญิง



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านอาการและอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยโรคเอดส์คือข้อใด	0.76	0.46	0.68	0.47	0.70	0.46	-0.39
2	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่มีอันตรายร้ายแรงมาก และสามารถเป็นแต่กำเนิดได้	0.59	0.49	0.55	0.50	0.62	0.49	-1.46
3	ข้อใดเป็นอาการของโรคหนองในเทียม	0.35	0.48	0.30	0.46	0.38	0.49	-1.75
4	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นหมันได้	0.41	0.50	0.41	0.50	0.42	0.50	-0.10
5	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดทำให้ปีกมดลูกของเพศหญิงอักเสบ ท่อรังไข่ตีตันเป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือไม่สามารถมีบุตรได้	0.31	0.46	0.24	0.43	0.37	0.49	-2.85*
6	อาการมีหนองไหลทางท่อปัสสาวะ ขัดเบา หรือแสบล้าก้อง เวลาถ่ายปัสสาวะคือ อาการของโรคใด	0.54	0.50	0.61	0.50	0.48	0.50	2.42*

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
7	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดถ้า ไม่รับรักษาให้หายขาดจะทำให้ สติปัญญาเสื่อมเป็นอัมพาต และ เป็นโรคระบบประสาทในที่สุด	0.48	0.50	0.50	0.50	0.47	0.50	0.66
8	อาการเป็นแผลเล็ก ๆ ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร ที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ขอบแผลกระรุ้งกระริ่งคล้ายแผล เปื่อย เป็นอาการของโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.62	0.49	0.65	0.48	0.60	0.49	0.87
9	ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต เป็นฝี มีน้ำเหลืองไหล ลำไส้ใหญ่ ตอนล่างอักเสบ เป็นอาการของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.57	0.50	0.58	0.49	0.56	0.49	0.55
10	เป็นแผลเรื้อรัง ที่อวัยวะสืบพันธุ์ที่ ขาหนีบ ฝีเย็บ ถ้าไม่รักษาจะทำลาย อวัยวะสืบพันธุ์ หรือลุกลามไปยัง ส่วนอื่นของร่างกาย เป็นอาการ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.41	0.49	0.35	0.48	0.46	0.50	-2.22*

## ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
11	ตุ่มเล็ก ๆ ขึ้นเป็นกลุ่มที่บริเวณ อวัยวะสืบพันธุ์ ปวดแสบปวดร้อน ต่อมาตุ่มจะโตขึ้น มีน้ำใส ๆ แล้ว จะกลายเป็นหนอง เป็นอาการ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชนิดใด	0.43	0.50	0.39	0.49	0.47	0.50	-1.59
12	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่ เกิดจากเชื้อไวรัส มีลักษณะเป็น เนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์ และปลาย ท่อน้ำสภาวะ ถ้าไม่รักษาเนื้อที่งอก จะอักเสบมีกลิ่นเหม็นเน่าและมี เลือดไหล	0.38	0.49	0.41	0.49	0.36	0.48	0.96
	รวม	5.85	5.86	5.67	5.79	5.89	5.89	-1.07

\*  $p < .05$  (.05  $t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับอาการและอันตรายของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ( $\bar{X} = 5.85$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนมากตอบถูกได้แก่ข้อที่ 1 และ 8 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้ที่นักศึกษา ส่วนน้อยตอบถูกต้องได้แก่ ข้อที่ 5, 3 และ 12 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ในด้านอาการและอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้ในด้านอาการและอันตราย ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 4, 5, 6 และ 10 โดยนักศึกษาชายที่มีความรู้ดีกว่านักศึกษาหญิงในข้อที่ 6 และนักศึกษาหญิง มีความรู้ดีกว่านักศึกษาชาย ในข้อที่ 4, 5 และ 10

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ข้อใดที่ติดต่อได้ทั้งทางเพศสัมพันธ์และผ่านทางเลือด	0.34	0.47	0.29	0.46	0.37	0.49	-1.59
2	เชื้อโรคเอดส์พบมากที่สุดที่ใด	0.67	0.47	0.68	0.47	0.66	0.47	0.52
3	เชื้อโรคเอดส์มีลักษณะการแพร่เชื้อคล้ายกับโรคใด	0.31	0.46	0.25	0.44	0.35	0.48	-1.98*
4	โรคเอดส์ติดต่อได้โดยวิธีใด	0.75	0.43	0.78	0.41	0.72	0.45	1.49
5	ชนิดลีลระยะใดที่ติดต่อง่ายที่สุดกว่าระยะอื่น	0.51	0.50	0.45	0.50	0.55	0.50	-1.94
6	บุคคลประเภทใดเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด	0.73	0.45	0.69	0.46	0.75	0.43	-1.31
	รวม	3.31	2.78	3.14	2.74	3.40	2.82	-1.74

\*p > .05 (.05  $t_{\infty} = \pm 196$ )

จากตารางที่ 10 พบว่า โดยส่วนรวม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ( $\bar{X} = 3.31$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนมากตอบได้ถูกต้องได้แก่ ข้อที่ 4 และ 6 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้ที่นักศึกษาส่วนน้อยตอบถูกต้องได้แก่ข้อที่ 3 และ 1 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ในด้านการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมและรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้ในด้านการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ข้อได้แก่ ข้อที่ 3 โดยนักศึกษาหญิงมีความรู้ดีกว่านักศึกษาชาย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านการป้องกันและรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรง และยังไม่มีการรักษาให้หายคืออะไร	0.84	0.37	0.91	0.29	0.78	0.41	3.45*
2	การหยอดตาให้ทารกด้วยซิลเวอร์ไนเตรท เป็นการป้องกันการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใด	0.29	0.45	0.25	0.43	0.32	0.47	-1.61
3	ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อยา รักษาเองต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือข้อใด	0.56	0.50	0.58	0.50	0.43	0.50	1.02
4	ข้อใดต่อไปนี้ ที่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยงดโดยเด็ดขาดระหว่างรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะจะทำให้ทำลายฤทธิ์ของยาและจะทำให้อาการรุนแรงขึ้น	0.46	0.50	0.50	0.50	0.43	0.50	1.21
5	วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้ผลดีที่สุดคือข้อใด	0.85	0.36	0.86	0.35	0.84	0.37	0.56
6	การเลือกใช้ถุงยางอนามัยควรพิจารณาข้อใด	0.82	0.38	0.83	0.38	0.82	0.38	0.14

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		7	วิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องคือข้อใด	0.41	0.49	0.38	0.49	
8	ถ้าท่านสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่านจะทำอะไรเป็น สิ่งแรก	0.84	0.37	0.83	0.38	0.85	0.86	-0.34
9	ถ้าบุคคลในบ้านของท่านป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านจะปฏิบัติตนอย่างไร	0.58	0.49	0.50	0.50	0.66	0.48	-3.18*
10	นักศึกษาจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาด้วยกันโดยข้อใด	0.74	0.40	0.70	0.46	0.77	0.42	-1.63
11	เมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราจะรับการตรวจรักษาได้ที่ใด	0.81	0.38	0.80	0.40	0.85	0.36	-1.20
	รวม	7.20	4.69	7.14	4.64	7.18	5.25	-0.78

\*  $p < .05$  (.05 t  $\infty = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนรวม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 7.20$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความรู้นักศึกษาส่วนมากตอบได้ถูกต้อง ได้แก่ข้อที่ 5, 1, 8 และ 6 ตามลำดับ ส่วนข้อความรู้นักศึกษาส่วนน้อยตอบถูกต้อง ได้แก่ข้อที่ 2

เมื่อเปรียบเทียบความรู้ในด้านการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้ในด้านการป้องกัน และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 และ 9 โดยนักศึกษาชายมีความรู้ดีกว่านักศึกษาหญิง ในข้อที่ 1 และนักศึกษาหญิงมีความรู้ดีกว่านักศึกษาชายในข้อที่ 9

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นรายด้านระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.13	3.10	3.12	3.12	3.18	3.07	-0.54
		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		
2	สาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.77	1.69	2.82	1.58	2.7	1.72	1.33
		(ปานกลาง)		(ปานกลาง)		(ปานกลาง)		
3	อาการและอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	5.85	5.86	5.67	5.79	5.89	5.89	-1.70
		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		(ต่ำกว่าเกณฑ์)		
4	การติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.31	2.78	3.14	2.74	3.40	2.82	-1.74
		(ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ)		(ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ)		(ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ)		

ตารางที่ 12 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
5	การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	7.20	4.69	7.14	4.68	7.18	5.25	-0.78
		(ปานกลาง)		(ปานกลาง)		(ปานกลาง)		
	รวม	22.82	18.12	21.89	17.91	22.35	18.25	-1.12

$p > .05$  (.05  $t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ( $\bar{X} = 22.22$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความรู้ทั่วไปและอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ด้านสาเหตุและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นรายด้านระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวม และในแต่ละด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### ตอนที่ 3 ทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 13 จำนวนและค่าร้อยละของทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์ระดับทักษะคดี	ค่าเฉลี่ย	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทักษะคดีระดับดีมาก	3.50-4.00	6	1.60	2	1.16	4	1.93
ทักษะคดีระดับดี	2.50-3.49	351	92.40	116	95.95	185	89.37
ทักษะคดีระดับพอใช้	1.50-2.49	23	6.10	5	2.89	18	8.70
ทักษะคดีระดับต้องปรับปรุง	1.00-1.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม		380	100.00	173	100.00	207	100.00

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมา มีทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็น ร้อยละ 6.10

ทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาชายส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น ร้อยละ 95.95 รองลงมา มีทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.89

สำหรับนักศึกษาหญิงมีทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 89.37 รองลงมา มีทักษะคดีเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8.7

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		1**	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดกับผู้ที่สำล่อนทางเพศเท่านั้น	2.25	0.87	2.19	0.88	
2	โรคเอดส์เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หาย	3.65	0.59	3.64	0.63	3.65	0.55	-0.17
3**	ยุ่งสามารถนำเชื้อโรคเอดส์	2.99	0.93	3.05	0.92	2.93	0.93	1.26
4**	ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว กินสาเกจะทำให้อาการของโรคกำเริบ	2.20	0.77	2.19	0.85	2.21	0.69	-0.28
5**	ผู้ชายเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา	2.86	0.90	2.73	0.86	2.97	0.92	-2.58*
6**	ไม่ควรคบค้าสมาคมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.63	0.78	2.69	0.77	2.58	0.79	1.35
7**	ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ	2.35	0.97	2.50	0.96	2.21	0.95	2.95*
8	ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	3.45	0.74	3.43	0.79	3.46	0.71	-0.47

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		9**	เมื่อป่วยเป็นกามโรคไม่จำเป็นต้อง รักษาเพราะกามโรคจะหายเองได้	3.37	0.95	3.29	0.98	
10	เมื่อป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์แล้วไม่ควรปิดบังแพทย์เพราะ แพทย์ช่วยเหลือท่านได้	3.54	0.76	3.57	0.69	3.51	0.81	0.85
11**	ใส่ถุงยางอนามัยจะทำให้ความรู้สึก ทางเพศลดลง	2.62	0.89	2.40	0.81	2.80	0.92	-4.51*
12	ไม่ควรใช้สิ่งของ เครื่องใช้ และ เครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้ป่วยเป็น กามโรค	3.22	0.79	3.16	0.80	3.28	0.77	-1.48
13**	เมื่อเคยเป็นโรคซิฟิลิสแล้ว ร่างกาย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้ได้	2.81	0.83	2.71	0.83	2.90	0.82	-2.21*
14**	ผู้หญิง เป็นฝ่ายที่แพร่เชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าเพศชาย	2.36	0.91	2.23	0.85	2.46	0.94	-2.51*
15**	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเฉพาะ วัยเจริญพันธุ์เท่านั้น	2.93	0.78	2.95	0.76	2.91	0.80	0.51
16	กามโรคยังไม่มียาหรือวัคซีนใช้เพื่อ ป้องกัน	2.34	0.78	2.34	0.80	2.34	0.77	-0.10



ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
17**	ผู้ที่หายจากการเป็นโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์คือ ไม่มีอาการของโรคแล้ว	2.55	0.75	2.51	0.81	2.58	0.68	-0.91
18**	คนที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์แล้วจะมีโอกาสติดเชื้อได้ ง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่เคยเป็น	2.27	0.78	2.35	0.79	2.21	0.77	1.68
19	ก่อนการสมรส คู่สมรส ควรไปตรวจ เลือดก่อน	3.43	0.75	3.40	0.72	3.45	0.77	-0.66
20	ไม่ควรร่วมเพศในขณะที่มีประจำเดือน เพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย	3.30	0.66	3.22	0.70	3.37	0.62	-2.19*
21	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ อันตราย บางโรคอาจทำให้เสีย ชีวิตได้	3.24	0.72	3.17	0.69	3.30	0.74	-1.70
22	การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ จะมีโอกาส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	3.04	0.79	2.98	0.77	3.09	0.81	-1.35
23	การเลิกสำส่อนทางเพศเป็นวิธี ป้องกันไม่เกิดโรคติดต่อทางเพศ- สัมพันธ์วิธีหนึ่ง	3.33	0.68	3.29	0.67	3.36	0.68	-0.90

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		24	เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะอาจเกิด อันตรายได้	3.34	0.72	3.24	0.74	
25	ผู้ที่สำล่อนทางเพศแม้ว่าจะไม่มีอาการ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ควร ไปให้แพทย์ตรวจเลือดและตรวจ ร่างกาย	3.41	0.67	3.31	0.70	3.49	0.63	-2.73*
26**	ผู้ที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ถือว่าไม่มีประสบการณ์	3.02	0.95	2.98	0.90	3.06	1.99	-0.88
27	การทำออรัลเซ็กส์มีโอกาสติดเชื้อโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	2.20	0.77	2.19	0.77	2.20	0.76	-0.09
28	การร่วมเพศกับเพศเดียวกัน เพศชาย มีโอกาสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากกว่าเพศหญิง	2.99	0.74	2.91	0.77	3.05	0.71	-1.91
29	การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่หญิง บริการจะทำให้ลดการระบาดของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.41	0.65	3.43	0.58	3.39	0.69	0.72

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
30	หญิงกับชายที่ให้บริการทางเพศมี โอกาสแพร่เชื้อโรคได้มากเท่า ๆ กัน	3.40	0.65	3.29	0.69	3.50	0.60	-3.16*
	รวม	2.95	0.24	2.91	0.25	2.98	0.23	-2.83*

\*  $p < .05$  (.05  $t_{\infty} = \pm 1.96$ )


\*\* ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางลบ

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนรวมมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 และข้อ 10 มีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดีจำนวน 21 ข้อ ได้แก่ข้อ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20-26 และ 28-30

นอกจากนั้นมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ข้อ 1, 4, 7, 14, 16, 18 และ 27

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงโดยส่วนรวมพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 7, 11, 13, 14, 20, 24, 25 และ 30 โดยนักศึกษาชายมีทัศนคติดีกว่านักศึกษาหญิงในข้อที่ 7 และนักศึกษาหญิงมีทัศนคติดีกว่า นักศึกษาชาย ในข้อที่ 5, 11, 13, 14, 20, 24, 25 และ 30



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับภาคนี้ยัตริวิชาชีวะ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		1	ยุงสามารถนำเชื้อโรคเอดส์	2.99	0.93	3.05	0.92	
2	ผู้ชายเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา	2.86	0.90	2.73	0.86	2.97	0.92	-2.58*
3	ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ	2.35	0.97	2.50	0.96	2.21	0.95	2.95*
4	ใส่ถุงยางอนามัยจะทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	2.62	0.89	2.40	0.81	2.80	0.92	-4.51*
5	เมื่อเคยเป็นโรคซิฟิลิสแล้ว ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้ได้	2.81	0.83	2.71	0.83	2.90	0.82	-2.21*
6	ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่แพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าเพศชาย	2.36	0.91	2.23	0.85	2.46	0.94	-2.51*
7	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น	2.93	0.78	2.95	0.76	2.91	0.80	0.51
8	คนที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่เคยเป็น	2.27	0.78	2.35	0.79	2.21	0.77	1.68

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
9	การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ จะมีโอกาส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	3.04	0.79	2.98	0.77	3.09	0.81	-1.35
10	ผู้ที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ถือว่าไม่มีประสบการณ์ ทางเพศ	3.02	0.95	2.89	0.90	3.06	1.99	-0.88
11	การร่วมเพศกับเพศเดียวกัน เพศชาย มีโอกาสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากกว่าเพศหญิง	2.99	0.74	2.91	0.77	3.05	0.71	-1.91
12	หญิงกับชายที่ให้บริการทางเพศมี โอกาสแพร่เชื้อโรคได้มากเท่า ๆ กัน	3.40	0.65	3.29	0.69	3.50	0.60	-3.16*
	รวม	2.80	0.33	2.76	0.31	2.84	0.35	-2.51*

\*  $p < .05$  (.05  $t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนรวมมีทัศนคติในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 2.80 เมื่อพิจารณาได้จำแนกเพศ  
พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในด้านความรู้ทั่วไป  
อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 2.76 และ 2.84 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติในด้านความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชายและ  
นักศึกษาหญิงมีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,  
3, 4, 5, และ 12

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านอาการและอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดกับผู้ที่ สำล่อนทางเพศเท่านั้น	2.25	0.87	2.19	0.88	2.29	0.86	-1.22
2	ถ้าป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วกินสาเก จะทำให้อาการของ โรคกำเริบขึ้น	2.20	0.77	2.19	0.85	2.21	0.69	-0.28
3	ผู้ที่หายจากการเป็นโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์คือ ไม่มีอาการของโรคแล้ว	2.55	0.75	2.51	0.81	2.58	0.68	-0.91
4	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ อันตราย บางโรคอาจทำให้เสีย ชีวิตได้	3.24	0.72	3.17	0.69	3.30	0.74	-1.70
5	เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ควรซื้อยากินเองเพราะอาจ เกิดอันตรายได้	3.34	0.72	3.24	0.74	3.43	0.69	-2.56*



ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
6	ผู้ที่สำล่อนทางเพศแม้ว่าจะไม่มีอาการ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ควร ไปให้แพทย์ตรวจเลือดและตรวจ ร่างกาย	3.41	0.67	3.31	0.70	3.49	0.63	-2.73*
	รวม	2.83	0.34	2.77	0.37	2.88	0.31	-3.32*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษา  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนรวมมีทัศนคติในด้านอาการและอันตรายของ  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 2.83 เมื่อพิจารณาโดยจำแนกเพศ  
พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนคติในด้านอาการ และอันตรายของโรคติดต่อทาง  
เพศสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 2.77 และ 2.88 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติในด้านอาการ และอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะ เห็น  
ได้ว่า นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ  
พิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 5 และ 6

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในด้านการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม (N = 380)		นักศึกษาชาย (N = 173)		นักศึกษาหญิง (N = 207)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
		1	โรคเอดส์เป็นโรคที่ยังไม่มียา รักษาให้หาย	3.65	0.59	3.64	0.63	
2	ไม่ควรคบค้าสมาคมกับผู้ป่วยที่เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.63	0.78	2.69	0.77	2.58	0.79	1.35
3	ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี เพศสัมพันธ์	3.45	0.74	3.43	0.79	3.46	0.71	-0.47
4	เมื่อป่วยเป็นกามโรคไม่จำเป็นต้อง รักษาเพราะกามโรคจะหายเองได้	3.37	0.95	3.29	0.98	3.44	0.93	-1.48
5	เมื่อป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วไม่ควรปิดบังแพทย์เพราะแพทย์ ช่วยเหลือท่านได้	3.54	0.76	3.57	0.69	3.51	0.81	0.85
6	ไม่ควรใช้สิ่งของ เครื่องใช้ และ เครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้ป่วยเป็น กามโรค	3.22	0.79	3.16	0.80	3.28	0.77	-1.48
7	กามโรคยังไม่มียาหรือวัคซีนใช้เพื่อ ป้องกัน	2.34	0.78	2.34	0.80	2.34	0.77	-0.10

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
8	ก่อนการสมรส คู่สมรส ควรไปตรวจ เลือดก่อน	3.43	0.75	3.40	0.72	3.45	0.77	-0.66
9	ไม่ควรร่วมเพศในขณะที่มีประจำเดือน เพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย	3.30	0.66	3.22	0.70	3.37	0.62	-2.19*
10	การเลิกสำส่อนทางเพศเป็นวิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีหนึ่ง	3.33	0.68	3.29	0.67	3.36	0.68	-0.90
11	การทำออร์สเท็กซ์มีโอกาสดูดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	2.20	0.77	2.19	0.77	2.20	0.76	-0.09
12	การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่หญิง บริการจะทำให้ลดการระบาดของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.41	0.65	3.43	0.58	3.39	0.69	0.72
	รวม	3.15	0.24	3.14	0.30	3.17	0.29	-1.01

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนรวมมีทัศนคติในด้านการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 3.15 เมื่อพิจารณาจำแนกเพศพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าเฉลี่ยทัศนคติเป็น 3.14 และ 3.17 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติในด้านการป้องกัน และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า มีทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 9

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นรายด้าน ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

ลำดับที่	ทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวม		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		t
		(N = 380)		(N = 173)		(N = 207)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.80	0.33	2.76	0.31	2.84	0.35	-2.51*
2	อาการและอันตรายเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2.83	0.34	2.77	0.37	2.88	0.31	-3.32*
3	การป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.15	0.30	3.14	0.30	3.17	0.29	-1.01
	รวม	2.95	0.24	2.91	0.25	2.98	0.23	-2.83*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนรวมมีทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยทศนคติเป็น 2.95 เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าเฉลี่ยทศนคติเป็น 2.91 และ 2.98 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นรายด้านระหว่าง นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง โดยส่วนรวมพบว่า มีทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนคติแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 และ 2 โดยนักศึกษาหญิงมีทัศนคติ ที่ดีกว่านักศึกษาชาย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย