

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ ผู้วิจัยได้นำสัญลักษณ์ทางสถิตินามาใช้ดังต่อไปนี้

| | | |
|------|---------|--|
| X | หมายถึง | คะแนนเฉลี่ย |
| S.D. | หมายถึง | คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| N | หมายถึง | จำนวนตัวอย่างประชากร |
| t | หมายถึง | ค่าทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรสองตัวเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจากตาราง |
| SS | หมายถึง | ค่าผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนยอกกำลังสอง |
| MS | หมายถึง | ส่วนเบี่ยงเบนยอกกำลังสองเฉลี่ย |
| F | หมายถึง | ค่าทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรหลัก 2 ตัวโดยตัวแปรเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจากการ |
| df | หมายถึง | ชั้นแห่งความเป็นอิสระ |

และสัญลักษณ์ที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการเสนอข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ

| | | |
|---|---------|----------------------------|
| A | หมายถึง | ระยะเวลาติดเต้านม |
| B | หมายถึง | ระยะเวลาติดเต้านม 7-10 วัน |
| C | หมายถึง | ระยะเวลาติดเต้านม 3 เดือน |

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ

- ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร แสดงในตารางที่ 1
- ตอนที่ 2 ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดเต้านมออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองในระยะเวลาติดเต้านม หลังติดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน เป็นรายชื่อ แสดงในตารางที่ 2-4

- ตอนที่ 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเคาน์มออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง จำแนกตามระยะเวลาที่ศึกษา แสดงในตารางที่ 5-6
- ตอนที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเคาน์มออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง จำแนกตามตัวแปรค่านผู้ป่วยในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา กังวลและอึดอัดไปนี้
- 4.1 ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี กับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 45 ปี แสดงในตารางที่ 7
 - 4.2 ผู้ป่วยที่เป็นโสด กับผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว แสดงในตารางที่ 8
 - 4.3 ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันคือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับปัจจุบันศึกษา และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงในตารางที่ 9-12
 - 4.4 ผู้ป่วยที่มีระยะการดำเนินของโรคมะเร็งเคาน์มแตกต่างกันคือ มะเร็งเคาน์มระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 แสดงในตารางที่ 13-14
 - 4.5 ผู้ป่วยที่มีอาชีพแตกต่างกัน คือ แม่บ้าน รับจ้าง รับราชการ กากยาย และกลิกรรม แสดงในตารางที่ 15-18

คุณภาพชีวภาพ
คุณภาพชีวภาพ

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร

ตารางที่ 1 ตัวอย่างประชากรจำแนกตามตัวแปรกันผู้ป่วยในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา

| สถานภาพ | A | | B | | C | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | จำนวน(คน) | รอยละ | จำนวน(คน) | รอยละ | จำนวน(คน) | รอยละ |
| อายุ | | | | | | |
| ≤ 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50.76 |
| > 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 46.24 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |
| สถานภาพสมรส | | | | | | |
| โสด | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22.58 |
| แต่งงาน | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77.42 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |
| การศึกษา | | | | | | |
| อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13.98 |
| ประถมศึกษา | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 51.61 |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34.41 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างประชากรจำแนกตามคัวแปรด้านผู้ป่วยในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา (ต่อ)

| สถานภาพ | A | | B | | C | |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน(คน) | ร้อยละ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
| ระยะของการดำเนินโรค | | | | | | |
| ระยะที่ 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30.11 |
| ระยะที่ 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 38.71 |
| ระยะที่ 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19.35 |
| ระยะที่ 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.83 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |
| อาชีพ | | | | | | |
| แม่บ้าน | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 46.23 |
| รับจ้าง | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20.43 |
| ค้าขาย | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.83 |
| รับราชการ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.83 |
| กสิกรรม | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.68 |
| รวม | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 |

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างประชากรของการศึกษาระดับนี้ เมื่อนำมาจำแนกตามคัวแปรด้านผู้ป่วยในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา ปรากฏว่าผู้ป่วยที่เป็นโสมีจำนวนน้อยกว่าผู้ป่วยที่ลงงานแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นแม่บ้าน สิ่งที่น่าสังเกตคือ จำนวนผู้ป่วยในระยะก่อนตัดเตือน และหลังตัดเตือน 7-10 วัน เท่ากับ 100 คน ส่วนจำนวนผู้ป่วยในระยะหลังตัดเตือน 3 เดือน ติดตามໄດ້ทั้งสิ้น 93 คน

ค่อนที่ 2 ความรู้สึกของบุปผายที่ตักเตาเมื่อออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองในระยะก่อน
ตักเตาเมื่อ หลังตักเตาเมื่อ 7-10 วัน และ 3 เดือน

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของบุปผายที่ตักเตาเมื่อออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง
ก่อนตักเตาเมื่อ เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ลิสต์คะแนนเฉลี่ย

| ลำดับที่ | ข้อที่ | ความรู้สึก | คะแนนเฉลี่ย | ระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้น |
|----------|--------|---|-------------|----------------------------|
| 1 | 12 | เครื่องใจที่คงสูญเสียเต้าเม | 2.76 | บุขครั้ง |
| 2 | 14 | สูญเสียลักษณะของความเป็นเหตุหนึ่งและความเป็น มนุษย์ | 2.59 | " |
| 3 | 6 | เต้าเมเสียความสวยงามไป | 2.52 | บางครั้ง |
| 4 | 13 | เป็นบุปผาร้ายที่คงถูกตักเตาเม | 2.39 | " |
| 5 | 23 | คุณค่าในตนของลงลง | 2.26 | " |
| 6 | 7 | ร่างกายไม่สมประกับเหมือนบุปผาผู้คนอื่น | 2.23 | " |
| 7 | 16 | คนเองเป็นที่น่ารังเกียจของบุคคลใกล้ชิด | 2.20 | " |
| 8 | 21 | อายที่จะให้บุปผาเห็นเท่านั้น (แมลง) | 2.11 | " |
| 9 | 8 | รู้ร่างไม่สวยงามเหมือนเดิม | 2.03 | " |
| 10 | 22 | บุปผาขั้นเดียวจะเสียที่เคยมองถูกตักเตาเมออก | 2.00 | " |
| 11 | 19 | อยากบีกความจริงเกี่ยวกับเรื่องเต้านนี้ให้หาย | 1.99 | " |
| 12 | 20 | อายเมื่อบุปผาว่าดูน่าดูดูดของลงลง | 1.99 | " |
| 13 | 10 | ไม่กล้าส่องกระจกบูรณะตนของลงลงเต้าเม (แมลง) ของคนเอง | 1.90 | " |
| 14 | 17 | ร่างกายอ่อนแอกเป็นภาระให้บุปผาน | 1.89 | " |
| 15 | 11 | รังเกียจเต้าเม (แมลง) ของคนเอง | 1.83 | " |
| 16 | 9 | บุคคลเป็นแบบเปล่งไปจากเดิม | 1.82 | " |
| 17 | 26 | ล้ามากในการเคือกสรวน้ำใส่เสื้อผ้า | 1.77 | " |
| 18 | 5 | ใช้แขนห้างน้ำบักไม่ให้เหมือนเดิม | 1.75 | " |
| 19 | 18 | ความสามารถที่จะให้ความสุขแก่สามี (บุคคลใกล้ชิด, คู่รัก) ลงลง | 1.69 | " |
| 20 | 15 | สูญเสียความนิสัยและแรงกิ่งถูกทางเพศ | 1.62 | " |
| 21 | 2 | กังวลว่าแขนห้างน้ำจะมีน้ำตกไม่เท่ากัน | 1.60 | " |
| 22 | 24 | กลัวว่าสามี (บุคคลใกล้ชิด, คู่รัก) ไม่ยอมรับการเปลี่ยน แปลงชั้นรุปป่าว | 1.59 | " |
| 23 | 25 | ระวังบุคคลในครอบครัวไม่รักเหมือนเดิม | 1.59 | " |
| 24 | 4 | เวลาเกินลักษณะการแก่งแข่งไม่เหมือนปกติ | 1.57 | " |
| 25 | 3 | เวลาซึ่ง ยืน หรือเกิน ให้ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน | 1.52 | ไม่มี |
| 26 | 1 | กังวลว่าทรงอกไม่เท่ากัน | 1.46 | " |
| รวม | | | 1.95 | บางครั้ง |

ตารางที่ 3 ระดับความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตักเตือนออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง
หลังคัตเต้าม 7-10 วัน เรียงลำดับความเด่นชัดลิบลากแน่นเฉลี่ย

| ลำดับที่ | ชื่อหัว | ความรู้สึก | ระดับเฉลี่ย | ระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้น |
|----------|---------|--|-------------|----------------------------|
| 1 | 12 | 渺茫ใจท่องสูญเสียเต้าม | 3.17 | บอยครั้ง |
| 2 | 14 | สูญเสียลัญญาติของความเป็นเพศหญิงและความเป็น มารดา | 2.90 | " |
| 3 | 6 | ເຕາມເສີຍຄວາມສ່ວຍງານໄປ | 2.83 | " |
| 4 | 13 | ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຂອງດູກຕັກເຕຳມ | 2.62 | " |
| 5 | 7 | ຮ່າງກາຍໄນ້ສົມປະກອບເໜືອນໝູງຄອນ | 2.60 | " |
| 6 | 23 | ຄຸ້ມຄາໃນຕະເອງສົກລົງ | 2.60 | " |
| 7 | 24 | ກົດວ່າສາມີ (ນຸ້າຄລິກລື້ອືກ, ຖູ້ຽກ) ໄນຍົມຮັກພາ ເປັນຜູ້ແປ່ງຂອງຮູ່ປ່າງ | 2.47 | ບາງກັງ |
| 8 | 5 | ໃຊ້ແຂນທຳງານັກໄນ້ໄກ້ເໝືອນເກີນ | 2.43 | " |
| 9 | 15 | ສູ່ຜູ້ເສີຍຄວາມມີເສັ່ນໜີແລະແຮງກຶງຖຸກທາງເສັກ | 2.20 | " |
| 10 | 21 | ອາຍທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນເຕຳມ (ແພດ) | 2.19 | " |
| 11 | 11 | ຮັງເກີຍຈາເຕຳມ (ແພດ) ຂອງຄົນເອງ | 2.04 | " |
| 12 | 20 | ອາຍເມື່ອຜູ້ອື່ນຮູ່ວ່າຄົນເອງດູກຕັກເຕຳມອອກ | 1.98 | " |
| 13 | 8 | ຮູ່ປ່າງໄນ້ສ່ວຍງານເພື່ອນເກີນ | 1.92 | " |
| 14 | 19 | ອົບາກປົກຄວາມຈົງຈຽງເກີຍກັນເຮືອງເຕຳມໄນ້ໃຫ້ໄປຮູ່ | 1.84 | " |
| 15 | 17 | ຮ່າງກາຍອອນແລະເປັນກາະໃຫ້ຜູ້ອື່ນ | 1.83 | " |
| 16 | 16 | ຄົນເອງເປັນທີ່ນໍາຮັງເກີຍຈາອຸນນຸ້າຄລິກລື້ອືກ | 1.82 | " |
| 17 | 3 | ເວລານັ້ນ ຢືນ ຮົວເກີນ ໄທ້ຮັ້ງສອງໜ້າໃນເທົ່າກັນ | 1.81 | " |
| 18 | 9 | ນຸ້າຄລິກເປັນຜູ້ແປ່ງໄປຈາກເກີນ | 1.75 | " |
| 19 | 22 | ຫຼູ້ອື່ນນັ້ນແລະເບາະເບັ້ນທີ່ຄົນເອງດູກຕັກເຕຳມອອກ | 1.74 | " |
| 20 | 1 | ກັງວລວ່າກຽງອົກໄນ້ເທົ່າກັນ | 1.71 | " |
| 21 | 18 | ຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສູ່ແກ່ສາມີ (ນຸ້າຄລິກລື້ອືກ, ປູ້ຽກ) ສົກລົງ | 1.63 | " |
| 22 | 25 | ຮະແວງນຸ້າຄລິກໃນຄຣອນຄວ້າໄນ້ຮັກເໜືອນເກີນ | 1.63 | " |
| 23 | 4 | ເວລາເກີນລັກນະການແກ່ງວ່າແຂນໄນ້ເໝືອນຄປົກ | 1.62 | " |
| 24 | 26 | ກຳນາກໃນການເລືອກສ່ວນໄສ່ເສື້ອບ້າ | 1.61 | " |
| 25 | 2 | ກັງວລວ່າແຂນທີ່ສອງໜ້ານີ້ນັກໄນ້ເທົ່າກັນ | 1.57 | " |
| 26 | 10 | ໄນ້ກຳສ່ອງກະຈຸນິວເວັມເຕຳມ (ແພດ) ຂອງຄົນເອງ | 1.53 | ໄມ້ນີ້ |
| รวม | | | 2.09 | ບາງກັງ |

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตักเทานมออกเกี่ยวกับภาพรักษ์ของคนเอง
หลังคัพเค้าแมม 3 เดือน เรียงลำดับตามเกณฑ์คัลิมคะแนนเฉลี่ย

| ลำดับที่ | ข้อที่ | ความรู้สึก | คะแนนเฉลี่ย | ระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้น |
|----------|--------|---|-------------|----------------------------|
| 1 | 23 | คุ้มค่าในคนเองลดลง | 2.75 | น้อยกว่า |
| 2 | 5 | ใช้แขนทำงานหนักไม่ได้เหมือนเดิม | 2.58 | " |
| 3 | 7 | ร่างกายไม่สมบูรณ์เมื่อตนยังคงคนอื่น | 2.57 | " |
| 4 | 12 | เสื่อมใจที่ต้องสูญเสียเค้าแมม | 2.56 | " |
| 5 | 26 | ล้ามากในการเลือกสรรรวมใส่เสื้อผ้า | 2.55 | บางครั้ง |
| 6 | 14 | สูญเสียสัญญาณของความเป็นเพศหญิงและความเป็น นารถ | 2.53 | " |
| 7 | 24 | กลัวว่าสาวนี (บุคคลใกล้ชิด, คู่รัก) ไม่ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงของรูปร่าง | 2.40 | " |
| 8 | 6 | เค้าแมมเสียความสุขงานไป | 2.33 | " |
| 9 | 13 | เบี้ยญโชครายที่ต้องถูกคัพเค้าแมม | 2.33 | " |
| 10 | 8 | รูปร่างไม่สวยงามเหมือนเดิม | 2.19 | " |
| 11 | 15 | สูญเสียความมีเสน่ห์และแรงดึงดูดทางเพศ | 2.05 | " |
| 12 | 21 | อายที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเค้าแมม (แยก) | 2.05 | " |
| 13 | 17 | ร่างกายอ่อนแอด้วยภาวะให้บุ้น | 1.94 | " |
| 14 | 20 | อายเมื่อยื่นรูปว่าคนเองถูกคัพเค้าแมม | 1.89 | " |
| 15 | 2 | กังวลว่าแขนหักสองซังนีขาดไม่เท่ากัน | 1.83 | " |
| 16 | 9 | บุคคลใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม | 1.78 | " |
| 17 | 16 | คนเองเป็นที่รังเกียจของบุคคลใกล้ชิด | 1.78 | " |
| 18 | 1 | กังวลว่าห่วงอกไม่เท่ากัน | 1.75 | " |
| 19 | 11 | รังเกียจเค้าแมม (แยก) ของคนเอง | 1.75 | " |
| 20 | 19 | อายกับความจริงเกี่ยวกับเรื่องเค้าแมมไม่ให้ครู่ | 1.74 | " |
| 21 | 22 | บุ้นขึ้นและเบี้ยน้ำที่คนเองถูกคัพเค้าแมมออก | 1.71 | " |
| 22 | 18 | ความสามารถที่จะให้ความสุขแก่สาวนี (บุคคลใกล้ชิด, คู่รัก) ลดลง | 1.67 | " |
| 23 | 4 | เวลาเก็บลักษณะการแก่งว่างแขนไม่เหมือนคนปกติ | 1.63 | " |
| 24 | 3 | เวลาอ้าง ยืน หรือเดิน ให้หักสองซังไม่เท่ากัน | 1.62 | " |
| 25 | 25 | ระหว่างบุคคลในครอบครัวไม่รักเหมือนเดิม | 1.47 | ไม่มี |
| 26 | 10 | ไม่กล้าส่องกระจากบุริเวณเค้าแมม (แยก) ของคนเอง | 1.37 | " |
| รวม | | | 2.03 | บางครั้ง |

จากตารางที่ 2, 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งสาม
ออกเกี่ยวกับภาพถ่ายของคนเองในระบบก่อนตัดเต้านม โดยส่วนรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
1.95 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ " บางครั้ง " และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ " บางครั้ง " ยกเว้นในข้อที่ 12 และข้อที่ 14 ซึ่งมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง " และพบว่าข้อที่ 12 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
" บ่อยครั้ง " สูงสุดในระบบนี้ โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ในระบบหลังตัดเต้านม
7-10 วัน พบร้าความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งสามออกเกี่ยวกับภาพถ่ายของคนเองโดย
ส่วนรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ " บางครั้ง " และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ " บางครั้ง " ยกเว้นใน
ข้อที่ 6, 7, 12, 13, 14 และข้อที่ 23 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง "
โดยค่าคะแนนเฉลี่ยในข้อที่ 12 อยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง " สูงสุดในระบบเท่ากับ 3.17
ส่วนในระบบหลังตัดเต้านม 3 เดือน พบร้า ความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งสามออกเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายของคนเองโดยส่วนรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ " บางครั้ง "
เริ่มเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ " บางครั้ง "
ยกเว้นในข้อที่ 5, 7, 12 และ 23 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง " โดย
ค่าคะแนนเฉลี่ยในข้อที่ 23 อยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง " สูงสุดในระบบเท่ากับ 2.75
เป็นที่สังเกตว่าความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งสามออกเกี่ยวกับภาพถ่ายของคนเองใน
ข้อที่ 12 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ " บ่อยครั้ง " ทั้งในระบบก่อนตัดเต้านม หลังตัด
เต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน และไม่ปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อความรู้สึกใดที่
อยู่ในระดับ " ตลอดเวลา " ทั้ง 3 ระยะที่ศึกษา



ตอนที่ 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดเต้านมออก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง จำแนกตามระยะเวลาที่ศึกษา

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดเต้านม
ออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง จำแนกตามระยะเวลาที่ศึกษา คือ ก่อน
ติดเต้านม หลังติดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน

| แหล่งความแปรปรวน | SS | df | MS | F |
|-----------------------|----------|-----|---------|---------|
| ระหว่างบุคคล | 31609.28 | 92 | | |
| ภายในบุคคล | 2688 | 186 | | |
| ทรีทเม้นท์ (ระยะเวลา) | 580.23 | 2 | 290.115 | 25.33** |
| ความคลาดเคลื่อน | 2107.77 | 184 | 11.455 | |
| รวม | 34297.28 | 278 | | |

$$^{**} P < .01$$

จากตารางที่ 5 ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดเต้านม
ออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองก่อนติดเต้านม หลังติดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จึงสันอิงสมมุติฐานของการวิจัย
ในข้อที่ 1

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ดับคู แสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเต้านมออก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองที่ลักษณะระหว่างระยะเวลาที่ศึกษา โดยใช้

Newman-Keuls Test

| | A | C | B |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | \bar{x}_1 50.65 | \bar{x}_3 52.92 | \bar{x}_2 54.54 |
| A | \bar{x}_1 | - | 2.27 ** |
| C | \bar{x}_3 | - | 1.62 ** |
| B | \bar{x}_2 | - | - |

| q | $\sqrt{\frac{MS_{res}}{\tilde{n}}}$ | r | 2 | 3 |
|--------------|-------------------------------------|---|------|------|
| $* P < .05$ | | | 0.99 | 1.18 |
| $** P < .01$ | | | 1.31 | 1.48 |

จากตารางที่ 6 แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเองในระยะหลังตัดเต้านมออก 7-10 วัน และ 3 เดือน เป็นไปใน
ทางลบมากกว่าในระยะก่อนตัดเต้านม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนอง
สมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 1.1 และ 1.2 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านม 3 เดือน เป็นไปใน
ทางลบน้อยกว่าในระยะหลังตัดเต้านม 7-10 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อ 1.3

ตอนที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตาออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง จำแนกตามตัวแปรด้านผู้ป่วยในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตาบนออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา จำแนกตามอายุ

| ระยะเวลาที่ศึกษา | ≤ 45 | | > 45 | | t |
|------------------|-----------|-------|-----------|------|---------|
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | |
| A | 56.74 | 9.06 | 43.48 | 6.06 | 8.45*** |
| B | 60.52 | 8.59 | 47.39 | 6.62 | 8.47*** |
| C | 59.92 | 11.15 | 44.60 | 6.02 | 8.06*** |

 $P < .001$

จากตารางที่ 7 ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ทั้งในระยะก่อนตัดเตาบน หลังตัดเตาบน 7-10 วัน และ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงสนองสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 2

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง ในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา จำแนกตามสถานภาพสมรส

| ระยะเวลาที่ศึกษา | โสด | | แต่งงาน | | t |
|------------------|-----------|------|-----------|-------|-------|
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | |
| A | 49.65 | 7.73 | 50.94 | 10.86 | 0.53 |
| B | 53.22 | 7.31 | 54.86 | 10.81 | 0.68 |
| C | 48.24 | 8.06 | 54.18 | 12.50 | 2.05* |

* $P < .05$

จากตารางที่ 8 ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วมีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่เป็นโสด เนพะในระยะหลังตัดเตือนม 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสนองสมมุติฐานของ การวิจัยในข้อที่ 3 ส่วนในระยะก่อนตัดเตือนและหลังตัดเตือน 7-10 วัน พบร่วมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยย่างไร จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตาบนออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเงง ในแต่ละระยะ เวลาที่ศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

| ระยะ เวลาที่ศึกษา | แหล่งความแปรปรวน | df | SS | MS | F |
|-------------------|------------------|----|----------|--------|----------|
| A | ระหว่างกลุ่ม | 2 | 1789.73 | 894.87 | 9.98 *** |
| | ภายในกลุ่ม | 97 | 8701.31 | 89.70 | |
| | รวม | 99 | 10491.04 | | |
| B | ระหว่างกลุ่ม | 2 | 1371.17 | 685.58 | 7.46 ** |
| | ภายในกลุ่ม | 97 | 8909.79 | 91.85 | |
| | รวม | 99 | 10280.96 | | |
| C | ระหว่างกลุ่ม | 2 | 1952.22 | 976.11 | 7.82 *** |
| | ภายในกลุ่ม | 90 | 11240.36 | 124.89 | |
| | รวม | 92 | 13192.58 | | |

** $P < .01$

*** $P < .001$

จากตารางที่ 9 ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตาบนออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเงง ระหว่างผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในระยะก่อนตัดเตาบน หลังตัดเตาบน 7-10 วัน และ 3 เดือน ที่ระดับ .001, .01 และ .001 ตามลำดับ จึงสนองสมบูรณ์ของ การวิจัย ในข้อที่ 4

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ลงทะเบียนในระยะก่อนตัดเตาบน ระยะหลังตัดเตาบน 7-10 วัน และระยะหลังตัดเตาบน 3 เดือน แสดงในตารางที่ 10, 11 และ 12 ตามลำดับ

ตารางที่ 10 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตาบนอก เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองที่ลดลงตามระดับการศึกษา ในระดับก่อนตัดเตาบน โดยใช้ Newman-Keuls Test

| | อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาชั้นปี |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | \bar{x}_1 41.69 | \bar{x}_2 50.92 | \bar{x}_3 54.55 |
| อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ \bar{x}_1 | - | 9.23 ** | 12.86 ** |
| ประถมศึกษา \bar{x}_2 | - | - | 3.63 |
| มัธยมศึกษาชั้นปี \bar{x}_3 | - | - | - |
| <hr/> | | | |
| q $\sqrt{\frac{MS_w}{n}}$ | r | 2 | 3 |
| <hr/> | | | |
| * $P < .05$ | | 5.15 | 6.18 |
| ** $P < .01$ df = 97 | | 6.83 | 7.76 |

จากตารางที่ 10 แสดงว่าในระดับก่อนตัดเตาบนผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี และผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ต่างกันค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมบูรณ์ของ การวิจัยในข้อที่ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองระหว่างผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี กับผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท้อย่างใด จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 4.3

ตารางที่ 11 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองที่ละคุณระดับการศึกษา ในระยะหลังตัด
เตือน 7-10 วัน โดยใช้ Newman-Keuls Test

| อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาขึ้นไป |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| \bar{x}_1 46.81 | \bar{x}_2 54.55 | \bar{x}_3 58.09 |
| อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ \bar{x}_1 | - | 7.74 ** 11.28 ** |
| ประถมศึกษา \bar{x}_2 | - | - 3.54 |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป \bar{x}_3 | - | - |
| $q \sqrt{\frac{MS_V}{n}}$ | r | 2 3 |
| $* P < .05$ | 5.23 | 6.27 |
| $** P < .01 df = 97$ | 6.93 | 7.87 |

จากการที่ 11 แสดงว่าในระยะหลังตัดเตือน 7-10 วัน ผู้ป่วยที่มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาต่างกันมีค่าเฉลี่ย
ความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสนองสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 4.1 และ
4.2 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองระหว่างผู้ป่วยที่มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป กับผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมาก จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 4.3

ตารางที่ 12 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองที่ละคุณธรรมระดับการศึกษา ในระยะหลังตัดเตือน 3 เดือน โดยใช้ Newman-Keuls Test

| | อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาขั้นไป | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----|
| \bar{x}_1 | 43.85 | \bar{x}_2 | 51.83 | \bar{x}_3 | 58 |
| อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ \bar{x}_1 | - | 7.98* | 14.15** | | |
| ประถมศึกษา \bar{x}_2 | - | - | 6.17 | | |
| มัธยมศึกษาขั้นไป \bar{x}_3 | - | - | - | | |

$$q = \sqrt{\frac{MS_w}{\tilde{n}}}$$

| | | |
|---|---|---|
| r | 2 | 3 |
|---|---|---|

* $P < .05$ 6.52 7.83

** $P < .01$ df = 90 8.65 9.83

จากตารางที่ 12 แสดงว่าในระยะหลังตัดเตือน 3 เดือน ผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นไป และผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ค้างก์มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ จึงสนองสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองระหว่างผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นไป กับผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่อย่างใด จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 4.3

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ระหว่างผู้ป่วยที่มีระดับการดำเนินชีวิตของโรคระดับต่ำกับระดับต่ำกว่าระดับต่ำ ในการยกเว้นแต่ละคน ในระดับก่อนตัดเตือน หลังตัดเตือน
7-10 วัน และ 3 เดือน

| กระบวนการดำเนินชีวิตของโรค | A | | B | | C | |
|----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. | \bar{X} | S.D. |
| มะเร็งเต้านมระดับที่ 1 | 51.59 | 10.45 | 55.89 | 10.39 | 54.11 | 11.68 |
| มะเร็งเต้านมระดับที่ 2 | 50.18 | 9.11 | 53.63 | 8.58 | 52.5 | 10.16 |
| มะเร็งเต้านมระดับที่ 3 | 50.55 | 12.64 | 54.65 | 12.75 | 52.94 | 15.18 |
| มะเร็งเต้านมระดับที่ 4 | 50 | 8.33 | 53.55 | 8.83 | 50.55 | 11.29 |

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าทั้งในระดับก่อนตัดเตือน หลังตัดเตือน 7-10 วัน และ 3 เดือน คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับการดำเนินชีวิตของโรคระดับต่ำ รองลงมาได้แก่ ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 ตามลำดับ และน้อยที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับการดำเนินชีวิตของโรคระดับต่ำกว่าระดับต่ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเทาหมอกอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา จำแนกตามระยะการดำเนินของโรคมะเร็งเต้านม

| ระยะเวลาที่ศึกษา | แหล่งความแปรปรวน | df | SS | MS | F |
|------------------|------------------|----|----------|--------|------|
| A | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 39.29 | 13.09 | 0.12 |
| | ภายในกลุ่ม | 96 | 10451.75 | 108.87 | |
| | รวม | 99 | 10491.04 | | |
| B | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 97.62 | 32.54 | 0.31 |
| | ภายในกลุ่ม | 96 | 10183.34 | 106.08 | |
| | รวม | 99 | 10280.96 | | |
| C | ระหว่างกลุ่ม | 3 | 107.23 | 35.74 | 0.24 |
| | ภายในกลุ่ม | 89 | 13085.35 | 147.03 | |
| | รวม | 92 | 13192.58 | | |

จากการที่ 14 ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเทาหมอกอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ระหว่างผู้ป่วยที่มีระยะการดำเนินของโรคมะเร็งเต้านมแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในระยะก่อนตัดเต้านม หลังตัดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน จึงปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 5

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเท่านมออก เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระบบเวลาที่ศึกษา จำแนกตามอาชีพ

| ระบบเวลาที่ศึกษา | แหล่งความแปรปรวน | df | SS | MS | F |
|------------------|------------------|----|----------|--------|--------|
| A | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 1145.12 | 286.28 | 2.91* |
| | ภายในกลุ่ม | 95 | 9345.92 | 98.38 | |
| รวม | | 99 | 10491.04 | | |
| B | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 1288.72 | 322.18 | 3.40* |
| | ภายในกลุ่ม | 95 | 8992.24 | 94.66 | |
| รวม | | 99 | 10280.96 | | |
| C | ระหว่างกลุ่ม | 4 | 1999.61 | 499.90 | 3.93** |
| | ภายในกลุ่ม | 88 | 11192.97 | 127.19 | |
| รวม | | 92 | 13192.58 | | |

* $P < .05$

** $P < .01$

จากการที่ 15 ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเท่านมออก เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ระหว่างผู้ป่วยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในระบบก่อนตัดเท่านม หลังตัดเท่านม 7-10 วัน และ 3 เดือน ที่ระดับ .05, .05 และ .01 ตามลำดับ จึงสนองสมมุติฐานของการวิจัยในข้อที่ 6

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้คูณในระบบก่อนตัดเท่านม ระยะหลังตัดเท่านม 7-10 วัน และระยะหลังตัดเท่านม 3 เดือน แสดงในตารางที่ 16,



ตารางที่ 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเคาน์มออก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองที่ลดลงตามอาชีพ ในระบบกันตัดเคาน์

โดยใช้ Newman-Keuls Test

| | กลิ่นธรรม | รับรู้ | แม่น้ำ | คำชาญ | รับราชการ |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | \bar{X}_5 45.6 | \bar{X}_2 49.48 | \bar{X}_1 49.76 | \bar{X}_3 52.5 | \bar{X}_4 59.09 |
| กลิ่นธรรม \bar{X}_5 | - | 3.88 | 4.16 | 6.9 | 13.49** |
| รับรู้ \bar{X}_2 | - | - | 0.28 | 3.02 | 9.61 |
| แม่น้ำ \bar{X}_1 | - | -- | - | 2.74 | 9.33* |
| คำชาญ \bar{X}_3 | - | - | - | - | 6.59 |
| รับราชการ \bar{X}_4 | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| $q_1 \sqrt{\frac{MS_w}{n}}$ | | | | | |
| r | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| * $P < .05$ | | | | | |
| ** $P < .01$ df = 95 | | | | | |
| 7.31 | | | | | |
| 8.74 | | | | | |
| 9.64 | | | | | |
| 10.25 | | | | | |
| 9.69 | | | | | |
| 11.01 | | | | | |
| 11.79 | | | | | |
| 12.36 | | | | | |

จากตารางที่ 16 แสดงว่าในระบบกันตัดเคาน์ ผู้ป่วยที่มีอาชีพรับราชการ
มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเอง ไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่มีอาชีพกลิ่นธรรม
และแม่น้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ นอกนั้นพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 17 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองที่ละคุณอาชีพ ในระบบหลังตัด
เตือน 7-10 วัน โดยใช้ Newman-Keuls Test

| กลิกรرم | รับจ้าง | แมบาน | ค้าขาย | รับราชการ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \bar{X}_5 48.6 | \bar{X}_2 53.09 | \bar{X}_1 53.74 | \bar{X}_3 56.75 | \bar{X}_4 63.09 |
| กลิกรرم \bar{X}_5 | - | 4.49 | 5.14 | 14.49** |
| รับจ้าง \bar{X}_2 | - | - | 0.65 | 3.66 10* |
| แมบาน \bar{X}_1 | - | - | - | 3.01 9.35 * |
| ค้าขาย \bar{X}_3 | - | - | - | - 6.34 |
| รับราชการ \bar{X}_4 | - | - | - | - |

| $q \sqrt{\frac{MS_w}{n}}$ | r | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|---|------|-------|-------|-------|
| * $P < .05$ | | 7.17 | 8.57 | 9.45 | 10.05 |
| ** $P < .01$ df = 95 | | 9.50 | 10.79 | 11.57 | 12.13 |

จากตารางที่ 17 แสดงว่าในระบบหลังตัดเตือน 7-10 วัน ผู้ป่วยที่มีอาชีพรับราชการ มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่มีอาชีพกลิกรرم รับจ้าง และแมบาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05 และ .05 ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 18 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดเต้านมออก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองที่จะคุยกับอาชีพ ในระยะหลังตัดเต้านม

3 เดือน ไนมาน-คิวลส์ Test

| | กลิกรนม | รับจ้าง | แม่บ้าน | ค้าขาย | รับราชการ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | \bar{x}_5 44.78 | \bar{x}_2 49.68 | \bar{x}_1 52.95 | \bar{x}_3 55.09 | \bar{x}_4 62.91 |
| กลิกรนม \bar{x}_5 | - | 4.48 | 8.17 | 10.31 | 18.13 ** |
| รับจ้าง \bar{x}_2 | - | - | 3.69 | 5.83 | 13.65 * |
| แม่บ้าน \bar{x}_1 | - | - | - | 2.14 | 9.96 |
| ค้าขาย \bar{x}_3 | - | - | - | - | 7.82 |
| รับราชการ \bar{x}_4 | - | - | - | - | - |

| $q_1 \sqrt{\frac{MS_w}{n}}$ | r | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| * $P < .05$ | | 8.61 | 10.31 | 11.36 | 12.08 |
| ** $P < .01$ df = 88 | | 11.43 | 12.99 | 13.92 | 14.59 |

จากตารางที่ 18 แสดงว่าในระยะหลังตัดเต้านม 3 เดือน ผู้ป่วยที่มีอาชีพรับราชการ มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่มีอาชีพกลิกรนมและรับจ้าง อย่างนี้ยังสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ นอกนั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05