

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อความสะดวกในการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการร่างต่าง ๆ ผู้วิจัย  
จึงนำสัญลักษณ์ทางสถิติมาใช้ดังต่อไปนี้

$\bar{X}$	หมายถึงคะแนนเฉลี่ย
S. D.	หมายถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N	หมายถึงจำนวนตัวอย่างประชากร
r	หมายถึงสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ ตัวแปร Y
p	หมายถึงระดับความมีนัยสำคัญ

การรายงานผลการวิจัยแบ่งการ เสนอผลการ วิจัยออกเป็น 3 ตอนดังนี้

- ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร เสนอเป็นคำอธิบาย
- ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการ  
ปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็ง ปากมคดในระหว่างรับการรักษา  
ด้วยรังสี
- ตอนที่ 3 ค่ามัธยฐานเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
รายชื่อที่แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็ง ปากมคดใน  
ระหว่างรับการรักษาด้วยรังสี

ตอนที่ 1 สถานภาพของตัวอย่างประชากร

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนของกลุ่มตัวอย่างประชากรแยกตาม อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา อาชีพ

สถานภาพของตัวอย่างประชากร	จำนวน	ร้อยละ
<b>อายุ</b>		
ต่ำกว่า 20 ปี	-	-
21 - 40 ปี	10	25
41 - 60 ปี	26	65
61 ปีขึ้นไป	4	10
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ระดับการศึกษา</b>		
ต่ำกว่าประถมศึกษา	18	45
ระดับประถมศึกษา	18	45
ระดับมัธยมศึกษา	4	10
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ภูมิลำเนา</b>		
ต่างจังหวัด	22	55
กรุงเทพมหานคร	18	45
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>อาชีพ</b>		
รับราชการ	1	2.5
ค้าขาย	6	15
งานบ้าน (แม่บ้าน)	11	27.5
เกษตรกรรวม	7	17.5
รับจ้าง	15	37.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

จากตาราง แสดงว่าตัวอย่างประชากรมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 65 ช่วงอายุ 21 – 40 ปี มีจำนวนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่มีเลย ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวนเท่ากันคือ คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนระดับมัธยมศึกษา มีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 10 มีภูมิลำเนาส่วนใหญ่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนอาชีพนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.5 อาชีพรองลงมาคืออาชีพงานบ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 17.5 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 15 และอาชีพรับราชการมีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มตัวอย่างประชากรแยกตามอายุเมื่อแต่งงาน สถานภาพสมรส  
จำนวนบุตรทั้งหมด และจำนวนบุตรที่อยู่ในความดูแล

สถานภาพของตัวอย่างประชากร	จำนวน	ร้อยละ
<b>อายุเมื่อแต่งงาน</b>		
15 - 18 ปี	15	37.5
19 - 22 ปี	20	50
23 - 26 ปี	4	10
27 - 30 ปี	1	2.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>สถานภาพสมรส</b>		
คู่ หม้าย	34	85
หย่า	4	10
หย่า	2	5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>จำนวนบุตรทั้งหมด</b>		
1 - 3 คน	12	30
4 - 6 คน	17	42.5
7 - 9 คน	8	20
10 คนขึ้นไป	3	7.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>จำนวนบุตรที่อยู่ในความดูแล</b>		
มี 1 - 2 คน	11	27.5
3 - 4 คน	12	30
5 คนขึ้นไป	3	7.5
ไม่มี -	14	35
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

จากตาราง แสดงว่าตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่แต่งงานเมื่ออายุ 19 – 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืออายุ 15 – 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนอายุ 27 – 30 ปี มีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.5 สถานภาพสมรสอยู่ในสภาพคู่เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 85 อยู่ในสภาพหย่าเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 5 จำนวนบุตรส่วนใหญ่มีบุตร 4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีบุตรรองลงมา 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีบุตร 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีบุตร 10 คนขึ้นไป มีเพียงส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.5 ส่วนจำนวนบุตรที่อยู่ในความดูแล ส่วนใหญ่มีจำนวน 3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา 1 – 2 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่วนน้อยมี 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.5 และผู้ที่ไม่มีบุตรอยู่ในความดูแล คิดเป็นร้อยละ 35

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพของสามี รายได้ของครอบครัว ประวัติการทราบ  
ว่าตนเองเป็นโรคอะไร ตลอดจนประวัติในการทำน้ำคั้นคอก รังไข่ ปีกมดลูก

สถานภาพของตัวอย่างประชากร	จำนวน	ร้อยละ
<b>อาชีพของสามี</b>		
รับราชการ	5	12.5
ค้าขาย	3	7.5
งานบ้าน	3	7.5
เกษตรกรรวม	6	15
รับจ้าง	17	42.5
ไม่มีอาชีพ (สามีตาย, หย่า)	6	1.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>รายได้ของครอบครัว</b>		
<b>ในเขตกรุงเทพมหานคร</b>		
ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน	3	7.5
2,000 - 5,000 บาทต่อเดือน	14	35
5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน	1	2.5
<b>ในต่างจังหวัด</b>		
ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน	10	25
2,000 - 5,000 บาทต่อเดือน	12	30
5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน	-	-
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>การรับทราบโรคที่เป็นอยู่</b>		
ทราบ	34	85
ไม่ทราบ	6	15
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ประวัติการทำน้ำคั้นคอก รังไข่ และปีกมดลูก</b>		
ทำแล้ว	2	5
ไม่ทำ	38	95
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

จากตาราง แสดงว่าตัวอย่างประชากรมีสามอาชีพที่จ้างเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนรายได้ของครอบครัวนั้นจะเห็นว่าในตัวอย่างประชากรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้ระหว่าง 2,000 – 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35 แต่ตัวอย่างประชากรจากต่างจังหวัดมีรายได้ระดับเดียวกันนี้คิดเป็นร้อยละ 30 และรายได้ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 7.5 ในต่างจังหวัดมีรายได้ระดับเดียวกันนี้คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนประวัติการทราบว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ นั้น ส่วนใหญ่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 85 และประวัติการทำผ่าตัดมดลูก รังไข่ และปีกมดลูก ส่วนใหญ่ยังไม่ทำ คิดเป็นร้อยละ 95



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มตัวอย่างประชากรแยกตามระยะของโรค ประวัติการรักษาก่อนเจ็บป่วยครั้งนี้ จากที่อื่น ประวัติการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากที่อื่น ประวัติการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากโรงพยาบาลที่รับการรักษายู่ในปัจจุบัน และรวมทั้งจำนวนวันที่รับการรักษากว้างสี่จนกระทั่งถึงวันสัมภาษณ์

สถานภาพของตัวอย่างประชากร	จำนวน	ร้อยละ
<b>ระยะของโรค</b>		
ระยะ 1A	2	5
ระยะ 2A	7	17.5
ระยะ 2B	22	55
ระยะ 3A	2	5
ระยะ 3B	5	12.5
ระยะ 4	2	5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ประวัติการรักษาก่อนเจ็บป่วยครั้งนี้จากที่อื่น</b>		
เคย	30	75
ไม่เคย	10	25
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ประวัติการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากที่อื่น</b>		
เคย (จากแพทย์)	12	30
เคย (จากพยาบาล)	13	32.5
ไม่เคย	15	37.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>ประวัติการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากโรงพยาบาลที่รับการรักษายู่ในปัจจุบัน</b>		
เคย (จากแพทย์)	6	15
เคย (จากพยาบาล)	9	22.5
เคย (จากเภสัชกร)	22	55
ไม่เคย	3	7.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
<b>จำนวนวันที่รับการรักษากว้างสี่จนกระทั่งถึงวันสัมภาษณ์</b>		
1 - 7 วัน	14	35
8 - 14 วัน	16	40
15 - 21 วัน	5	12.5
22 วันขึ้นไป	5	12.5
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>100</b>



จากตาราง แสดงว่าตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นมะเร็ิงปากมดลูก  
ในระยะ 2B คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือระยะ 2A คิดเป็นร้อยละ 17.5  
สถานประวัติการรักษากการเจ็บป่วยครั้งนี้จากที่อื่นมาก่อนนั้นส่วนใหญ่ได้รับการรักษา  
มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากที่อื่นนั้นส่วนใหญ่  
เคยได้รับจากพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาได้รับจากแพทย์ คิดเป็น  
ร้อยละ 30 ไม่เคยได้รับคำแนะนำ คิดเป็นร้อยละ 37.5 แต่เมื่อมารับการรักษา  
ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนจากเอกสาร คิดเป็น  
ร้อยละ 55 รองลงมาได้รับจากพยาบาล แพทย์ คิดเป็นร้อยละ 22.5, 15  
ตามลำดับ และจำนวนวันที่รับการรักษาด้วยรังสีจนกระทั่งถึงวันสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
อยู่ในช่วง 8 - 14 วัน คิดเป็นร้อยละ 40

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกา ปฏิบัติตนกับกา ปรับตัวของผู้อยู่  
มะ เริงป่ากมคตูกในระหว่างรับการ รักษาควยรังสีเป็นรายคาน

ตารางที่ 5 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวของผู้อยู่  
ปฏุมะ เริงป่ากมคตูกในระหว่างรับการ รักษาควยรังสีเป็นรายคานของ  
กลุ่มประชากรทั้งหมด

ตัวแปร	r
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวคานสรีรวิทยา	.44**
2. ความรู้เกี่ยวกับกา ปฏิบัติตนกับการปรับตัวคานอ้อมโนทัศน์	.27*
3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวคานบทบาทหน้าที่	.19
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวคานความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้อยู่ กับผู้อยู่อื่น	.24*

\*\*p < .01

\*p < .05

จากตาราง แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์  
กับค่าเฉลี่ยการปรับตัวของผู้อยู่มะ เริงป่ากมคตูกในระหว่างรับการ รักษาควยรังสีใน  
การปรับตัวคานสรีรวิทยา คานอ้อมโนทัศน์ คานความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้อยู่อย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05 และ .05 ตามลำดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติตนกับการปรับตัวของผู้อยู่มะ เริงป่ากมคตูกในระหว่างรับการ รักษาควยรังสี  
คานบทบาทหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติตนกับการปรับตัวคานสรีรวิทยา ซึ่งเท่ากับ .44 แล้วหมายความว่าความรู้เกี่ยวกับ  
กา ปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวคานสรีรวิทยาของผู้อยู่มะ เริงป่ากมคตูก  
ในระหว่างรับการ รักษาควยรังสี

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นซึ่งเท่ากับ .27 และ .24 ตามลำดับนั้นหมายความว่าความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นของผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสี

ส่วนการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ซึ่งเท่ากับ .19 นั้น หมายความว่าความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสี

ศูนย์วิทยพัชยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3      คำขวัญ เลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรายชื่อที่  
แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษา  
ด้วยรังสีในคานส์รีวิทยา

ตารางที่ 6      คำขวัญ เลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อที่  
แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษา  
ด้วยรังสีในคานส์รีวิทยา ซึ่งแบ่งออกเป็น คานอาหาร น้ำ การ  
ขับถ่าย การไหลเวียนของโลหิต การควบคุมอุณหภูมิ การทำ  
กิจกรรมและการพักผ่อน รวมทั้งอาการต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยมีในระหว่าง  
รับการรักษา

ข้อ	ลักษณะการปรับตัว	$\bar{X}$	SD	ระดับการปรับตัว
1.	อาหาร			
1.1	อาการเบื่ออาหาร	3.23	.66	เหมาะสมดี
1.2	อาการคลื่นไส้อาเจียน	3.15	.80	เหมาะสมดี
1.3	น้ำหนักตัวในปัจจุบัน	2.80	.14	เหมาะสมปานกลาง
2.	น้ำ			
2.1	ปริมาณน้ำดื่มใน 1 วัน	3.43	.78	เหมาะสมดี
3.	การขับถ่าย			
3.1	การถ่ายอุจจาระใน 1 วัน	3.60	.67	เหมาะสมดี
3.2	ลักษณะการถ่ายอุจจาระ	3.58	.68	เหมาะสมดี
3.3	การมีเลือดปนในอุจจาระ	3.88	.52	เหมาะสมดี
3.4	อาการท้องผูก	3.55	.68	เหมาะสมดี
3.5	อาการแน่นอึดอัดในท้อง	3.43	.75	เหมาะสมดี

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อ	ลักษณะการปรับตัว	$\bar{X}$	SD	ระดับการปรับตัว
3.6	การถ่ายปัสสาวะใน 1 วัน	2.53	1.20	เหมาะสมดี
3.7	วิธีการถ่ายปัสสาวะและจำนวนปัสสาวะในแต่ละวัน	3.58	.68	เหมาะสมดี
3.8	สีของปัสสาวะ	3.73	.51	เหมาะสมดี
4.	การไหลเวียนของโลหิต			
4.1	อาการหน้ามืดและเวียนศีรษะ	3.33	.83	เหมาะสมดี
5.	การควบคุมอุณหภูมิ			
5.1	อาการปวดศีรษะ	3.48	.60	เหมาะสมดี
5.2	ความรู้สึกตัวร้อนครันเนื้อครันตัว	3.55	.68	เหมาะสมดี
6.	การทำกิจกรรมและการพักผ่อน			
6.1	การทำกิจกรรมส่วนตัว	3.20	1.32	เหมาะสมดี
6.2	การทำกิจกรรมในเวลาว่าง	3.35	.83	เหมาะสมดี
6.3	ความสามารถในการทำงานบ้านบางส่วน	3.03	1.05	เหมาะสมดี
6.4	ความสามารถในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพ	2.83	1.15	เหมาะสมดี
6.5	การออกกำลังกาย	3.40	.93	เหมาะสมดี
6.6	การนอนหลับ	3.25	.81	เหมาะสมดี
7.	อาการต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยในระหว่างรับการรักษา ควยรังสี			
7.1	อาการอ่อนเพลีย	2.90	.84	เหมาะสมดี
7.2	อาการปวดท้องน้อย	3.58	.59	เหมาะสมดี
7.3	อาการตกขาว	3.70	.56	เหมาะสมดี
7.4	อาการเลือดออกทางช่องคลอด	3.65	.66	เหมาะสมดี

จากตาราง แสดงว่าการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีค้ำนส์รีวิทยาเหมาะสมคือ สำหรับข้อที่มีค่ามัธยิมเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.88 คือข้อ 3.3 (การมีเลือดปนในอุจจาระ) ส่วนข้อที่มีค่ามัธยิมเลขคณิตต่ำสุดเท่ากับ 2.53 คือข้อ 3.6 (การถ่ายปัสสาวะใน 1 วัน)

หมายเหตุ

ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยสูงแสดงถึงการปรับตัวอยู่ในระดับเหมาะสม คะแนนเป็น 4 แสดงถึงการปรับตัวเหมาะสมมากที่สุด คะแนนเป็น 1 แสดงถึงการปรับตัวไม่เหมาะสม

เมื่อพิจารณาค่ามัธยิมเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.88 แล้ว หมายความว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวค้ำนส์รีวิทยาในข้อที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดปนในอุจจาระได้ดีกว่าการปรับตัวค้ำนส์รีวิทยาในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด

สำหรับค่ามัธยิมเลขคณิตต่ำสุดเท่ากับ 2.53 แล้ว หมายความว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวค้ำนส์รีวิทยาในข้อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายปัสสาวะใน 1 วัน ได้น้อยกว่าการปรับตัวค้ำนส์รีวิทยาในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด



ตารางที่ 7 ความซึมซับเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ  
ที่แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกในระหว่างรับการรักษา  
ด้วยรังสีในสถานอ้อมโนทัศน์

ข้อ	ลักษณะการปรับตัว	$\bar{X}$	SD	ระดับการปรับตัว
1.	ความรู้สึกรู้สึกพอใจในรูปร่างและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่เป็นอยู่	2.70	.94	เหมาะสม
2.	ความสนใจและเอาใจใส่ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ	3.60	.67	เหมาะสม
3.	ความรู้สึกรู้สึกเศร้าเสียใจเมื่อนึกถึงโรคที่ตนเป็นอยู่	2.88	.69	เหมาะสม
4.	ความวิตกกังวลและกลัวว่าสามีจะได้รับความสุขทางเพศน้อยลง	3.43	.98	เหมาะสม
5.	ความรู้สึกรู้สึกว่าตนเองเป็นปัญหาต่อครอบครัว	3.65	.70	เหมาะสม
6.	ความรู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายตนเองที่มีความสามารถในการทำงานน้อยลงกว่าเดิม	3.30	.71	เหมาะสม
7.	ความรู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน	3.52	.64	เหมาะสม
8.	ความรู้สึกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อครอบครัว	3.05	1.01	เหมาะสม
9.	ความรู้สึกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม	2.75	1.02	เหมาะสม

จากตาราง แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวด้านอ้อมโนทัศน์เหมาะสมดี สำหรับข้อที่มีความซึมซับเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.65 คือข้อ 5 (ความรู้สึกรู้สึกว่าตนเองเป็นปัญหาต่อครอบครัว) ส่วนข้อที่มีความซึมซับเลขคณิตต่ำสุดเท่ากับ 2.70 คือข้อ 1 (ความรู้สึกรู้สึกพอใจในรูปร่างและลักษณะที่เปลี่ยนแปลง)

แปลงไปตั้งที่เป็นอยู่)

เมื่อพิจารณาคำขนิมเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.65 แล้วหมายความว่าผู้ป่วย  
มะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวต้านอัตโนมัติในข้อที่เกี่ยวข้อง  
กับความรู้สึกว่าตนเองเป็นปัญหาต่อครอบครัวได้ดีกว่าการปรับตัวต้านอัตโนมัติในข้อ  
อื่น ๆ ทั้งหมด

สำหรับคำขนิมเลขคณิตต่ำสุดเท่ากับ 2.70 แล้วหมายความว่าผู้ป่วยมะเร็ง  
ปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวต้านอัตโนมัติในข้อที่เกี่ยวข้องกับ  
ความรู้สึกพอใจในรูปร่างและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งที่เป็นอยู่ได้น้อยกว่าการปรับตัว  
ต้านอัตโนมัติในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์เชิงบวกและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อที่แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีในคาบพบแพทย์หน้า

ข้อ	ลักษณะการปรับตัว	$\bar{X}$	SD	ระดับการปรับตัว
1.	ความรู้สึกว่าสามารถแสดงบทบาทของตนเองที่มีอยู่ต่อบุคคลในครอบครัว	3.50	.85	เหมาะสมดี
2.	ความรู้สึกว่าสามารถแสดงบทบาทของความเป็นลูก	3.00	1.26	เหมาะสมดี
3.	ความรู้สึกว่าสามารถแสดงบทบาทของความเป็นภรรยา	3.15	1.10	เหมาะสมดี
4.	ความสนใจที่จะฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ จากแพทย์และพยาบาล	3.88	.52	เหมาะสมดี
5.	ความรู้สึกเกี่ยวกับการฉายรังสีทุกวันตามแพทย์สั่ง	3.63	.54	เหมาะสมดี
6.	ความคิอยากมาตรวจตามแพทย์นัดหลังจากรักษาด้วยรังสีครบแล้ว	3.83	.44	เหมาะสมดี

จากตาราง แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวคาบพบแพทย์หน้าที่เหมาะสมดี สำหรับข้อที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุดเท่ากับ 3.88 คือข้อ 4 (ความสนใจที่จะฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ จากแพทย์และพยาบาล) ส่วนข้อที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุดเท่ากับ 3.00 คือข้อ 2 (ความรู้สึกว่าสามารถแสดงบทบาทของความเป็นลูกคนที่เคยเป็นอยู่ได้อย่างเต็มที่)

เมื่อพิจารณาความซนิมเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.88 แล้ว หมายความว่าผู้ป่วย  
มะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาควยรังสี มีการปรับตัวคานบเทาพหน้าทีในข้อที่  
เกี่ยวกับความสนใจที่จะฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ จากแพทย์และพยาบาลได้ดีกว่า  
การปรับตัวคานบเทาพหน้าทีในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด

สำหรับความซนิมเลขคณิตค่าสูงสุดเท่ากับ 3.00 แล้วหมายความว่าผู้ป่วยมะเร็ง  
ปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาควยรังสีมีการปรับตัวคานบเทาพหน้าทีในข้อที่เกี่ยวกับ  
ความรู้สึกว่าสามารถแสดงบเทาพของความเป็นลูกไคน้อยกว่าการปรับตัวคานบเทาพหน้าที  
ในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด



ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุพาลงกรณ์มหาวิททยาลัย

ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อที่แสดงการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีในความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้อื่น

ข้อ	ลักษณะการปรับตัว	$\bar{X}$	SD	ระดับการปรับตัว
1.	ความต้องการให้สมาชิกในครอบครัวสนใจและเอาใจใส่	3.05	.96	เหมาะสมดี
2.	ความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากคนรู้จัก	3.48	.81	เหมาะสมดี
3.	ความสัมพันธ์กับสามี	3.38	.98	เหมาะสมดี
4.	ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว	3.83	.38	เหมาะสมดี
5.	ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือผู้อื่น	2.78	1.03	เหมาะสมดี
6.	ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยด้วยกัน	2.78	.89	เหมาะสมดี
7.	ความรู้สึกเมื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น	3.1	.84	เหมาะสมดี
8.	ความรู้สึกเมื่อต้องพุดคุยกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ของแผนกที่มารับการรักษา	3.43	.93	เหมาะสมดี
9.	ความรู้สึกต่อการพุดคุยของตนเอง	3.2	.88	เหมาะสมดี
10.	ความรู้สึกว่าเหงาและโดดเดี่ยว	3.33	.62	เหมาะสมดี

จากตาราง แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวในความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้อื่นเหมาะสมดี สำหรับข้อที่มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงสุดเท่ากับ 3.83 คือข้อ 4 (ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว) ส่วนข้อที่มีค่ามัธยฐานเลขคณิตต่ำสุดเท่ากับ 2.78 มีด้วยกันอยู่ 2 ข้อ คือข้อ 5 และข้อ 6 (ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านผู้อื่นและผู้ป่วยด้วยกัน)

เมื่อพิจารณาความซึ้งใจและคุณค่าของเอกสารที่ส่งมอบให้กับ 3.83 แล้วหมายความว่าความวุ่นวายและเรื่อง ปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นใน ข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวได้ดีกว่าการปรับตัวด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด

สำหรับความซึ้งใจและคุณค่าของเอกสารที่ส่งมอบให้กับ 2.78 แล้วหมายความว่าความวุ่นวายและเรื่อง ปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสีมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นใน ข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ผู้อื่น และข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ป่วยด้วยกัน ได้น้อยกว่าการปรับตัวด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นในข้ออื่น ๆ ทั้งหมด



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย