

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว และการปฏิบัติของครอบครัว กับ ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น ที่เข้ารับการบำบัดในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 358 คน ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านครอบครัว เสนอในตารางที่ 2-4

ตอนที่ 2 การปฏิบัติของครอบครัว เสนอในตารางที่ 5-13

ตอนที่ 3 ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น เสนอในตารางที่ 14-15

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว และการปฏิบัติของครอบครัวกับ ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น เสนอในตารางที่ 16-23

ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านครอบครัว

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของบิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า จำแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
อายุ		
31 - 40 ปี	112	31.3
41 - 50 ปี	209	58.4
51 - 60 ปี	34	9.5
60 ปีขึ้นไป	3	0.8
รวม	358	100
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	197	55.03
มัธยมศึกษา	91	25.42
อนุปริญญา	38	10.61
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	32	8.94
รวม	358	100
รายได้ของครอบครัว		
500 - 5,000	57	15.9
5,001 - 10,000	124	34.6
10,001 - 15,000	64	17.9
15,001 - 20,000	36	10.1
20,001 - 25,000	14	3.9
25,001 - 30,000	19	5.3
30,000 บาทขึ้นไป	44	12.3
รวม	358	100

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวน	ร้อยละ
สภาพความเพียงพอของรายได้		
มีเหลือเก็บ	37	10.3
พอกินพอใช้	223	62.3
มีหนี้สิน	98	27.4
รวม	358	100
จำนวนสมาชิกในครอบครัว (คน)		
3	70	19.6
4	130	36.3
5	90	25.1
6	36	10.1
7	12	3.4
8	12	3.4
9	2	0.6
มากกว่า 10	6	1.7
รวม	358	100
ลักษณะครอบครัว		
เดี่ยว	265	74.0
ขยาย	93	26.0
รวม	358	100
ความสัมพันธ์กับวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า		
มารดา	219	61.2
บิดา	139	38.8
รวม	358	100

จากตารางที่ 2 พบว่า บิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้ามีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 58.4) รองลงมา ได้แก่ อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 31.3) และ อายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 9.5) ตามลำดับ ส่วนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.8)

สำหรับระดับการศึกษานั้น พบว่า บิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า จบการศึกษา ระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 55.03) รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 25.42) และอนุปริญญา (ร้อยละ 10.61) ตามลำดับ ส่วนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.94)

รายได้ของครอบครัว พบว่า บิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้ามีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 -10,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 34.6) รองลงมา คือ รายได้ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 17.9) และ 500 - 5,000 บาท (ร้อยละ 15.9) ตามลำดับ ซึ่งเป็นรายได้พอกินพอใช้ มากที่สุด (ร้อยละ 62.3) รองลงมา คือ มีหนี้สิน (ร้อยละ 27.4) สำหรับรายได้ที่มีเหลือเก็บ มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.3)

จำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ในครอบครัวของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้ามีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 4 คน มากที่สุด (ร้อยละ 36.3) รองลงมา คือ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 25.1) และ 3 คน (ร้อยละ 19.6) ส่วนครอบครัวที่มีสมาชิกจำนวน 9 คนมีน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.6)

ลักษณะครอบครัว พบว่า เป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย (ร้อยละ 74 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ)

ความสัมพันธ์กับวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความสัมพันธ์โดยเป็น มารดามากกว่าบิดา (ร้อยละ 61.2 และ ร้อยละ 38.8 ตามลำดับ)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา
จำแนกเป็นรายข้อ

สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา	\bar{X}	S.D.	ระดับ
การไม่กล่าวโทษคู่สมรส	4.20	1.00	ดี
ความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพัง เพราะคู่สมรสให้ความสนใจ	3.98	1.27	ดี
การไม่ได้ถูกกล่าวโทษจากคู่สมรส	3.87	1.23	ดี
ความรู้สึกภูมิใจในคู่สมรส	3.80	1.14	ดี
การช่วยกันอบรมเลี้ยงดูบุตร	3.78	1.11	ดี
การได้รับเวลาจากคู่สมรส	3.77	1.30	ดี
ความรู้สึกมีความสุขในชีวิตสมรส	3.71	1.30	ดี
การไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น	3.69	1.14	ดี
การมีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	3.69	1.10	ดี
การร่วมกันแก้ไขปัญหา	3.68	1.22	ดี
ความรู้สึกมีความสุขที่ได้สมรสกับคู่สมรส	3.58	1.17	ปานกลาง
ไม่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพัง	3.53	1.52	ปานกลาง
การพูดคุย หรือปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ	3.47	1.21	ปานกลาง
การช่วยกันแบ่งเบาภาระงานในบ้าน	3.42	1.28	ปานกลาง
การพูดคุยปรับความเข้าใจ เมื่อมีเรื่องขัดแย้ง	3.41	1.19	ปานกลาง
การทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ รับประทานอาหาร หรือออกไปเที่ยวนอกบ้าน	3.39	1.26	ปานกลาง
การกล่าวยกย่องคู่สมรสกับผู้อื่น	3.27	1.27	ปานกลาง
ความรู้สึกพอใจในอุปนิสัยบางประการของคู่สมรส	3.26	1.16	ปานกลาง
การร่วมกันแก้ไขปัญหาในครอบครัว	3.14	1.50	ปานกลาง
การพบปะเยี่ยมเยียนญาติของทั้งสองฝ่าย	3.00	1.24	ปานกลาง
รวม	3.57	.77	ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อการไม่กล่าวโทษคู่สมรส ความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพัง เพราะคู่สมรสให้ความสนใจ การไม่ได้ถูกกล่าวโทษจากคู่สมรส ความรู้สึกภูมิใจในคู่สมรส การช่วยกันอบรมเลี้ยงดูบุตร การได้รับเวลาจากคู่สมรส ความรู้สึกมีความสุขในชีวิตสมรส การไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น การมีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และการร่วมกันแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของบิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าจำแนกตามสัมพันธภาพ
ระหว่างบิดามารดา

สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา	จำนวน	ร้อยละ
ดี	179	50.0
ปานกลาง	153	42.7
ไม่ดี	26	7.3
รวม	358	100

จากตารางที่ 4 พบว่า บิดามารดาของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้ามีสัมพันธภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด (ร้อยละ 50) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.7) ส่วนสัมพันธภาพไม่ดี มีเป็นจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 7.3)

ตอนที่ 2 การปฏิบัติของครอบครัว

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของครอบครัวรายด้านและโดยรวม

การปฏิบัติของครอบครัว	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด	4.26	.64	มาก
การตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ	3.94	.56	มาก
การอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม	3.90	.54	มาก
การถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม	3.81	.62	มาก
การคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว	3.70	.51	มาก
การส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว	3.58	.81	ปานกลาง
การจัดสรรการเงิน	3.39	.64	ปานกลาง
การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา	3.17	1.03	ปานกลาง
รวม	3.71	.42	มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ ด้านการอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม และด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ส่วนด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว ด้านการจัดสรรการเงิน และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

รายละเอียดการปฏิบัติของครอบครัวรายด้าน ปรากฏในตารางที่ 6-13

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการให้
คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด จำแนกเป็นรายข้อ

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
บอกบุตรว่าการเสพยาเสพติดเป็นการกระทำที่ผิด			
กฎหมาย และต้องถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง	4.55	.82	มาก
บอกบุตรว่าไม่ควรคิดทดลองยาเสพติด	4.50	.92	มาก
อธิบายแก่บุตรว่าคนที่ติดยาเสพติดเป็นบุคคลที่สังคม			
รังเกียจ และไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้	4.47	.87	มาก
สอนบุตรว่ายาเสพติดทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม			
เกิดโทษ และโรคแทรกซ้อนต่างๆ	4.43	.94	มาก
ให้คำแนะนำบุตรถึงอันตรายของบุหรี่ สุรา และยาเสพติด			
ติด	4.35	.99	มาก
ให้คำแนะนำบุตรถึงวิธีการปฏิเสธจากการถูกชักชวนให้			
ทดลองเสพยาเสพติด	4.18	1.16	มาก
ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราให้บุตรเห็น	3.89	1.33	มาก
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรด้วยการไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา			
หรือเสพยาเสพติด	3.70	1.50	มาก
รวม	4.26	.64	มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด
ทุกข้อ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
เมื่อบุตรเจ็บป่วย ท่านจะดูแลให้การรักษา หรือพานบุตรไปพบแพทย์	4.62	.73	มาก
จัดหาและเตรียมอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าเพียงพอ กับความต้องการของบุตร	4.14	.90	มาก
จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมให้บุตร	4.04	1.04	มาก
ให้การดูแลหรือซื้อยาให้บุตรรับประทานเมื่อเจ็บป่วย	4.00	1.3	มาก
ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารของบุตรด้วยตัวท่านเอง	3.98	1.5	มาก
จัดหาห้องส่วนตัวเป็นสัดส่วนให้บุตร	3.95	1.44	มาก
ดูแลให้บุตรรับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่ามากกว่าซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็น	3.89	1.11	มาก
จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้บุตรตามที่บุตรต้องการ	3.69	1.11	มาก
จัดหาอาหารให้บุตรรับประทาน	3.14	1.13	ปานกลาง
รวม	3.94	.56	มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพทุกข้ออยู่ในระดับเหมาะสมมาก ยกเว้นข้อจัดหาอาหารให้บุตรรับประทาน อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการอบรม
บทบาทที่เหมาะสมในสังคม จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
สนับสนุนและชี้แนะให้บุตรรู้จักคบเพื่อนที่ดี	4.66	.63	มาก
ห้ามบุตรคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด	4.57	.77	มาก
สอนบุตรว่าการที่จะให้เพื่อนยอมรับ หรือเข้าร่วมกลุ่ม กับเพื่อนได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเสพติด	4.08	1.19	มาก
อนุญาตให้บุตรพาเพื่อนมาบ้าน	3.76	1.25	มาก
เปิดโอกาสให้บุตรพาเพื่อนมาบ้าน และทำ กิจกรรมต่างๆอยู่ในสายตา	3.63	1.23	ปานกลาง
เปิดโอกาสให้บุตรคบเพื่อนอย่างอิสระ	3.55	1.21	ปานกลาง
รู้จักและคุ้นเคยกับเพื่อนของบุตร	3.02	1.24	ปานกลาง
รวม	3.9	.54	มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม ข้อสนับสนุนและชี้แนะให้บุตรรู้จักคบเพื่อนที่ดี ห้ามบุตรคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด สอนบุตรว่าการที่จะให้เพื่อนยอมรับ หรือเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเสพติด และอนุญาตให้บุตรพาเพื่อนมาบ้าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ส่วนข้อเปิดโอกาสให้บุตรพาเพื่อนมาบ้าน และทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในสายตา เปิดโอกาสให้บุตรคบเพื่อนอย่างอิสระ และรู้จักและคุ้นเคยกับเพื่อนของบุตร อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการ
ถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
สอนให้บุตรรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด	4.39	.80	มาก
ส่งเสริมให้บุตรรู้จักการเก็บออมเงิน	4.37	.83	มาก
สอนบุตรว่าการใช้จ่ายยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	4.31	.97	มาก
สอนให้บุตรเป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักสังเกต เปรียบเทียบคิดหาแนวทางเหตุผล และตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	4.05	1.04	มาก
ชี้บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความประพฤติดีโดยไม่ข้องแวะ กับยาเสพติดให้บุตร	4.05	1.11	มาก
สอนบุตรว่าการติดยาเสพติดเป็นการกระทำที่ขัดต่อ ศีลธรรม	3.99	1.20	มาก
สอนให้บุตรช่วยเหลือสังคมโดยรวม	3.74	1.12	มาก
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในเรื่อง การช่วยเหลือสังคม	3.58	1.14	ปานกลาง
ยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อบุตรแสดงความสามารถ หรือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี	3.52	1.19	ปานกลาง
ส่งเสริมให้บุตรเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	3.10	1.42	ปานกลาง
ชวนให้บุตรไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ	3.01	1.36	ปานกลาง
รวม	3.81	.62	มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิต
และจริยธรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ยกเว้นข้อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ในเรื่องการช่วยเหลือสังคม ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลเมื่อบุตรแสดงความสามารถ หรือประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดี ส่งเสริมให้บุตรเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และชักชวนบุตร
ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
เมื่อบุตรประสบปัญหาอุปสรรค ท่านเป็นกำลังใจช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางและเป็นที่ยึดให้แก่นบุตร	4.32	.84	มาก
เปิดโอกาสให้ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และชี้แจงเหตุผลได้อย่างอิสระ	4.04	.97	มาก
พูดคุยกับบุตรด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	4.01	.94	มาก
ท่านและบุตรทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัว เช่น รับประทานอาหาร ไปเที่ยวพักผ่อน	3.75	1.14	มาก
เมื่อบุตรกระทำผิดท่านจะลงโทษตามความเหมาะสม และชี้แจงเหตุผลให้ทราบ	3.72	1.09	มาก
แสดงความรักต่อบุตรด้วยการหยอกล้อ สัมผัส หรือโอบกอดตามความเหมาะสม	3.57	1.21	ปานกลาง
มีเวลาพูดคุย หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุตร	3.53	1.18	ปานกลาง
ไม่ดูต่ำกว่ากล่าว หรือลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อบุตรกระทำผิด	3.49	1.14	ปานกลาง
ไม่เปรียบเทียบพฤติกรรมของบุตรกับบุตรเพื่อนบ้าน หรือในระหว่างญาติพี่น้อง	2.86	1.25	ปานกลาง
รวม	3.7	.51	มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ยกเว้น ข้อแสดงความรักต่อบุตรด้วยการหยอกล้อ สัมผัส หรือโอบกอดตามความเหมาะสม มีเวลาพูดคุย หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุตร ไม่ดูต่ำกว่ากล่าว หรือลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อบุตรกระทำผิด และไม่เปรียบเทียบพฤติกรรมของบุตรกับบุตรเพื่อนบ้าน หรือในระหว่างญาติพี่น้อง อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการส่งเสริม
ความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
สอนให้บุตรดูแลรับผิดชอบตนเองในการทำความสะอาด			
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ และห้องส่วนตัว	3.84	1.29	มาก
สนับสนุนให้บุตรทำงานอดิเรก เล่นกีฬา เล่นดนตรียาม			
ว่าง	3.67	1.17	ปานกลาง
ไม่ให้บุตรอยู่บ้านเฉยๆ โดยมอบหมายงานในบ้านให้			
รับผิดชอบ	3.51	.33	ปานกลาง
มอบหมายให้บุตรมีหน้าที่รับผิดชอบงานในบ้านตาม			
ความถนัดและสนใจ เช่น ล้างถ้วยชาม	3.27	1.36	ปานกลาง
รวม	3.58	.42	ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ยกเว้นข้อสอนให้บุตรดูแลรับผิดชอบตนเองในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ และห้องส่วนตัว อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้าน
การจัดสรรการเงิน จำแนกเป็นรายข้อ

ด้านการจัดสรรการเงิน	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้			
มาใช้จ่ายภายในครอบครัว	4.52	.87	มาก
ให้เงินบุตรใช้จ่ายตามความจำเป็น	4.23	1.01	มาก
ให้บุตรรับผิดชอบในด้านการเงินของตนเอง เช่น			
จ่ายให้บุตรเป็นรายวัน	3.88	1.44	มาก
ไม่ส่งเสริมให้บุตรช่วยหารายได้มาใช้จ่ายช่วยเหลือ			
ครอบครัว	3.78	1.53	มาก
ให้บุตรมีส่วนร่วมรับรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว	3.01	1.49	ปานกลาง
ให้เงินบุตรเพิ่มเติมจากที่ให้ตามปกติอยู่เสมอ	2.85	1.21	ปานกลาง
สนับสนุนให้บุตรหารายได้ด้วยตนเอง	2.55	1.53	ปานกลาง
ให้เงินบุตรใช้จ่ายตามสบาย โดยไม่ควบคุมการใช้จ่าย	2.27	1.30	น้อย
รวม	3.39	.42	ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการจัดสรรการเงิน ข้อเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวให้เงินบุตรใช้จ่ายตามความจำเป็น ให้บุตรรับผิดชอบในด้านการเงินของตนเอง และไม่ส่งเสริมให้บุตรช่วยหารายได้มาใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัว อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ข้อให้บุตรมีส่วนร่วมรับรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ให้เงินบุตรเพิ่มเติมจากที่ให้ตามปกติอยู่เสมอ และสนับสนุนให้บุตรหารายได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง ส่วนข้อให้เงินบุตรใช้จ่ายตามสบาย โดยไม่ควบคุมการใช้จ่าย อยู่ในระดับเหมาะสมน้อย

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติของครอบครัวด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา จำแนกเป็นรายชื่อ

ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา	\bar{X}	S.D.	ระดับความเหมาะสม
ดูแลและให้คำแนะนำบุตรให้หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น ภาพเปลือย วีดีโอ	3.61	1.45	ปานกลาง
บอกบุตรว่าสามารถทำตัวให้เป็นที่สนใจจากเพศตรงข้ามได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด	3.60	1.56	ปานกลาง
เมื่อบุตรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ท่านให้คำแนะนำบุตรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องปกติ	3.35	1.42	ปานกลาง
ปลอบโยนและเป็นกำลังใจให้บุตร เมื่อบุตรมีปัญหา ผิดหวังจากความรัก	3.21	1.49	ปานกลาง
ให้คำแนะนำบุตรว่าไม่ควร มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน	3.05	1.63	ปานกลาง
บอกบุตรว่ายาเสพติดไม่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ	2.89	1.76	ปานกลาง
ให้คำแนะนำบุตรในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ โดยการใช้อนุยาง	2.83	1.65	ปานกลาง
สอนบุตรว่ายาเสพติดอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดการณ์ล่วงหน้าได้	2.75	1.63	ปานกลาง
รวม	3.17	1.03	ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาทุกข้อ อยู่ในระดับที่เหมาะสมปานกลาง

ตอนที่ 3 ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น

ตารางที่ 14 จำนวน และร้อยละของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า จำแนกตามเพศ และอายุ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	326	91.1
หญิง	32	8.9
รวม	358	100
อายุ		
13 - 15 ปี	63	17.6
16 - 18 ปี	194	54.2
19 - 21 ปี	101	28.2
รวม	358	100

จากตารางที่ 14 พบว่า วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 91.1 และร้อยละ 8.9 ตามลำดับ)

ด้านอายุ พบว่า อายุ 16 - 18 ปี มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 54.2) รองลงมา มีอายุ 19 - 21 ปี (ร้อยละ 28.2) ส่วนอายุ 13 - 15 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 17.6)

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น จำแนกตามจำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์ จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน วิธีการเสพยาบ้า และค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน

ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์		
ทุกวัน	227	63.4
5 - 6 วัน	12	3.4
3 - 4 วัน	80	22.3
1 - 2 วัน	31	8.7
อื่นๆ (เพิ่งลองเสพได้ 1 ครั้ง , 3 ครั้ง , เสพเดือนละ 2 ครั้ง)	8	2.2
รวม	358	100
จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน		
1	141	39.4
2	85	23.7
3	77	21.5
4	21	5.9
5	23	6.4
6 ครั้งขึ้นไป	11	3.1
รวม	358	100
วิธีการเสพยาบ้า		
สูดควันระเหย	350	97.8
สูบ	4	1.1
กิน	3	0.8
ฉีด	1	0.3
รวม	358	100

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่น	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน (บาท)		
1 - 99	79	22.1
100 - 200	156	43.6
201 - 499	92	25.7
500 ขึ้นไป	31	8.6
รวม	358	100

จากตารางที่ 15 พบว่า ลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเรื่อง จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์ พบว่า วัยรุ่นจะเสพยาบ้าทุกวันมากที่สุด (ร้อยละ 63.4) รองลงมา เสพ 3 - 4 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 22.3) และ 1-2 วัน (ร้อยละ 8.7) ตามลำดับ

จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน พบว่า เสพวันละ 1 ครั้ง มีจำนวนสูงสุด (ร้อยละ 39.4) รองลงมา เสพวันละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 23.7) และ 3 ครั้ง (ร้อยละ 21.5) ตามลำดับ ส่วนเสพวันละ 6 ครั้งขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.1)

สำหรับวิธีการเสพยาบ้า พบว่า ส่วนใหญ่เสพโดยการสูดควันระเหย (ร้อยละ 97.8) รองลงมา คือ การสูบ (ร้อยละ 1.1) และกิน (ร้อยละ 0.8) ตามลำดับ ส่วนการฉีดไม่นิยม (ร้อยละ 0.3)

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน จะเสียค่าใช้จ่าย วันละ 100-200 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 43.6) รองลงมาคือ วันละ 201 - 499 บาท (ร้อยละ 25.7) และวันละ 1-99 บาท (ร้อยละ 22.1) ส่วนค่าใช้จ่ายวันละ 500 บาทขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.6)

ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว การปฏิบัติของครอบครัวกับลักษณะการ
เสพยาบ้าของวัยรุ่น

ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว กับจำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์			
	ทุกวัน	5-6วัน	3-4วัน	1-2วันและอื่นๆ
ระดับการศึกษาของบิดามารดา				
ประถมศึกษา	121(33.8)	6(1.7)	52(14.5)	18(5.0)
มัธยมศึกษา	60(16.8)	3(0.8)	14(3.9)	14(3.9)
อนุปริญญา	26(7.3)	2(0.6)	7(2.0)	3(0.8)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	20(5.6)	1(0.3)	7(2.0)	4(1.1)
รวม	227(63.5)	12(3.4)	80(22.4)	39(10.8)
	C = .14004	$\chi^2 = 7.16075$	p-value = .62039	
ลักษณะครอบครัว				
ครอบครัวเดี่ยว	170(47.5)	10(2.8)	57(15.9)	28(7.8)
ครอบครัวขยาย	57(15.9)	2(0.6)	23(6.4)	11(3.1)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.8)
	C = .05408	$\chi^2 = 1.05025$	p-value = .78910	
รายได้ของครอบครัว				
มีเหลือเก็บ	24(6.7)	2(0.6)	5(1.4)	6(1.7)
พอกินพอใช้	139(38.8)	7(2.0)	51(14.2)	26(7.3)
มีหนี้สิน	64(17.9)	3(0.8)	24(6.7)	7(2.0)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.8)
	C = .11139	$\chi^2 = 4.49751$	p-value = .60967	

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์			
	ทุกวัน	5-6วัน	3-4วัน	1-2วันและอื่นๆ
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา				
ไม่ดี	18(5.0)	1(0.3)	5(1.4)	2(0.6)
ปานกลาง	92(25.7)	6(1.7)	36(10.1)	19(5.3)
ดี	117(32.7)	5(1.4)	39(10.9)	18(5.0)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.4)	39(10.8)
	C = .06994	$\chi^2 = 1.75998$	p-value = .94040	

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะครอบครัว รายได้ของครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์

ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว กับจำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน (ครั้ง)				
	1	2	3	4	5 ขึ้นไป
ระดับการศึกษาของบิดามารดา					
ประถมศึกษา	83(23.2)	47(13.1)	40(11.2)	12(3.4)	15(4.2)
มัธยมศึกษา	32(8.9)	21(5.9)	21(5.9)	6(1.7)	11(3.1)
อนุปริญญา	14(3.9)	11(3.1)	7(2.0)	0(0)	6(1.7)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	12(3.4)	6(1.7)	9(2.5)	3(0.8)	2(0.6)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.6)	21(5.9)	34(9.6)
	C = .15696	$\chi^2 = 9.04235$	p-value = .69931		
ลักษณะครอบครัว					
ครอบครัวเดี่ยว	103(28.8)	64(17.9)	56(15.6)	16(4.5)	26(7.3)
ครอบครัวขยาย	38(10.6)	21(5.9)	21(5.9)	5(1.4)	8(2.2)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.6)	21(5.9)	34(9.6)
	C = .03193	$\chi^2 = .36535$	p-value = .98521		
รายได้ของครอบครัว					
มีเหลือเก็บ	13(3.6)	8(2.2)	11(3.1)	1(0.3)	4(1.1)
พอกินพอใช้	95(26.5)	52(14.5)	44(12.3)	13(3.6)	19(5.3)
มีหนี้สิน	33(9.2)	25(7.0)	22(6.1)	7(2.0)	11(3.1)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.6)	21(5.9)	34(9.6)
	C = .11522	$\chi^2 = 4.81679$	p-value = .77697		

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ปัจจัยด้านครอบครัว	จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน (ครั้ง)				
	1	2	3	4	5 ขึ้นไป
สัมพันธภาพระหว่าง					
บิดามารดา					
ไม่ดี	6(1.7)	9(2.5)	5(1.4)	3(0.8)	3(0.8)
ปานกลาง	63(17.6)	31(8.7)	37(10.3)	9(2.5)	13(3.6)
ดี	72(20.1)	45(12.6)	35(9.8)	9(2.5)	18(5.0)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.6)	21(5.9)	34(9.6)
	C = .13848	$\chi^2 = 6.99941$	p-value= .53670		

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะครอบครัว รายได้ของครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน

ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว กับวิธีการเสพยาบ้า

ปัจจัยด้านครอบครัว	วิธีการเสพยาบ้า	
	สูดควันระเหย	วิธีอื่นๆ (สูบ, กิน, ฉีด)
ระดับการศึกษาของบิดามารดา		
ประถมศึกษา	190(53.1)	7(2.0)
มัธยมศึกษา	90(25.1)	1(0.3)
อนุปริญญา	38(10.6)	0(0)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	32(8.9)	0(0)
รวม	350(97.7)	8(2.2)
	C = .10121	$\chi^2 = 3.70527$ p-value = .29510
ลักษณะครอบครัว		
ครอบครัวเดี่ยว	260(72.6)	5(1.4)
ครอบครัวขยาย	90(25.1)	3(0.8)
รวม	350(97.7)	8(2.2)
	C = .03969	$\chi^2 = .56497$ p-value = .45227
รายได้ของครอบครัว		
มีเหลือเก็บ	37(10.3)	0(0)
พอกินพอใช้	218(60.9)	5(1.4)
มีหนี้สิน	95(26.5)	3(0.8)
รวม	350(97.7)	8(2.2)
	C = .05664	$\chi^2 = 1.15226$ p-value = .56207
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา		
ไม่ดี	25(7.0)	1(0.3)
ปานกลาง	149(41.6)	4(1.1)
ดี	176(97.7)	3(0.3)
รวม	350(97.7)	8(2.2)
	C = .04308	$\chi^2 = .66577$ p-value = .71685

จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะครอบครัว รายได้ของครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเสพยาบ้า

ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว กับค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน

ปัจจัยด้านครอบครัว	ค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน (บาท)		
	1 - 99	100 - 200	201 ขึ้นไป
ระดับการศึกษาของบิดามารดา			
ประถมศึกษา	47(13.1)	86(24.0)	64(17.9)
มัธยมศึกษา	19(5.3)	36(10.1)	36(10.1)
อนุปริญญา	7(2.0)	21(5.9)	10(2.8)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	6(1.7)	13(3.6)	13(3.6)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C = .10924	$\chi^2 = 4.32372$	p-value = .63296
ลักษณะครอบครัว			
ครอบครัวเดี่ยว	58(16.2)	116(32.4)	91(25.4)
ครอบครัวขยาย	21(5.9)	40(11.2)	32(9.0)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C = .00824	$\chi^2 = .02431$	p-value = .98792
รายได้ของครอบครัว			
มีเหลือเก็บ	6(1.7)	17(4.7)	14(3.9)
พอกินพอใช้	50(14.0)	98(27.4)	75(20.9)
มีหนี้สิน	23(6.4)	41(11.5)	34(9.5)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C = .06733	$\chi^2 = .96455$	p-value = .91512
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา			
ไม่ดี	4(1.1)	11(3.1)	11(3.1)
ปานกลาง	34(9.5)	66(18.4)	53(14.8)
ดี	41(11.5)	79(22.1)	59(16.5)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C = .05774	$\chi^2 = 1.19741$	p-value = .87852

จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับการศึกษาของบิดามารดา ลักษณะครอบครัว รายได้ของครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน

ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของครอบครัวกับจำนวนวันที่เสพยาบ้าใน
สัปดาห์

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์			
	ทุกวัน	5-6 วัน	3-4 วัน	1-2 วันและอื่นๆ
การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม				
เหมาะสมปานกลาง	103(28.8)	4(1.1)	44(12.3)	10(2.8)
เหมาะสมมาก	124(34.6)	8(2.2)	36(10.1)	29(8.1)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .16333 $\chi^2 = 9.81158$ p-value = .02024			
ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด				
เหมาะสมปานกลาง	39(10.9)	3(0.8)	15(4.2)	5(1.4)
เหมาะสมมาก	188(52.5)	9(2.5)	65(18.2)	34(9.5)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .05690 $\chi^2 = 1.16303$ p-value = .76188			
ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ				
เหมาะสมปานกลาง	49(13.7)	1(0.3)	34(9.5)	5(1.4)
เหมาะสมมาก	178(49.7)	11(3.1)	46(12.8)	34(9.5)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .22678 $\chi^2 = 19.40984$ p-value = .00023			
ด้านการอบรมอบทบาทที่เหมาะสมในสังคม				
เหมาะสมปานกลาง	68(19.0)	3(0.8)	27(7.5)	10(2.8)
เหมาะสมมาก	159(44.4)	9(2.5)	53(14.8)	29(8.1)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .05340 $\chi^2 = 1.02361$ p-value = .79554			

ตารางที่ 20 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์			
	ทุกวัน	5-6 วัน	3-4 วัน	1-2 วันและอื่นๆ
ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม				
เหมาะสมปานกลาง	82(22.9)	4(1.1)	32(8.9)	8(2.2)
เหมาะสมมาก	145(40.5)	8(2.2)	48(13.4)	31(8.7)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .11263	$\chi^2 = 4.59980$	p-value= .20356	
ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว				
เหมาะสมปานกลาง	103(28.8)	3(0.8)	39(10.9)	9(2.5)
เหมาะสมมาก	124(34.6)	9(2.5)	41(11.5)	30(8.4)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .16080	$\chi^2 = 9.50254$	p-value= .02330	
ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว				
เหมาะสมน้อย	18(5.0)	1(0.3)	6(0.7)	3(0.8)
เหมาะสมปานกลาง	98(27.4)	5(1.4)	39(10.9)	15(4.2)
เหมาะสมมาก	111(31.0)	6(1.7)	35(9.8)	21(4.8)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .06167	$\chi^2 = 1.36681$	p-value= .96785	
ด้านการจัดสรรการเงิน				
เหมาะสมน้อย	18(5.0)	1(0.3)	4(1.1)	4(1.1)
เหมาะสมปานกลาง	156(43.6)	8(2.2)	61(17)	30(8.4)
เหมาะสมมาก	53(14.8)	3(0.8)	15(4.2)	5(1.4)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .10392	$\chi^2 = 3.90854$	p-value= .68905	

ตารางที่ 20 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์			
	ทุกวัน	5-6 วัน	3-4 วัน	1-2 วันและอื่นๆ
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา				
เหมาะสมน้อย	52(14.5)	2(0.6)	24(6.7)	6(1.7)
เหมาะสมปานกลาง	92(25.7)	5(1.4)	34(9.5)	17(4.7)
เหมาะสมมาก	83(23.2)	5(1.4)	22(6.1)	16(4.5)
รวม	227(63.4)	12(3.4)	80(22.3)	39(10.9)
	C = .11625 $\chi^2 = 4.90431$ p-value = .55614			

จากตารางที่ 20 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ และด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการอบรมบ่มอบาที่ที่เหมาะสมในสังคม ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม ด้านการจัดสรรการเงิน และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันที่เสพยาบ้าในสัปดาห์

ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของครอบครัวกับจำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน (ครั้ง)				
	1	2	3	4	5 ขึ้นไป
การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม					
เหมาะสมปานกลาง	58(6.2)	39(10.9)	38(10.6)	12(3.4)	14(3.9)
เหมาะสมมาก	83(23.2)	46(12.8)	39(10.9)	9(2.5)	20(5.6)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.6)	21(5.9)	34(9.5)
	C = .08993 $\chi^2 = 2.91888$ p-value = .57149				
ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด					
เหมาะสมปานกลาง	24(6.7)	16(4.5)	14(3.9)	5(1.4)	3(0.8)
เหมาะสมมาก	117(32.7)	69(19.3)	63(17.6)	16(4.5)	31(8.7)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C=.08352 $\chi^2 = 2.51466$ p-value=.64201				
ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ					
เหมาะสมปานกลาง	35(9.8)	21(5.9)	15(4.2)	9(2.5)	9(2.5)
เหมาะสมมาก	106(29.6)	64(17.9)	62(17.3)	12(3.4)	25(7.0)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C=.11599 $\chi^2 = 4.88252$ p-value= .29957				
ด้านการอบรมอบทบาทที่เหมาะสมในสังคม					
เหมาะสมปานกลาง	42(11.7)	26(7.3)	23(6.4)	4(1.1)	13(3.7)
เหมาะสมมาก	99(27.7)	59(16.5)	54(15.1)	17(4.7)	21(5.9)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C=.13490 $\chi^2 = 6.63585$ p-value=.03623				

ตารางที่ 21 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน (ครั้ง)				
	1	2	3	4	5 ขึ้นไป
ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม					
เหมาะสมปานกลาง	45(12.8)	28(7.8)	33(9.2)	6(1.7)	14(3.9)
เหมาะสมมาก	96(26.8)	57(15.9)	44(12.3)	15(4.2)	20(5.6)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C=.10213	$\chi^2 = 3.77368$	p-value=.43750		
ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว					
เหมาะสมปานกลาง	53(14.8)	36(10.1)	40(11.2)	12(3.4)	13(3.6)
เหมาะสมมาก	88(24.6)	49(13.7)	37(10.3)	9(2.5)	21(5.9)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C=.13091	$\chi^2 = 6.24251$	p-value=.18175		
ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว					
เหมาะสมน้อย	9(2.5)	7(2.0)	8(2.2)	1(0.3)	3(0.8)
เหมาะสมปานกลาง	62(17.3)	33(9.2)	38(10.6)	9(2.5)	15(4.2)
เหมาะสมมาก	70(19.6)	45(12.6)	31(8.7)	11(3.1)	16(4.5)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C = .10391	$\chi^2 = 3.90760$	p-value = .86536		
ด้านการจัดสรรการเงิน					
เหมาะสมน้อย	10(2.8)	9(2.5)	3(0.8)	4(1.1)	1(0.3)
เหมาะสมปานกลาง	98(27.4)	62(17.3)	56(15.6)	13(3.6)	26(7.3)
เหมาะสมมาก	33(9.2)	14(3.9)	18(5.0)	4(1.1)	7(2.0)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C = .15684	$\chi^2 = 9.02854$	p-value= .33989		

ตารางที่ 21 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	จำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน (ครั้ง)				
	1	2	3	4	5 ขึ้นไป
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา					
เหมาะสมน้อย	33(9.2)	20(5.6)	19(5.3)	5(1.4)	7(2.0)
เหมาะสมปานกลาง	59(16.5)	39(10.9)	27(7.5)	8(2.2)	15(4.2)
เหมาะสมมาก	49(13.7)	26(7.3)	31(8.7)	8(2.2)	12(3.4)
รวม	141(39.4)	85(23.8)	77(21.5)	21(5.9)	34(9.5)
	C = .08466 $\chi^2 = 2.58456$ p-value = .95767				

จากตารางที่ 21 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวด้านการอบรมทบทบาที่ที่เหมาะสมในสังคมมีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภายในครอบครัว ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว ด้านการจัดสรรการเงิน และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่เสพยาบ้า/วัน

ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของครอบครัวกับวิธีการเสพยาบ้า

การปฏิบัติของครอบครัว	วิธีการเสพยาบ้า	
	สุดวันระเหย	วิธีอื่นๆ(สูบ, กิน, ฉีด)
การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม		
เหมาะสมปานกลาง	160(44.7)	1(0.3)
เหมาะสมมาก	190(53.1)	7(2.0)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C = .10045	$\chi^2 = 3.46721$ p-value = .49994
ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด		
เหมาะสมปานกลาง	62(17.3)	0(0)
เหมาะสมมาก	288(80.4)	8(2.2)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C = .06373	$\chi^2 = 1.46398$ p-value = .42794
ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ		
เหมาะสมปานกลาง	88(24.6)	1(0.3)
เหมาะสมมาก	262(73.2)	7(2.0)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C = .04261	$\chi^2 = .65180$ p-value = .42224
ด้านการอบรมอบทบาทที่เหมาะสมในสังคม		
เหมาะสมปานกลาง	107(30.4)	1(0.3)
เหมาะสมมาก	243(67.9)	7(2.0)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C = .05761	$\chi^2 = 1.19363$ p-value = .38306

ตารางที่ 22 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	วิธีการเสพยาบ้า	
	สูดควันระเหย	วิธีอื่นๆ(สูบ, กิน, ฉีด)
ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม		
เหมาะสมปานกลาง	126(35.2)	0(0)
เหมาะสมมาก	224(62.6)	8(2.2)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C=.11073	$\chi^2 = 4.44414$ p-value=.61680
ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว		
เหมาะสมปานกลาง	153(42.7)	1(0.3)
เหมาะสมมาก	197(55)	7(2.2)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C=.09257	$\chi^2 = 3.09622$ p-value= .49907
ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว		
เหมาะสมน้อย	27(7.5)	1(0.3)
เหมาะสมปานกลาง	154(43.0)	3(0.8)
เหมาะสมมาก	169(47.2)	4(1.1)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C=.02943	$\chi^2 = .31642$ p-value= .12174
ด้านการจัดสรรการเงิน		
เหมาะสมน้อย	26(7.3)	1(0.3)
เหมาะสมปานกลาง	251(70.1)	4(1.1)
เหมาะสมมาก	73(20.4)	3(0.8)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C=.07072	$\chi^2 = 1.80161$ p-value = .46413

ตารางที่ 22 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	วิธีการเสพยาบ้า	
	สูดควันระเหย	วิธีอื่นๆ(สูบ, กิน, ฉีด)
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา		
เหมาะสมน้อย	83(23.2)	1(0.3)
เหมาะสมปานกลาง	144(40.2)	4(1.1)
เหมาะสมมาก	123(34.4)	3(0.8)
รวม	350(97.8)	8(2.2)
	C=.09258	$\chi^2 = .56721$ p-value=.21230

จากตารางที่ 22 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ ด้านการอบรมทบาทที่เหมาะสมในสังคม ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว ด้านการจัดสรรการเงิน และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเสพยาบ้า

ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของครอบครัวกับค่าใช้จ่ายในการพยาบาล
บ้าน/วัน

การปฏิบัติของครอบครัว	ค่าใช้จ่ายในการพยาบาลบ้าน/วัน (บาท)		
	1 -99	100-200	201 ขึ้นไป
การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม			
เหมาะสมปานกลาง	32(8.9)	74(20.7)	55(15.4)
เหมาะสมมาก	47(13.1)	82(22.9)	68(19.0)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C = .05337	$\chi^2 = 1.02257$	p-value = .59972
ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา เสพยาติด			
เหมาะสมปานกลาง	12(3.4)	31(8.7)	19(5.3)
เหมาะสมมาก	67(18.7)	125(34.9)	104(29.1)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.05925	$\chi^2 = 1.26104$	p-value=.53231
ด้านการตอบสนองความต้องการ ทางชีวภาพ			
เหมาะสมปานกลาง	15(4.2)	39(10.9)	35(9.8)
เหมาะสมมาก	64(17.9)	117(32.7)	88(24.6)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.08009	$\chi^2 = 2.31131$	p-value=.31485
ด้านการอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม			
เหมาะสมปานกลาง	15(4.2)	55(15.4)	38(10.6)
เหมาะสมมาก	64(17.9)	101(28.2)	85(23.7)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.07995	$\chi^2 = 2.30314$	p-value=.68020

ตารางที่ 23 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	ค่าใช้จ่ายในการพยาบาล/วัน (บาท)		
	1 - 99	100 - 200	201 ขึ้นไป
ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม			
เหมาะสมปานกลาง	21(5.9)	63(17.6)	42(11.7)
เหมาะสมมาก	58(16.2)	93(26.0)	81(22.6)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.11106	$\chi^2 = 4.47066$	p-value=.10696
ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว			
เหมาะสมปานกลาง	29(8.1)	69(19.3)	56(15.6)
เหมาะสมมาก	50(14.0)	87(24.3)	67(18.7)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.06860	$\chi^2 = 1.69272$	p-value=.42897
ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว			
เหมาะสมน้อย	4(1.1)	12(3.4)	12(2.4)
เหมาะสมปานกลาง	36(10.1)	66(18.4)	55(15.4)
เหมาะสมมาก	39(10.9)	78(21.8)	56(15.6)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.07125	$\chi^2 = 1.82663$	p-value=.76761
ด้านการจัดการการเงิน			
เหมาะสมน้อย	5(1.4)	12(3.4)	10(2.8)
เหมาะสมปานกลาง	59(16.5)	110(30.7)	86(24.0)
เหมาะสมมาก	15(4.2)	34(9.5)	27(7.5)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.04188	$\chi^2 = .62916$	p-value=.95977

ตารางที่ 23 (ต่อ)

การปฏิบัติของครอบครัว	ค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน (บาท)		
	1-99	100-200	201 ขึ้นไป
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา			
เหมาะสมน้อย	20(5.6)	36(10.1)	28(7.8)
เหมาะสมปานกลาง	29(8.1)	70(19.6)	49(13.7)
เหมาะสมมาก	30(8.4)	50(14.0)	46(12.8)
รวม	79(22.1)	156(43.6)	123(34.4)
	C=.07228	$\chi^2 = 1.88003$	p-value=.75781

จากตารางที่ 23 พบว่า การปฏิบัติของครอบครัวโดยรวม ด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ ด้านการถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตและจริยธรรม ด้านการอบรมบทบาทที่เหมาะสมในสังคม ด้านการคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ตนเองและครอบครัว ด้านการจัดสรรการเงิน และด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเสพยาบ้า/วัน