การศึกษาการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อความสามารถ ในการเผชิญปัญหาของเยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษา โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



นางสาวปาริชาติ กิจคุณธรรม

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPY ON COPING ABILITY

OF AMPHETAMINE ADOLESCENT ABUSERS DURING FOLLOW UP PERIOD,

THABSAKAE HOSPITAL, PRACHUAPKHIRIKHUN PROVINCE

Miss Parichat kijchunnatham

Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Department of Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อ		
	ความสามารถในการเผชิญปัญหาของเยาวชนที่เสพยาบ้า		
	ในระยะติดตามการรักษา โรงพยาบาลทับสะแก		
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
โดย	นางสาวปาริชาติ กิจคุณธรรม		
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช		
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ		
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริญญามหาบัณฑิต			
	>		
(รองศาส	เตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์)		
คณะกรรมการสอบโครงการศึ	กษาอิสระ		
	<i>O</i> น วิน ประธานกรรมการ		
(รองศ	าสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)		
	อาจารย์ที่ปรึกษา		
	(อาจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ)		
	/mg/ Mz		
	(นางเพชรี คันธสายบัว)		

ปาริชาติ กิจคุณธรรม : การศึกษาการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อความสามารถ ในการเผชิญปัญหาขอ แยาวชนที่เสพยาบ้า ในระยะติดตามการรักษา โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPY ON COPING ABILITY OF AMPHETAMINE ADOLESCENT ABUSERS DURING FOLLOW UP PERIOD, THABSAKAE HOSPITAL, PRACHUAPKHIRIKHUN PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 148 หน้า.

การศึกษาครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการศึกษาอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความ สามารถในการเผชิญปัญหาของเยาวชนที่เสพยาบ้า ในระยะติดตามการรักษาโรงพยาบาล ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนและหลังการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างคือ เยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษาจำนวน 20 คน โดยการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จากเยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษา โรงพยาบาล ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการ ใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัด ความสามารถในการเผชิญปัญหา และแบบวัดความรู้ในการเผชิญปัญหา ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น และผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีค่าความเชื่อมั่น ครอนบาร์ค แอลฟา 0.80 และ 0.89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และใช้สถิติ ทดสอบที Dependent t-test

ผลการศึกษาพบว่า

ความสามารถในการเผชิญปัญหาของเยาวชนที่เสพยาบ้า ในระยะติดตามการรักษา โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังการใช้ จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มสูง กว่าก่อนการใช้จิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -15.33)

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2547 ## 4677810436: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEA WORD: GROUP SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPY / COPING ABILITY /

AMPHETAMINE ADOLESCENT ABUSERS / FOLLOW UP PERIOD

PARICHAT KIJCHUNNATHAM: A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE

PSYCHOTHERAPY ON COPING ABILITY OF AMPHETAMINE ADOLESCENT

ABUSERS DURING FOLLOW UP PERIOD, THABSAKAE HOSPITAL,

PRACHUAPKHIRIKHUN PROVINCE: PROF.PENPAK UTID, Ph.D., 148 pp.

The objective of this independent study project was to compare the coping ability of amphetamine adolescent abusers before and after the utilization of group supportive psychotherapy during the follow up period, Thabsakae hospital, Prachuapkhirikhun province. The sample of 20 patients who met the inclusion criteria were recruited from amphetamine adolescent abusers during follow up period at Thabsakae Hospital, Prachuapkhirikhun province. The study instrument was the group supportive psychotherapy which was developed by the researcher and validated by three experts. The instruments for data collect were the Coping Ability Questionaire and Coping Knowledge Questionaire, with Cronbach's Alpha coefficient reliability of 0.80, and 0.89, respectively. Statistical techniques used in data analysis were mean ,standard deviation and Dependent t – test.

Major results of study were the following.

The coping ability of amphetamine adolescent abusers during the follow up period, Thabsakae hospital, Prachuapkhirikhun province after using group supportive psychotherapy was significantly higher than before using group supportive psychotherapy. (t = -15.33, p = .05)

Field of study Mental Health and Psychiatric Nursing Student's signature Registration Advisor's signature Psychiatric Allam Advisor's signature Psychiatric Advisor's signature Psychiatri

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ผู้ซึ่งได้ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเมตตา เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษา อย่างสม่ำเสมอมาโดย ตลอด ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานสอบ โครงการศึกษาอิสระ ที่ให้ความเมตตา ให้คำแนะนำในการศึกษา และให้กำลังใจเสมอมา และนาง เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ ที่ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขโครงการศึกษาอิสระให้สมบุรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบความตรง ตามเนื้อหาของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณ จารุวรรณ จินดามงคล ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือในการศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ อาจารย์ดร. รังสิมันด์ สุนทรไชยา ที่ให้กำลังใจเสมอมา รวมทั้งคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการพัฒนา ตนเอง รวมทั้งให้กำลังใจในการศึกษาตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ กรมสุขภาพจิตที่สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษา จนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คุณใจทิพย์ จิตอุทัศน์ รวมทั้งบุคลากรงานยาเสพติดทุกท่าน ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ ทดลองใช้เครื่องมือและดำเนิน การทดลองจนเสร็จสิ้นกระบวนกระบวนการ

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวกิจคุณธรรม และคุณธนภัทร รวงทองที่ ให้กำลังใจ และความห่วงใยให้แก่ผู้ศึกษาเสมอมา ขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างและญาติทุกท่านที่ เห็นความลำคัญ สละเวลาและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มือยู่ในโครงการศึกษาอิสระนี้ ผู้ศึกษาขอมอบแด่ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษาทุกท่าน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ลมบูรณ์ตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	3
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	্ৰ
กิตติกรรมประกาศ	ପ୍
สารบัญ	n
สารบัญตาราง	
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	9
แนวเหตุผลและสมมุติฐานการศึกษา	9
ขอบเขตการศึกษา	11
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	12
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	14
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	15
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	55
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	56
ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา	
การวิเคราะห์ข้อมูล	95
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	97
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	103
สรุปการศึกษา	107
อภิปรายผล	
ข้อเสนอแนะ	110
รายการอ้างอิง	
ภาคผนวก	
ก รายนามผ้ทรงคณวุฒิ ผ้เชี่ยวชาณ	122

สารบัญ (ต่อ)

า	เ สถิติที่ใช้ในการศึกษา	125
P	า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	128
3	ใบหนังสือยินยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในวิจัย	.144
ประวัติผู้คื	ที่กษา	148

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	จำนวนปัจจัยการบำบัดและการจัดลำดับที่ของปัจจัยการบำบัดจากการทำจิต	
	บำบัดประคับประคองแบบกลุ่ม ทั้ง 6 ครั้ง (กลุ่มที่ 1)	90
ตารางที่ 2	จำนวนปัจจัยการบำบัดและการจัดลำดับที่ของปัจจัยการบำบัดจากการทำจิต	
	บำบัดประคับประคองแบบกลุ่ม ทั้ง 6 ครั้ง (กลุ่มที่ 2)	91
ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดความรู้ในการเผชิญปัญหาขอ	1
	เยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการักษา ก่อนและหลังการใช้จิตบำบัด	
	ประคับประคองแบบกลุ่ม	95
ตารางที่ 4	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษา	
		. 98
ตารางที่ 5	ระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาของกลุ่มตัวอย่า	14
	ก่อนและหลังการทดลอง	100
ตารางที่ 6	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญปัญหาของ	
	เยาวชนที่เสพยาบ้าในระยะติดตามการรักษาก่อนและหลังการทดลอง	101