

พฤติกรรมและความต้องการในการสัมผัสบุตรของผู้ป่วยหลังคลอด



นางสาว สิริ อกีภาคุณ

003861

วิทยานิพนธน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาควิชาพยาบาลศึกษา
คณะวิทยาลัย ศูนย์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524

BEHAVIORS AND NEEDS IN POSTNATAL PATIENTS CONCERNING
THE ATTACHMENT OF THEIR NEWBORN INFANTS

Miss Sa-ing Apipalakul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education
Department of Nursing Education
Graduate School
Chulalongkorn University

1981

หัวขอวิทยานิพนธ์

พฤษติกรรมและความต้องการในการสัมผัสบุตรของยูปีบี้หลังคลอด

โดย

นางสาว ส่อง อภิปัลกุล

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา


อาจารย์พี่ครูกานดา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ มุณฑานุรักษ์


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


..... กรรมคือบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประคิริ์ มุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ ผลานพิบูลย์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ มุณฑานุรักษ์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว บุญยกกอก)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมและความต้องการในการสัมผัสบุตรของผู้ป่วยหลังคลอด

୧୦

นางสาว สจ๊วต อภิปภาลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ធនាគារសាខាបាសាអង់គ្លេស និងរដ្ឋបាល នូវកម្មាធុំ

ການປິດຕະວາ

ພຢາບກລືກສໍາ

ปีกานคร์กานดา

2523



បង្កើតយោល

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและค่าทางพัฒนาการในการสัมผัสบุตร และเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสัมผัสบุตรของผู้ป่วยหลังคลอด

(t-test)

ผลการวิจัย

1. พฤติกรรมในการสัมผัสร่องรอยป้ายหลังคลอดทั้งหมดพบว่า บุปผาญหลังคลอดคืนี พฤติกรรมในการสัมผัสด้วยการใช้ถ่ายทอดสำราญดูบุตร เกิดขึ้นก่อน การถ่านค่าถ่านเกี่ยวกับการดูแลบุตร เกิดขึ้นภายหลัง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยคือการใช้น้ำมือเขี้ยว้มือและพฤติกรรมที่เกิดระยะเวลานานคือการใช้ฝานื้อสูบหรือบุหรี่
2. พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดทั้งหมดออกความคิดเห็นว่าบุปผาญหลังคลอดทั้งหมดบุตรคนแรก และบุตรคน第二个 2 คนขึ้นไป แตกต่างกันอย่างนี้นย่ำสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงคงไว้ว่าซึ่งสมมติฐานข้อที่ว่า พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดทั้งหมดบุตรคนแรก 2 คนขึ้นไป บอนมากกว่าบุปผาญหลังคลอดทั้งหมดบุตรคนแรก
3. พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี และ 20-35 ปี แตกต่างกันอย่างนี้นย่ำสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงคงไว้ว่าซึ่งสมมติฐานข้อที่ว่า พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี บอนมากกว่าบุปผาญหลังคลอดที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
4. พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่มีรายได้ครอบครัวระหว่าง 2,000-3,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท แตกต่างกันอย่างนี้นย่ำสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงคงไว้ว่าซึ่งสมมติฐานข้อที่ว่า พฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่มีรายได้ครอบครัว 3,001-4000 บาท บอนมากกว่าบุปผาญหลังคลอดที่มีรายได้ครอบครัวระหว่าง 2,000-3,000 บาท
5. เมื่อจัดลำดับความต้องการมีพฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดทั้งหมด ปรากฏว่าลำดับแรกคือความต้องการมีพฤติกรรมการลืมเลือนที่แสดงออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่มีความต้องการมีพฤติกรรมการลืมเลือนที่แสดงออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่เมื่อต้นสู่การคลอด รองกราฟราบบ้านบุตรมีร่างกายครบถ้วนหรือไม่และนำหนักเท่าไร ส่วนลำดับสุดท้ายเป็นความต้องการมีพฤติกรรมการสัมผัสร่องรอยหลังคลอดที่แสดงออกความคิดเห็นของบุปผาญหลังคลอดที่ในด้านการก่อครัวบุตร

Thesis Title : Behaviors and Needs In Postnatal Patients Concerning
The Attachment of Their Newborn Infants

Name : Miss Sa-ing Apipalakul

Advisor : Assistant Professor Puangrat Boonyanuruk

Department : Nursing Education

Academic Year : 1980

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the behaviors and needs of postnatal patients concerning the attachment of their newborn infants and to compare the expression of patients about the attachment.

The samples were 120 postnatal patients in Rajvithi Hospital selected by the purposive sampling. The instruments were the time sampling observation and interview. The observation form was adapted from the assessment tool which was developed by Mrs. Catherine Cropley and this form was divided into 2 parts; the verbal behaviors and the non-verbal behaviors. The interviewing form was divided into 2 parts; the needs concerning the mothers' verbal and non-verbal behaviors. The instruments were tested for content validity and reliability were 0.99 and 0.99. The data were analyzed by using various statistical methods such as: percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test.

The major findings are as follows:

1. Through observation, it was found that the first attachment behavior was using the sight to explore the newborn infants and the last attachment behavior was asking for caring the newborn infants. The attachment occurred very often was touching the infants' palms with their fingers and the longest attachment behavior was touching the infants' heads with their palms.
2. There was a statistically significant difference at the .01 level between verbal and non-verbal behaviors concerning the attachment of their newborn infants of the primigravida and multigravida patients. The hypothesis was retained.
3. There was a statistically significant difference at the .01 level between verbal and non-verbal behaviors concerning the attachment of their newborn infants of patients 13-19 and 20-35 years of age. The hypothesis was retained.
4. When divided the sample into two groups which were those who have income 2,000-3,000 bahts and those whose income 3,000-4,000 bahts. There was a statistically significant difference at the .01 level in verbal and non-verbal behaviors concerning the attachment of their newborn infants of the subjects between those two groups.
5. Patients' needs to perform the behaviors showed that the verbal behavior was ranked first such as : asking to see the infant, wanted to know about the defects and weight of the infants but the non-verbal behavior was ranked last which was the enfolding infants.



กิติกรรมมีระกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลง ให้ความถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าปก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์ อารยพัฒนา คุณภูมิการวิจัยที่ได้ทำการให้คำแนะนำเขียนร่าง และขอคิดเห็น ตลอดจนความช่วยเหลือเอาใจใส่ แก้ไขขอบพรองค์ ฯ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแภา ปุณยกันก ได้กรุณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสติศิลป์อย่างใกล้ชิด ผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่านจากสถาบัน ฯ ได้กรุณางานแนะนำ แก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรู้สึกชำนาญ ในความ ถูกต้องของหัวเรื่องเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ อารยพัฒนา ลินดา วงศ์นุพัทธ์ แผนกวิจัยและวางแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการคิดข้อมูลทางสติศิลป์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี ตลอดจนผู้ป่วยทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตอบแบบสอบถาม ตลอดจนขอบพระคุณทุกท่านที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่วิจัยไว้ ณ โอกาสสุดท้าย

ล้อing อภิปักดุ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า



บทคัดย่อภาษาไทย	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๔
กิจกรรมประจำปี	๗
รายการตารางประกอบ	๙
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
ความหมายของการวิจัย	8
ปัญหาของการวิจัย	8
สมมติฐาน	9
ประโยชน์ภาควิชา ไคร์บจากการวิจัย	12
ข้อทดลอง เบ่งคน	13
ความหมายของคำที่ใช้ในการวิจัย	13
2 รายงานคดีเดิมรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	14
ความหมาย	14
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	37
การทดลอง ในลักษณะ	37
การวิจัยในมนุษย์	39
3 วิธีดำเนินการวิจัย	44
กลุ่มตัวอย่างประชากร	44
ลักษณะเครื่องมือ	45

บทที่	หน้า
การหากความครอง ...	46
การหากความเท็จ ...	47
วิธีเก็บร่วบรวมข้อมูล ...	48
การวิเคราะห์ข้อมูล ...	48
ผลลัพธ์ใช้ในการวิจัย ...	49
4 ผลการวิจัย ...	51
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...	52
5 สรุปผลการวิจัย ยกไปรายและขอเสนอแนะ ...	71
ผลการวิจัย ...	72
การอภิปรายผลการวิจัย ...	75
ขอเสนอแนะ ...	83
บรรณานุกรม ...	86
ภาคผนวก ...	89
ประวัติ ...	102

รายงานการประชุม

รายการที่	หน้า
1 แสดงอย่างผิวเผิน...	55
2 แสดงสถานภาพสัมมูลของผู้ป่วย...	56
3 แสดงการนิ่งคราวของผู้ป่วย...	57
4 แสดงรายได้ครอบครัวของผู้ป่วย...	58
5 แสดงการเปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยกำลังระหว่างผู้ป่วยหลังคลอดคนที่ 1 กรณีที่ 2 คนขึ้นไป...	59
6 แด่คุณการ เปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยภาระทางผู้ป่วยหลังคลอดคนที่ 1 กรณีที่ 2 คนขึ้นไป...	61
7 แสดงการ เปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยกำลังระหว่างผู้ป่วยหลังคลอดคนอายุระหว่าง 13-19 ปี และ 20-35 ปี...	62
8 แสดงการ เปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยภาระทางระหว่างผู้ป่วยหลังคลอดคนอายุระหว่าง 13-19 ปี และ 20-35 ปี....	64
9 แสดงการ เปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยกำลังระหว่างผู้ป่วยหลังคลอดคนรายได้ครอบครัวระหว่าง 2,000-3,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท...	65
10 แสดงการ เปรียบเทียบพกติกรรมการล้มเหลวแสดงออกโดยภาระทางระหว่างผู้ป่วยหลังคลอดคนรายได้ครอบครัวระหว่าง 2,000-3,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท...	67
11 แสดงลำดับห้องความต้องการพกติกรรมการล้มเหลวของผู้ป่วยหลังคลอดทั้งหมด...	68