

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดระดับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก ก่อนและหลังการใช้กลุ่มบำบัดระดับประคอง ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน ซึ่งสามารถนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2)

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการกลุ่มบำบัดระดับประคองรายด้านและโดยรวม (ตารางที่ 3)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับกลุ่มบำบัดประคับประคอง จำแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
	(N = 20)	
1. อายุ ($\bar{X} = 38.05$)		
20 - 29 ปี	5	25
30 - 39 ปี	7	35
40 - 49 ปี	5	25
50 - 59 ปี	2	10
60 ปีขึ้นไป	1	5
2. เพศ		
ชาย	11	55
หญิง	9	45
3. สถานภาพ สมรส		
โสด	15	75
คู่	2	10
หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3	15
4. ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	17	85
มัธยมศึกษา	3	15

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 20 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี รองลงมา ร้อยละ 25 อายุระหว่าง 20 - 29 ปี และอายุ ระหว่าง 40 - 49 ปี อายุระหว่าง 50 - 59 ปี ร้อยละ 10 และ อายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 5 ตามลำดับ ($\bar{X} = 38.05$)

เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55 และเพศหญิง ร้อยละ 45

สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 75 รองลงมาหม้าย หย่า แยกกันอยู่ ร้อยละ 15 และคู่ ร้อยละ 10 ตามลำดับ

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85 รองลงมา มัธยมศึกษา ร้อยละ 15

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย จำแนกตาม อาชีพ รายได้ของครอบครัว
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และระยะเวลาการเจ็บป่วย

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
	(N = 20)	
5. อาชีพ		
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	20	100
6. รายได้ของครอบครัว (บาทต่อเดือน)		
ต่ำกว่า 4,000 บาท	18	90
4,000 - 8,000 บาท	2	10
7. จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ($\bar{X} = 2.55$)		
1 - 3 ครั้ง	17	85
4 - 6 ครั้ง	2	10
ไม่เคยเป็นผู้ป่วยใน	1	5
8. ระยะเวลาการเจ็บป่วย (ปี) ($\bar{X} = 10$)		
0 - 5 ปี	2	10
6 - 10 ปี	11	55
11 - 15 ปี	6	30
16 - 20 ปี	1	5

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 100

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ของครอบครัว ต่ำกว่า 4,000 บาท ร้อยละ 90 และอยู่ระหว่าง 4,000 - 8,000 บาท ร้อยละ 10 ตามลำดับ

จำนวนครั้งที่รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช 1-3 ครั้ง ร้อยละ 85 รองลงมา 4 - 6 ครั้ง ร้อยละ 10 และไม่เคยเป็นผู้ป่วยใน ร้อยละ 5 ตามลำดับ ($\bar{X} = 2.55$)

ระยะเวลาการเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี, 16 - 20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25 และ 11 - 15 ปี ร้อยละ 15 ตามลำดับ ($\bar{X} = 10$)

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัด
ระดับประคอง

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปรับตัวทางสังคมจำแนกเป็นรายด้าน
และโดยรวมก่อนและหลังการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดระดับประคอง

การปรับตัวทางสังคม	ก่อนทดลอง (N = 20)		หลังทดลอง (N = 20)		t-test
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
- ด้านความสามารถในการเรียน หรือการทำงานอาชีพ	1	.000	1.85	.366	-10.376
- ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล ในครอบครัว	1.95	.223	2.80	.410	-10.376
- ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล ในสังคม	1.8	.410	2.25	.716	-3.943
- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ของตนเอง	2	.458	2.95	.510	-10.782
- การปฏิบัติกิจกรรมยามว่าง	1.5	.513	2.05	.786	- 6.097
รวม	8.25	1.164	12.15	2.19	-14.832

* p < .05

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อนำค่าเฉลี่ยของคะแนนการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้กลุ่มบำบัดระดับประคองรายด้าน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันด้วย Dependent t-test พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคะแนนการปรับตัวทางสังคม หลังได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัดระดับประคองสูงขึ้น หมายถึง มีการปรับตัวทางสังคม ดีขึ้นในทุกด้าน