

ความเรียบในภาษาต้องญี่ปุ่นที่มีอาการหนัก



นางมาลี ล้านแก้ว

002396

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปรัชญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
ภาควิชาพยาบาลศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2522

Stress in the Relatives of Critically Ill Patients


Ms., Malee Launkaow

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  
Department of Nursing Education  
Graduate School  
Chulalongkorn University  
1979


หัวขอวิทยานิพนธ์	ความเครียดในญาติของบุตรป่วยที่มีอาการหนัก
โดย	นางมาสี ลวนแก้ว
ภาควิชา	พยาบาลศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานพันธ์ บุญธรรม


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นิเวศน์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

  
..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานพันธ์ บุญธรรม)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานพันธ์ บุญธรรม)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว บุญยกนก)

จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความเชี่ยวชาญของผู้เขียนที่มีอาการหนัก
ชื่อ	นางมาลี จวนแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานัน พู - ลด
ภาควิชา	พยาบาลศึกษา
ปีการศึกษา	2522



บหคดบอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงตัวแปรของผู้ที่บุปผายที่มีอาการหนักกับระดับของความเครียด และบัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเครียดในผู้ที่ของผู้บุปผายที่มีอาการหนัก ตัวอย่างประชากรคือ ผู้ที่ของผู้บุปผายที่มีอาการหนักซึ่งรับไว้รักษาในแผนกอาชุดกรรม แผนกศัลยกรรมและแผนกอุณาระบบ โรงพยาบาลส่งชลฯ จังหวัดสิงห์ลฯ จำนวน 150 คน เท่านั้นที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ผู้บุปผายที่รับไว้รักษา โดยนำใบหัวใจความเครียด ความเนื่องหา และหากความเพียงของแบบสัมภาษณ์ ให้ก้าวความเพียง 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการทดสอบ มัชชินเมทริกซ์ ความเมี่ยงเหงามาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของมัชชินเมทริกซ์โดยการทดสอบ ค่าที่ ( $t$ -test) วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบมัชชินเมทริกซ์ของความเครียดในตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วยวิธีโซส (S-Method)

## ผลการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ผู้ที่บุปผายที่มีอาการศักดิ์สูง มีค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงกว่าผู้ที่มีอาการศักดิ์สูง แต่แผลคางเฉลี่ยของความเครียดที่สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ผู้ที่บุปผายที่มีอาการศักดิ์สูง จะมีระดับความเครียดค่อนข้างสูงกว่าผู้ที่มีอาการศักดิ์สูง”

2. อาชญากรรมที่แทรกทั้งกัน มีค่าเฉลี่ยของความเครียดแทรกทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เที่ยงสองครึ่ง คือกลุ่มอายุ 15 - 25 ปี กลุ่มอุमายุ 41 - 60 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 25 ปีมากกว่ากลุ่มอายุเกินกว่า 61 ปี จึงรับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่กล่าวว่า "อาชญากรรมที่แทรกทั้งกัน จะมีระดับความเครียดแทรกทั้งกัน"

3. ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมต่อผู้ป่วยในสังคมที่แทรกทั้งกัน มีค่าเฉลี่ยของความเครียดที่ไม่แทรกทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 คือกลุ่มที่เป็นบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลการกำกับดูแลที่เป็นสามีภรรยาและบุตร กลุ่มที่เป็นสามีภรรยาและบุตรอุปการะ กลุ่มที่เป็นบุตรกับผู้ดูแลการะ จึงรับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมต่อผู้ป่วยในสังคมที่แทรกทั้งกัน ระดับความเครียดจะแทรกทั้งกัน"

4. กลุ่มที่เป็นสามีภรรยามีค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงที่สุด จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า "ผู้ป่วยหนักที่เป็นผู้ดูแลการะ จะ瓜ให้ดูแลคือจะระดับความเครียดสูงกว่า ระดับความเครียดของญาติที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในสังคมอื่น ๆ "

5. ญาติที่เป็นโสด มีค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงกว่าญาติที่สมรสแล้ว จึงรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่กล่าวว่า "ญาติที่เป็นโสดจะมีระดับความเครียดสูงกว่าญาติที่สมรสแล้ว" ค่าเฉลี่ยของความเครียดของค้าขายห้างทองกลุ่มแทรกทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

## ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title            Stress in the Relatives of Critically Ill Patients  
Name                  Ms. Malee Leunkcow  
Thesis Advisor        Assistant Professor Parmun Boon -Long  
Department            Nursing Education  
Academic Year        1979

### Abstract

The purpose of this thesis was to study characteristics of the relatives of critically ill patient and factors that influence the level of stress in the relatives of critically ill patients. The selected samples were 150 relatives of critically ill patients who were admitted to the medical, surgical and pediatrics departments in Songkhla Hospital, Songkhla Province. The questionnaires were developed by the researcher. The pre -test was carried out for content validity and reliability. The reliability was 0.82 by using the coefficient alpha method. The data was analyzed by using various statistical methods such as percentage, arithmetic mean, standard deviation, t -test, analysis of variance and S - Method.

### The Major Findings

1. The level of stress in relatives with higher educational backgrounds was higher than the level of stress in relatives with lower educational backgrounds, but there was no statistically significant difference at the .05 level. The hypothesis was rejected. The statement of hypothesis is "relatives with higher educational backgrounds had higher

level of stress than relatives with lower educational backgrounds."

2. There was a statistically significant difference in the level of stress between two pairs of age groups, namely a group of 15 - 25 year olds compared with a group of 41 - 60 year olds and a group of 15 - 25 year olds compared with a group of over 61 year olds at the .05 level. The hypothesis was retained. The statement of hypothesis is "relatives with different ages should have difference level of stress."

3. There was no statistically significant difference in the level of stress among four pairs of relative, namely parents compared with guardians, couples compared with children, couples compared with children, couples compared with guardians and children compared with guardians at the .05 level. The hypothesis was retained. The statement of hypothesis is "different relations between relatives and patients should have difference level of stress."

4. The findings showed that level of stress in the couples group was the highest. The hypothesis was rejected, since there was no statistically significant difference at the .05 level. The statement of hypothesis is "level of stress in the relatives of critically ill patient who were the guardians was the highest."

5. Singles relatives had higher level of stress than married relatives. There was a statistically significant difference between two groups of marrieds at the .05 level. The hypothesis was retained. The statement of hypothesis is "single relatives had higher level of stress than married relatives."

## กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สร้างขึ้นโดย อาจารย์ไครัตน์ค่าແນະนำ และความ羨慕 เหลือในการแก้ไขข้อก่อเรื่องค้าง ๆ เป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานันน พูด-หลง อาจารย์บุญศรุทุกมการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์หวงแหวน บุณยกนก ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านสังคม ผู้ช่วยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง

นอกจากผู้ช่วยข้อขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังฆา เจ้าหน้าที่พยาบาลและญาติผู้ป่วยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นอย่างดี ตลอดจนคุณเรณุมาศ วิจิตรตันตะ คุณพันธ์ สังขารรโโน อุณประดี บุญเจ้ารุ คุณธรรมเรือง อินิกา และคุณกมนพร ลวนแหวน ที่ให้ช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จได้ด้วยดี

มาดี ลวนแหวน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	ก
ทิศทางการประทุม .....	ก
รายการตารางประทุม .....	ก
รายการแผนภูมิประทุม .....	ก
บทที่	



### 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	6
ปัญหาของการวิจัย .....	6
สมมติฐานของการวิจัย .....	7
ขอบเขตของการวิจัย .....	7
ข้อคล้องเบื้องต้นของการวิจัย .....	8
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย .....	8
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .....	8
ความหมายของคำที่ใช้ในการวิจัย .....	9

### 2 วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับความเครียด .....	11
ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับบุญบุพเพื่ออาชารนัก .....	26

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่

หน้า

ความเกี่ยวกับในรากศัพท์ของบุปผายที่มีอาการพยักและแนวทางการ  
ดูดเหลืออยู่ติด ..... 33

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..... 42

### 3 วิธีค้นนินภัยวิธี

ตัวอย่างนินภัยที่ใช้ ..... 47

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..... 47

การหาความต้องการเนื้อหา ..... 49

การหาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ..... 50

การเก็บรวบรวมข้อมูล ..... 50

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ..... 52

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..... 57

5 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย ..... 81

การอภิปรายผลการวิจัย ..... 83

ขอเสนอแนะ ..... 89

สารบัญ (กอ)

บทที่	หน้า
บรรณานุกรม .....	96
ภาคเรนวก .....	103
ประวัติย่อ .....	122

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 ระดับการทิ้งขยะของผู้ติดญี่ปุ่น	59
2 ระดับอายุของผู้ติดญี่ปุ่น	60
3 สถานภาพการสมรสของผู้ติดญี่ปุ่น	61
4 การจัดอันดับค่าແຜນของสาเหตุหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด	63
5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามระดับการศึกษา	72
6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามกลุ่มอายุ	73
7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นที่อาชญากรรมกัน	74
8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามกลุ่มอาชญากรรมกัน	75
9/ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น	76
10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในลักษณะที่แตกต่างกัน	77
11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นโดยวิธีโอล	78
12 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในผู้ติดญี่ปุ่นตามสถานภาพการสมรส	79

รายการแผนภูมิประจำกอง

กราฟรูปที่

หน้า

1	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเกี่ยวกับเป็นรายหมวด จำแนกตามระดับการศึกษา .....	68
2	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเกี่ยวกับเป็นรายหมวด จำแนกตามอายุ .....	69
3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเกี่ยวกับเป็นรายหมวด จำแนกตามสถานภาพการสมรส .....	70
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเกี่ยวกับเป็นรายหมวด จำแนกตามความสัมพันธ์ .....	71

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย