

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แขวงสี่พระยาและมหาพฤฒาราม



นาย อนุสรณ์

สุนทรพงศ์

006346

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสังคมนตรีมหาบัณฑิต

แผนกวิชาสังคมนตรีและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาประชากรศาสตร์)

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๒

FACTORS RELATED TO HEALTH PRACTICES
OF PEOPLE IN TAMBOL SIPHYA AND
MAHAPRIUDTHARAM

Mister Anusorn Suntarapongsa

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Arts. (Demography)

Department of Sociology and Anthropology

Graduate School

Chulalongkorn University

1979

ผลของการวิจัยได้ว่า

๑. ลักษณะการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัย ในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝีฉีดวัคซีน (การรับภูมิคุ้มกัน) ของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ได้รับภูมิคุ้มกันแต่ละชนิด (มี D.P.T, B.C.G, Small pox และ polio) มากกว่าร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป สัดส่วนในการรับภูมิคุ้มกันของเด็ก ระหว่างเชื้อชาติไทยและจีน และระหว่างความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัวอย่างใกล้ชิดและห่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน

๒. การปฏิบัติตัวก่อนคลอด การคลอด และการปฏิบัติตัวหลังคลอด ของสตรีอายุ ๑๕-๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี ปรากฏว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี ส่วนใหญ่มากกว่า ๓ ใน ๔ ได้ไปทำการตรวจครรภ์ก่อนคลอด และส่วนมากใช้บริการที่โรงพยาบาลของเอกชน การคลอดร้อยละ ๘๑.๗๘ คลอดมีชีวิตร ส่วนใหญ่ไปคลอดที่โรงพยาบาลเอกชน สำหรับการตรวจหลังคลอดมีสัดส่วนต่ำกว่าการตรวจครรภ์ก่อนคลอด สำหรับปัจจัยที่นำมาศึกษาหาความสัมพันธ์คืออายุและการศึกษา และความแตกต่างในการปฏิบัติตัวก่อนคลอด การคลอดและการปฏิบัติตัวหลังคลอด ไม่พบความสัมพันธ์และความแตกต่างที่แน่ชัด

๓. การเจ็บป่วยและการรักษาในรอบ ๑ ปี ประชาชนที่เจ็บป่วยมีร้อยละ ๒๕.๒๔ ของประชากรที่ศึกษาทั้งหมด ในจำนวนผู้ที่เจ็บป่วยกว่าครึ่งเล็กน้อย ป่วยด้วยโรกระบบทางเดินหายใจ รองลงมาป่วยด้วยโรกระบบทางเดินอาหาร การทำการรักษาส่วนใหญ่นิยมทำการรักษาที่คลินิกแพทย์เอกชน รองลงมาซื้อยาไปรักษาเองที่บ้าน ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาศึกษาผลต่อการเจ็บป่วยและการรักษาในรอบ ๑ ปี ปรากฏว่าไม่มีความสัมพันธ์และไม่พบความแตกต่างอย่างแน่ชัด

๔. การคุมกำเนิด ศึกษาในสตรีอายุ ๑๕-๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี มีการปฏิบัติในการคุมกำเนิดร้อยละ ๔๖.๖๗ ส่วนมากใช้วิธีทำหมัน (โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป) รองลงมารับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด สถานที่ที่รับบริการในการคุมกำเนิด ส่วนใหญ่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ รองลงมาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเอกชน

สำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า ๓๐ ปีลงไป ส่วนใหญ่ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบไม่ถาวรที่ใช้
มากได้แก่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ส่วนสตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป การคุมกำเนิด
โดยวิธีถาวรได้แก่การทำหมัน มีสัดส่วนสูง สตรีที่อาศัยอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่นิยม
รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ในขณะที่สตรีที่อยู่ในย่านการค้าและย่านสลัม นิยมทำหมันมาก
กว่า สำหรับเชื้อชาติและการศึกษาจากการวิเคราะห์ไม่พบความแตกต่างของสัดส่วนในการ
ปฏิบัติวิธีคุมกำเนิดอย่างแน่ชัด

การศึกษานี้มีข้อจำกัดของข้อมูล การปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
หลายแห่ง ตลอดทั้งมิได้พิจารณาตัวแปรภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ อิทธิพลทางการสื่อสารมวลชน
(เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในชุมชนและทัศนคติต่อระบบ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าในโอกาสต่อไป



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title Factors related to health practices of people
 in Tambol Siphya and Mahapriudtharam.
Name Mister Anusorn Suntarapongsa.
Thesis Advisor Assistant professor Dr. Pricha Singharaj.
Department of Sociology and Anthropology.
Academic year 1978.

ABSTRACT

The objectives of this study are to explore the pattern of health behavior and relating factors which influence the health behavior of the population in urban settings.

Data used in this study derived from the report of the study on "The utilization of Medical and Health services of Residents in Sipraya and Mahapruetaram 1975" which conducted as a joint project between the Faculty of Public Health, Mahidol University and Public Health Bureau, Bangkok Metropolis in March-April 1976. Data were collected by household interview using 30 last year students of the Faculty of Public Health as interviewers. Population in Sipraya and Mahapruetaram were sampling using household as a unit of sampling under systematic random sampling technique. Sample size consisted of 538 households with 3,663 population. Eligible respondents must be 20 years old and over and must be able to give individual information of every member in the household.

2

The results of the study revealed that

(1) More than 65% children under 5 years old received D.P.T, B.C.G, Small pox and polio immunization. No difference in ethnic groups between Thai and Chinese including the close relationship or non-close relationship to the head of household were observed.

(2) About the practices on prenatal, labor and post natal care of the eligible women (women aged 15-49 years old married and live with husband) in the last 5 years, 3/4 of pregnant women went to the prenatal clinic and most of them used private hospitals or clinics. Most of them had delivery at the private hospitals and 81.78% delivered live births. Post natal care became less attention than antinatal care. The study of influencing factors such age and education revealed no influence on the practices.

(3) Concerning about illness and management of illness during the last 1 year, 29.24% of population got sick. The most common disease was respiratory diseases (about 50%), the second is the gastro-intestinal diseases. For management of their illness, most of them preferred to go to private clinics and the drugstores were the second place. No difference in practices among ethnic group, occupation, sex, education, relation to head of household, marital status and types of household (residential, commercial and slum).

(4) Practice in birth control, the study of eligible women found that 46.67% of them practised birth control. Sterilization was the most common method, pill were the second. Most of them received the service from the governmental hospitals more than private hospitals. Sterilization which was the permanent method was found among the women aged 30 years old and over. The younger women (less than 30 years old) preferred pills which was temporary method. The women in the residential area preferred to use pills while the women in the commercial area and the slum area preferred to use the permanent method. The study on education and ethnic groups revealed no difference in the practice of family planning

The limitations of this study seem to depend on data collections which do not meet the required informations. There are many factors which can not be studied such as the influence of mass media (newspaper, radio and television), living behavior in that community, attitude of the people toward the health service system. These factors need further research.

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ครั้งนี้,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สิงห์ราช
ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจแก้ไขให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ คณะคณาจารย์สาขารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ใช้
ข้อมูลจากโครงการวิจัยเรื่อง "การใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แขวงสีพระยา
และมหาพฤฒาราม พ.ศ. ๒๕๑๘"

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวรัตน์ ประภักษ์ขาม
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ คณะสาขารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์การพิมพ์ เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์ ตลอดจนคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

และขอขอบคุณสำหรับคุณสุภาพ ธรรมรักษ์ ที่ได้ช่วยเหลือและให้กำลังใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสุจิตรา แก้วทอง และคุณอุไร เสรีขจรกิจเจริญ
ที่กรุณาช่วยพิมพ์จนสำเร็จ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์และข้าราชการในภาควิชาชีวสถิติ คณะสาขารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่ช่วยเหลือให้ความสะดวกและกำลังใจ จนการวิจัยครั้งนี้สำเร็จ
ลงด้วยดี.

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ช
กิตติกรรมประกาศ	ญ
รายการตารางประกอบ	ฉ
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ระเบียบวิธีวิจัย	๑๘
บทที่ ๓ ลักษณะการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัย	๒๗
บทที่ ๔ ปัจจัยที่ยังผลต่อการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัย	๓๗
บทที่ ๕ สรุปและข้อ เสนอแนะ	๑๓๔
บรรณานุกรม	๑๓๖
BIBLIOGRAPHY	๑๓๘
ประวัติผู้เขียน	๑๔๐

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
๑	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามอายุและเพศ	๒๓
๒	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตาม เชื้อชาติ	๒๔
๓	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส	๒๔
๔	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามการนับถือศาสนา	๒๕
๕	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษา	๒๕
๖	ประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพ	๒๖
๗	อัตราส่วนร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จำแนกตามชนิด ของภูมิคุ้มกัน	๒๘
๘	อัตราส่วนร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จำแนกตามชนิด ภูมิคุ้มกัน และสถานที่ที่ไปรับภูมิคุ้มกัน	๒๘
๙	จำนวนและร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงาน อยู่กินกับสามี ที่ตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา จำแนกตามลักษณะการไปรับบริการตรวจครรภ์ก่อนคลอด	๓๐
๑๐	จำนวนและร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงาน อยู่กินกับสามี ที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดมีชีวิตในรอบ ๕ ปี จำแนกตามสถานที่ที่คลอด	๓๒

ตารางที่

หน้า

๑๑	จำนวนและร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามีที่คลอดครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี จำแนกตามสถานที่ไปตรวจหลังคลอด	๓๒
๑๒	จำนวนและร้อยละของสตรีที่คลอดครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี จำแนกตาม เหตุผลที่ไม่ไปรับการตรวจหลังคลอด	๓๓
๑๓	ประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามระบบของโรคที่เจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี และสถานที่ที่ไปทำการรักษา	๓๔
๑๔	จำนวนและร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานและอยู่กินกับสามี จำแนกตามสถานที่ที่รับบริการและวิธีการวางแผนครอบครัว	๓๖
๑๕	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามกลุ่มอายุ และการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๐
๑๖	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามกลุ่มอายุและการดูแลก่อนคลอดของการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๑
๑๗	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุ และสถานที่ที่ไปตรวจครรภ์ของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๒
๑๘	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุ และสถานที่ที่คลอดครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๔

ตารางที่

หน้า

๑๙	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุ และการตรวจหลังคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๕
๒๐	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุ และสถานที่ที่ไปตรวจหลังคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๔๖
๒๑	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามเพศและการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๔๘
๒๒	อัตราส่วนของการเจ็บป่วยตามหมวดอายุ และ เพศ	๕๐
๒๓	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่เจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี จำแนกตามโรคที่เจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี และเพศ	๕๑
๒๔	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่ไปทำการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี จำแนกตามเพศและสถานที่ที่ทำการรักษา	๕๒
๒๕	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุและการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๕๔
๒๖	อัตราส่วนร้อยละของสตรีที่มีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปีที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามกลุ่มอายุและวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๕๕
๒๗	อัตราส่วนร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จำแนกตามเชื้อชาติและการตรวจสุขภาพเด็กดี	๕๗

ตารางที่

หน้า

๒๘	อัตราส่วนร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จำแนกตาม เชื้อชาติ และชนิดของภูมิคุ้มกัน	๕๘
๒๙	อัตราส่วนร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จำแนกตาม ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และการตรวจสุขภาพเด็กดี	๕๙
๓๐	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม เชื้อชาติ และการดูแลก่อนคลอดของการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๑
๓๑	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม เชื้อชาติ และสถานที่ที่ไปตรวจครรภ์ของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๑
๓๒	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม เชื้อชาติ และสถานที่คลอดครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๒
๓๓	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม เชื้อชาติ และการตรวจหลังคลอด	๖๒
๓๔	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัวและการดูแลก่อนคลอดของการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๔
๓๕	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และสถานที่ไปตรวจครรภ์ของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๔
๓๖	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตาม ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และสถานที่คลอดครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๕

ตารางที่

หน้า

๓๗	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และการตรวจหลัง คลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๕
๓๘	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามการศึกษา และการตรวจครรภ์ก่อนคลอด ของการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๗
๓๙	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กิน กับสามี จำแนกตามการศึกษาและสถานที่ที่ไปตรวจครรภ์ก่อน คลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๗
๔๐	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามการศึกษาและสถานที่ที่คลอดครรภ์สุดท้ายใน รอบ ๕ ปี	๖๘
๔๑	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามการศึกษาและสถานที่ที่ไปตรวจหลังคลอดของ ครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๖๘
๔๒	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย และการดูแลก่อนคลอดของ ครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๗๑
๔๓	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย และสถานที่ที่ดูแลก่อน คลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๗๑
๔๔	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่แต่งงานอยู่กิน กับสามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่ไปคลอด ครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๗๒

ตารางที่

หน้า

๔๕	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๕ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย และสถานที่ที่ไปตรวจหลังคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๗๒
๔๖	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามเชื้อชาติและการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๗๔
๔๗	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามเชื้อชาติและโรคที่ป่วยในรอบ ๑ ปี	๗๔
๔๘	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามเชื้อชาติและสถานที่ที่ไปทำการรักษา	๗๕
๔๙	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส และการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๗๗
๕๐	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส และโรคที่ป่วยในรอบ ๑ ปี	๗๘
๕๑	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส และสถานที่ไปทำการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๗๙
๕๒	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๑
๕๓	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๑

๕๔	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และสถานที่ที่ไปทำการรักษาเมื่อเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๒
๕๕	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว และโรคที่ป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๓
๕๖	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษา และการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๕
๕๗	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามการศึกษาและการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๕
๕๘	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษา และสถานที่ที่ไปทำการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๖
๕๙	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามการศึกษา และสถานที่ที่ไปทำการรักษาเมื่อเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๗
๖๐	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยและการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๐
๖๑	อัตราส่วนร้อยของประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย และโรคที่ป่วยในรอบ ๑ ปี	๘๑

ตารางที่		หน้า
๖๒	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตาม ประเภทที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่ไปทำการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ในรอบ ๑ ปี	๔๒
๖๓	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามเชื้อชาติ และการปฏิบัติในการวางแผน ครอบครัว	๔๔
๖๔	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามเชื้อชาติและวิธีของการปฏิบัติในการวางแผน ครอบครัว	๔๕
๖๕	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามเชื้อชาติ และสถานที่ที่รับบริการในการวางแผน ครอบครัว	๔๖
๖๖	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามการศึกษาและการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๔๘
๖๗	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามการศึกษาและวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๔๙
๖๘	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามการศึกษาและสถานที่ที่ใช้บริการในการวางแผน ครอบครัว	๕๐๐

ตารางที่

ท
หน้า

๖๙	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๑๐๒
๗๐	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยและวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๑๐๓
๗๑	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่รับบริการในการวางแผนครอบครัว	๑๐๔
๗๒	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอาชีพและการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๐๕
๗๓	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอาชีพ และการปฏิบัติในการตรวจครรภ์ก่อนคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๐๕
๗๔	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอาชีพ และสถานที่ที่ไปรับบริการตรวจครรภ์ก่อนคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๐๕
๗๕	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอายุ และสถานที่ที่คลอดครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๑๐
๗๖	อัตราส่วนร้อยของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอาชีพ และการตรวจหลังคลอดของครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๑๑

ตารางที่

๒

หน้า

๗๗	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับสามี จำแนกตามอาชีพ และสถานที่ที่ไปรับบริการตรวจหลังคลอดของ ครรภ์สุดท้ายในรอบ ๕ ปี	๑๑๒
๗๘	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพ และการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๑๑๔
๗๙	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพและโรคที่ป่วยในรอบ ๑ ปี	๑๑๕
๘๐	อัตราส่วนร้อยละของประชาชนที่ตก เป็นตัวอย่างที่มีอายุ ๑๑ ปีขึ้นไป จำแนกตามอาชีพ และสถานที่ที่ไปทำการรักษา เมื่อเกิดการเจ็บป่วยในรอบ ๑ ปี	๑๑๖
๘๑	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามอาชีพ และการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว	๑๑๙
๘๒	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามอาชีพและวิธีของการปฏิบัติในการวางแผน ครอบครัว	๑๒๐
๘๓	อัตราส่วนร้อยละของสตรีอายุ ๑๕ - ๔๙ ปี ที่แต่งงานอยู่กินกับ สามี จำแนกตามอาชีพ และสถานที่ที่รับบริการในการวางแผน ครอบครัว	๑๒๑