

บทที่ ๓

ผลการวิจัย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามลักษณะดังนี้

1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานเดียวชนชั้นผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย
 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานเดียวของเยาวชนชายผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย
 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานเดียวของเยาวชนหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย
 5. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานเดียวของเยาวชนชายและเยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
- กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 92 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
- 1.1 กลุ่มตัวอย่างเยาวชนผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย จำนวน 46 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิง 26 คน มีอายุเฉลี่ย 20.4 ปี
 - 1.2 กลุ่มตัวอย่างเยาวชนผู้ไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย จำนวน 46 คน เป็นชาย 20 คน และเป็นหญิง 26 คน มีอายุเฉลี่ย 22.09 ปี

ดังไปจะได้เสนอข้อมูลบางประการเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มเยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย ตามลักษณะดังนี้

ตารางที่ 2 กสุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงมีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย

จำแนกตามสถานภาพการสมรส

สถานภาพการสมรส	ชาย		หญิง	
	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ
โสด	16	16	17	19
สมรส	4	4	6	7
หมาย อ. หย่า	-	-	-	-
แยก	-	-	3	-
รวม	20	20	26	26

หมายเหตุ แยก หมายถึง การสื้นสุดการสมรสโดยการแยกกันของอย่างถาวร แต่การสมรส

ไม่ได้สื้นสุดตามกฎหมาย (อ่านที่ อภากิริม 2525 : 26)

ศูนย์วิทยบริการ
คุ้มครองเด็กไทย

ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิง มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวดาย

จำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	ชาย		หญิง	
	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา	4	7	6	8
รับจ้าง	8	6	10	7
ค้าขาย	3	4	3	5
ท่านา	2	1	2	1
รับราชการ	1	2	2	3
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	2	-	3	2
รวม	20	20	26	26

ตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิง มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวดาย

จำแนกตามสาดบการเกิด

สาดบการเกิด	ชาย		หญิง	
	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ
บุตรคนแรก	7	6	7	8
บุตรคนกลาง	12	7	15	9
บุตรคนสุดท้อง	1	5	2	6
บุตรคนเดียว	-	2	2	3
รวม	20	20	26	26

ตารางที่ 5 กสุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิง มีประวัติ และไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย

จำแนกตามสภาพของครอบครัว

สภาพของครอบครัว	ชาย		หญิง	
	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ	มีประวัติ	ไม่มีประวัติ
ครอบครัว ปกติ	3	12	7	16
ครอบครัวมีการทะเลาะเบาะ เป็นประจำ	9	4	9	2
ครอบครัวแตกแยก อยู่กับมารดา	2	2	-	4
ครอบครัวแตกแยก อยู่กับบิดา	-	-	2	2
ครอบครัวแตกแยก อยู่กับผู้อื่น	3	1	1	-
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต	3	1	7	2
รวม	20	20	26	26

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 6 กสิกรรมตัวอย่าง เยาวชนชายนะและหญิงผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย จำแนกตาม

จำนวนครั้งของ การพยาบาลข้าตัวตาย

จำนวนครั้งของ การพยาบาลข้าตัวตาย	ชาย	หญิง
5	-	1
3	-	2
2	1	5
1	19	18
รวม	20	26

ตารางที่ 7 กสิกรรมตัวอย่าง เยาวชนชายนะและหญิงผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย จำแนกตาม

รายงานสภาพปัญหาและความรู้สึกในขณะกระทำ การพยาบาลข้าตัวตาย

สภาพปัญหาและความรู้สึก	ชาย	หญิง
หนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้	5	10
ลงโทษผู้ที่เป็นต้นเหตุให้รู้สึกเสียใจ	4	5
ลงโทษคนเอง	1	-
ไม่มีที่ระบายความโกรธแค้น	6	4
อยากไปเกิดใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า	2	2
ทุกดการรับรู้	2	3
พ้นทุกชนไม่เกิดอีก	-	2
รวม	20	26

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐาน
ระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย

ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐาน
ระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย ด้วยคำ t

มาตรฐาน	เยาวชนผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย (n=46)		เยาวชนผู้ไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย (n=46)		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ดีเพรสชั่น (D)	31.76	4.76	25.56	4.53	6.36 *
ไฮสตีเรีย (Hy)	28.23	6.00	23.60	6.14	3.65 *
ไซโคแพธิค ดิวอท (Pd)	26.47	4.49	21.30	4.72	5.38 *
ไซแครซีเนีย (Pt)	26.67	7.30	20.73	15.65	4.35 *

* $P < .01$

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานระหว่างกลุ่มเยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตาย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 มาตร ได้ที่กลุ่มเยาวชนผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวตายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเยาวชนผู้ไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวตายในทุกมาตรฐาน

๓. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐาน
ระหว่างเยาวชนชายผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย

ตารางที่ ๙ แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐาน
ระหว่างเยาวชนชายผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วยค่า t

มาตรฐาน	เยาวชนชายผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย (n=20)		เยาวชนชายผู้ไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย (n=20)		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ดีเพรสชั่น (D)	30.90	4.24	24.40	4.23	4.85 **
อิสทีเรีย (Hy)	28.25	6.36	22.55	4.70	3.22 **
ไซโคแพธทิก ดิวอุธ (Pd)	26.40	4.69	21.80	4.61	3.12 **
ไซแครสีเนีย (Pt)	26.10	4.98	21.70	6.49	2.40 **

** $P < .05$

จากตารางที่ ๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานระหว่างเยาวชนชายผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง ๔ มาตร และความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานดีเพรสชั่น มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง ๔ มาตร และความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานอิสทีเรีย ค่าสูงสุดคือค่า $t = 4.85$ รองลงมาคือความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานไซแครสีเนียน้อยที่สุดค่า $t = 2.40$ ความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานไซโคแพธทิกดิวอุธค่า $t = 3.22$

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานระหว่างเยาวชนหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย

ตารางที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานระหว่างเยาวชนหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วยค่า t

มาตรฐาน	เยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย (n=26)		เยาวชนหญิงผู้ไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย (n=26)		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ดีเพรสชัน (D)	32.42	5.10	26.46	4.63	4.40 **
อีสท์เรีย (Hy)	28.23	5.83	24.42	7.03	2.12 **
ไซโคแพททิก ดิวอุ๊ก (Pd)	26.53	4.42	20.92	4.85	4.35 **
ไซแคสซี เนีย (Pt)	27.11	8.75	20.00	4.91	3.61 **

** $P < .05$

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสักษณะบุคคลิกภาพในแต่ละมาตรฐานระหว่างเยาวชนหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยาบาลข้าตัวด้วย พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 มาตร แสดงความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานดีเพรสชัน สูงสุด ค่า $t = 4.40$ รองลงมาคือความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานไซโคแพททิก ดิวอุ๊ก ค่า $t = 4.35$ ความแตกต่างของคะแนนในมาตรฐานอีสท์เรียน้อยที่สุด ค่า $t = 2.12$

5. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตร
ระหว่างเยาวชนชายและเยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยาภยามข้าศัวด้วย

ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตร
ระหว่างเยาวชนชายและเยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยาภยามข้าศัวด้วยค่า t

มาตร	กุญแจเยาวชนชายผู้มีประวัติพยาภยามข้าศัวด้วย (n=20)		กุญแจเยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยาภยามข้าศัวด้วย (n=26)		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ดีเพรสชัน (D)	30.90	4.24	32.42	5.10	-1.07
อิสทีเรีย (Hy)	28.25	6.36	28.23	5.83	0.01
ไซโคแพธิค ดิวอท (Pd)	26.40	4.69	26.53	4.42	-0.10
ไซแครสซ์ เนีย (Pt)	26.10	4.98	27.11	8.75	0.49

P < .01

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละมาตรระหว่างเยาวชนหญิง และเยาวชนชายผู้มีประวัติพยาภยามข้าศัวด้วย พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกมาตร