

ผลการวิจัย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เศรษฐฐานะ จำนวนบุตร และการมาตรวจตามนัดของแพทย์ โดยใช้การบรรยายในรูปของการ แจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทาง เพศ ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับการหาทาง ออกเมื่อมีความต้องการทางเพศ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง อายุเมื่อมีเพศ สัมพันธ์ครั้งแรก เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลเพศใด เพศสัมพันธ์โดยทั่วไปกับบุคคล เพศใด บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นใคร เป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ รูปแบบ ของเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ความถี่ของเพศสัมพันธ์ ความรู้สึก ต่อเพศสัมพันธ์และปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ โดยใช้การบรรยาย ในรูปของร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาทัศนคติทางเพศและ เปรียบเทียบทัศนคติทางเพศในกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรสและเศรษฐานะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ เพศ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส เศรษฐฐานะ จำนวนบุตร และการ มาตรวจตามนัดของแพทย์

ข้อมูลส่วนตัว	จำนวน (N=100คน)	ร้อยละ
อายุ (ปี)		
น้อยกว่า 20	10	10
20 ⁺ -25	36	36
25 ⁺ -30	28	28
30 ⁺ -35	15	15

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนตัว	จำนวน (N=100คน)	ร้อยละ
35 ⁺ -40	6	6
มากกว่า 40	5	5
เพศ		
หญิง	31	31
ชาย	69	69
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0
ประถมศึกษา	37	37
มัธยมศึกษา	32	32
อาชีวศึกษา	17	17
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	14	14
สถานภาพสมรส		
โสด	49	49
คู่	43	43
หม้าย, หย่า	8	8
เศรษฐานะ (บาทต่อเดือน)		
น้อยกว่า 2,500	15	15
2,501- 5,000	48	48
5,001- 7,500	16	16
7,501-10,000	13	13
มากกว่า 10,000	8	8
จำนวนบุตร (คน)		
ไม่มีบุตร	75	75
บุตร 1 คน	17	17

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนตัว	จำนวน (N=100คน)	ร้อยละ
บุตร 2 คน	4	4
บุตร 3 คน	4	4
การมาตรวจตามนัดของแพทย์		
ตรงนัด	100	100
ไม่ตรงนัด	0	0

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20⁺-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 32 มีสถานภาพสมรสโสดคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่สถานภาพสมรสคู่คิดเป็นร้อยละ 43 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,501-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 โดยส่วนใหญ่ยังไม่มียุติบัตร คิดเป็นร้อยละ 75 และมาตรวจตรงตามนัดของแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศชายเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
----------------	----------------------------	----------------------------

1. เมื่อมีความต้องการทางเพศ

ค้นหาทางออกด้วยวิธีใดบ่อยที่สุด

1.1 สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	37.7	46.4
1.2 เล่นกีฬา	4.3	13.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
1.3 เล่นดนตรี	0	1.4
1.4 อ่านหนังสือ	7.2	5.8
1.5 มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม	36.2	18.8
1.6 มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	5.8	1.4
1.7 เก็บความรู้สึกไว้	7.2	11.6
1.8 อื่น ๆ ได้แก่ ดูทีวี	1.4	1.4
2. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือไม่		
2.1 ใช่	89.9	75.4
2.2 ไม่ใช่	10.1	24.6
3. เมื่อท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองท่านคิดถึง บุคคลเพศใด		
3.1 เพศเดียวกันเท่านั้น	6.5	9.6
3.2 เพศตรงข้ามเท่านั้น	71.0	73.1
3.3 ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศเดียวกันกับท่าน มากกว่า	4.8	7.7
3.4 ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศตรงข้ามกับท่าน มากกว่า	1.6	0
3.5 ทั้งสองเพศเท่า ๆ กัน	1.6	1.9
3.6 ไม่เคยจินตนาการ	14.5	7.7
4. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการสำเร็จความใคร่ ด้วยตนเองของท่าน		
4.1 รู้สึกพอใจ	40.3	40.4
4.2 รู้สึกไม่พอใจ	4.8	1.9

ตารางที่ 4 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
4.3 รู้สึกอายใจ	9.7	11.5
4.4 เฉย ๆ	45.2	46.2
5. ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลเพศใด		
5.1 เพศเดียวกัน	14.5	-
5.2 เพศตรงข้าม	85.5	-
6. โดยทั่วไปท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศใด		
6.1 เพศเดียวกันเท่านั้น	14.5	11.6
6.2 เพศตรงข้ามเท่านั้น	81.2	78.3
6.3 ได้ทั้งสองเพศ	4.3	2.9
6.4 ไม่มีเพศสัมพันธ์	0	7.2
7. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นใคร		
7.1 คู่รัก	42.0	34.4
7.2 สามีหรือภรรยาของท่าน	24.6	31.2
7.3 หญิงบริการ	71.0	51.6
7.4 ชายบริการ	8.7	1.6
8. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านใช้ยาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้นหรือไม่		
8.1 ใช่	1.4	0
8.2 ไม่ใช่	29.0	42.2
8.3 ไม่ทราบ	69.6	57.8
9. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นผู้ให้บริการ ทางเพศหรือมีความสับสนทางเพศหรือไม่		
9.1 ใช่	68.2	50.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
9.2 ไม่ใช่	15.9	34.4
9.3 ไม่ทราบ	15.9	15.6
10. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบใด		
10.1 ร่วมเพศทางทวารหนัก	18.8	17.2
10.1.1 ผู้กระทำ	8.7	7.8
10.1.2 ผู้ถูกกระทำ	10.1	9.4
10.2 ร่วมเพศทางช่องคลอด	85.5	82.8
10.3 ร่วมเพศโดยใช้ปากและลิ้นร่วมด้วย	18.8	21.8
11. ท่านหรือคู่นอนของท่านใช้ถุงยางอนามัยใน การมีเพศสัมพันธ์หรือไม่		
11.1 ใช้เป็นบางครั้ง	68.1	29.7
11.2 ใช้ทุกครั้ง	5.8	64.1
11.3 ไม่เคยใช้เลย	26.1	6.2
12. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการมีเพศสัมพันธ์ ของท่าน		
12.1 พึงพอใจ	42.0	45.3
12.2 พึงพอใจบางครั้ง	50.8	35.9
12.3 ไม่พึงพอใจ	0	1.6
12.4 เฉย ๆ	7.2	17.2
13. ท่านมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่		
13.1 ไม่มี	100.0	100.0
13.2 มี	0	0

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายหาทางออกเมื่อมีความต้องการทางเพศภายหลังทราบผลการตรวจเลือด แตกต่างจากก่อนทราบผลการตรวจเลือด กล่าวคือสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันลดลง และเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเพื่อทดแทนกิจกรรมทางเพศ ได้แก่ การเล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ดูทีวีหรือเก็บความรู้สึกไว้ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมทางเพศแบบ heterosexual เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงพบพฤติกรรมทางเพศแบบ homosexual และ bisexual ร่วมด้วย โดยภายหลังทราบผลการตรวจเลือด พบว่าร้อยละ 7.2 ไม่มีเพศสัมพันธ์อีกเลย นอกจากนี้ยังพบว่ามีพฤติกรรมสับสนทางเพศ และมีพฤติกรรมทางเพศกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงบริการ ชายบริการ และผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นทั้งก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด อย่างไรก็ตามพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวลดลงภายหลังทราบผลการตรวจเลือด รูปแบบของเพศสัมพันธ์ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือดของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีการร่วมเพศทางช่องคลอดเป็นส่วนใหญ่ และมีการร่วมเพศทางทวารหนักใกล้เคียงกับการใช้ปากและลิ้นร่วมด้วย สำหรับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยนั้นพบว่าภายหลังทราบผลการตรวจเลือด มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.8 เป็นร้อยละ 64.1 แต่ยังคงมีร้อยละ 6.2 ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย และร้อยละ 29.7 ที่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นบางครั้ง

ตารางที่ 5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล	หลังทราบผล
	การตรวจเลือด	การตรวจเลือด
1. เมื่อมีความต้องการทางเพศทำนหาทางออกด้วยวิธีใดบ่อยที่สุด		
1.1 สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	12.9	3.2

ตารางที่ 5 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
1.2 เล่นกีฬา	9.7	6.5
1.3 เล่นดนตรี	0	0
1.4 อ่านหนังสือ	9.7	16.1
1.5 มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม	22.6	19.4
1.6 มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	0	0
1.7 เก็บความรู้สึกไว้	41.9	51.6
1.8 อื่น ๆ ได้แก่ คู่วิว	3.2	3.2
2. ท่านเคยสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือไม่		
2.1 เคย	32.3	32.3
2.2 ไม่เคย	67.7	67.7
3. เมื่อท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองท่านคิดถึงบุคคลเพศใด		
3.1 เพศเดียวกันเท่านั้น	0	0
3.2 เพศตรงข้ามเท่านั้น	60.0	60.0
3.3 ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศเดียวกันกับท่านมากกว่า	10.0	10.0
3.4 ทั้งสองเพศแต่เป็นเพศตรงข้ามกับท่านมากกว่า	10.0	10.0
3.5 ทั้งสองเพศเท่า ๆ กัน	0	0
3.6 ไม่เคยจินตนาการ	20.0	20.0
4. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของท่าน		
4.1 รู้สึกพอใจ	30.0	20.0

ตารางที่ 5 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
4.2 รู้สึกไม่พอใจ	0	0
4.3 รู้สึกละเอียดใจ	30.0	50.0
4.4 เฉย ๆ	40.0	30.0
5. ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลเพศใด		
5.1 เพศเดียวกัน	0	-
5.2 เพศตรงข้าม	100.0	-
6. โดยทั่วไปท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศใด		
6.1 เพศเดียวกันเท่านั้น	0	0
6.2 เพศตรงข้ามเท่านั้น	100.0	93.5
6.3 ได้ทั้งสองเพศ	0	0
6.4 ไม่มีเพศสัมพันธ์	0	6.5
7. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นใคร		
7.1 คู่รัก	45.2	34.5
7.2 สามีหรือภรรยาของท่าน	54.8	65.5
7.3 หญิงบริการ	0	0
7.4 ชายบริการ	0	0
8. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านใช้ยาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้นหรือไม่		
8.1 ใช่	6.5	3.4
8.2 ไม่ใช่	80.6	86.3
8.3 ไม่ทราบ	12.9	10.3
9. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นผู้ให้บริการ ทางเพศหรือมีความสับสนทางเพศหรือไม่		

ตารางที่ 5 (ต่อ)

พฤติกรรมทางเพศ	ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผล การตรวจเลือด
9.1 ใช่	22.6	17.2
9.2 ไม่ใช่	38.7	51.8
9.3 ไม่ทราบ	38.7	31.0
10. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบใด		
10.1 ร่วมเพศทางทวารหนัก	0	0
10.1.1 ผู้กระทำ	0	0
10.1.2 ผู้ถูกกระทำ	0	0
10.2 ร่วมเพศทางช่องคลอด	100.0	100.0
10.3 ร่วมเพศโดยใช้ปากและลิ้นร่วมด้วย	22.6	20.7
11. ท่านหรือคู่นอนของท่านใช้ถุงยางอนามัยใน การมีเพศสัมพันธ์หรือไม่		
11.1 ใช้เป็นบางครั้ง	29.0	24.2
11.2 ใช้ทุกครั้ง	12.9	44.8
11.3 ไม่เคยใช้เลย	58.1	31.0
12. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการมีเพศสัมพันธ์ ของท่าน		
12.1 พึงพอใจ	16.1	20.7
12.2 พึงพอใจบางครั้ง	67.8	62.1
12.3 ไม่พึงพอใจ	0	0
12.4 เฉย ๆ	16.1	17.2
13. ท่านมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่		
13.1 ไม่มี	96.8	100.0
13.2 มี	3.2	0

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงหาทางออกเมื่อมีความต้องการทางเพศ ภายหลังทราบผลการตรวจเลือด แตกต่างจากก่อนทราบผลการตรวจเลือด กล่าวคือ สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามลดลง ทั้งนี้ไม่พบว่าเมื่อมีความต้องการทางเพศแล้วหาทางออกด้วยวิธีมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเลย ทั้งก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีพฤติกรรมทางเพศแบบ heterosexual โดยภายหลังทราบผลการตรวจเลือด พบว่าร้อยละ 6.5 ไม่มีเพศสัมพันธ์อีกเลย ในส่วนของความสำล่อนทางเพศนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีพฤติกรรมสำล่อนทางเพศแต่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้น และผู้ที่มีความสำล่อนทางเพศ รูปแบบของเพศสัมพันธ์ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือดของกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีการร่วมเพศทางช่องคลอดทุกราย และพบการใช้ปากและลิ้นร่วมด้วยเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ไม่พบที่มีการร่วมเพศทางทวารหนักเลย พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยนั้นพบว่าภายหลังทราบผลการตรวจเลือดมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.9 เป็นร้อยละ 44.8 แต่ยังคงมีร้อยละ 31.0 ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย และร้อยละ 24.2 ที่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นบางครั้ง

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ความถี่ของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย	หญิง
1. อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี)	17.913	20.419
2. ความถี่ของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (ครั้ง/สัปดาห์)		
2.1 ก่อนทราบผลการตรวจเลือด	1.919	1.600
2.2 หลังทราบผลการตรวจเลือด	2.058	1.600

พฤติกรรมทางเพศ	ชาย	หญิง
3. ความถี่ของเพศสัมพันธ์ (ครั้ง/สัปดาห์)		
3.1 ก่อนทราบผลการตรวจเลือด	2.493	2.516
3.2 หลังทราบผลการตรวจเลือด	1.891	2.276

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงโดยมีอายุเฉลี่ยในเพศชายเท่ากับ 17.913 ปี และอายุเฉลี่ยในเพศหญิงเท่ากับ 20.419 ปี ในขณะที่ความถี่ของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของเพศชายหลังทราบผลการตรวจเลือด มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.919 เป็น 2.058 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่ความถี่ของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของเพศหญิง หลังทราบผลการตรวจเลือดนั้นเท่าเดิม คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.600 ครั้งต่อสัปดาห์ และเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในเพศชายทั้งก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือดส่วนความถี่ของเพศสัมพันธ์นั้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์ลดลงหลังทราบผลการตรวจเลือดทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์ก่อนทราบผลการตรวจเลือด ใกล้เคียงกับเพศชาย คือ 2.516 และ 2.493 ครั้งต่อสัปดาห์ และค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์หลังทราบผลการตรวจเลือดในเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย คือ 2.276 และ 1.891 ครั้งต่อสัปดาห์ตามลำดับ

ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทัศนคติทางเพศ
จำแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและเศรษฐานะ

ตัวแปร	\bar{X}	S.D.
อายุ (ปี)		
น้อยกว่า 20	68.4000	7.9423
20 ⁺ -25	70.0560	7.3236
25 ⁺ -30	67.8571	7.8160
30 ⁺ -35	68.2667	7.2945
35 ⁺ -40	71.3333	11.5181
มากกว่า 40	70.2000	10.9179
เพศ		
หญิง	69.0645	8.7443
ชาย	69.1014	8.4578
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0
ประถมศึกษา	68.5405	8.9461
มัธยมศึกษา	67.7188	7.6632
อาชีวศึกษา	69.3529	10.0930
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	73.3571	6.1969
สถานภาพสมรส		
โสด	69.2245	8.3098
คู่	69.6977	8.1285
หม้าย, หย่า	65.0000	11.4518
เศรษฐานะ (บาทต่อเดือน)		
น้อยกว่า 2,500	69.0667	9.6249
2,501- 5,000	69.8333	8.9593

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ตัวแปร	X	S.D.
5,001- 7,500	66.3125	5.9073
7,501-10,000	67.6154	6.6149
มากกว่า 10,000	72.6250	10.4326

หมายเหตุ : 27 - 44 คะแนน = ต่ำ
 45 - 62 คะแนน = ปานกลาง
 63 - 80 คะแนน = ดี
 มากกว่า 80 คะแนน = ดีมาก

จากตารางที่ 7 พบว่าโดยทั่วไปผู้ติดเชื้อ HIV มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศใกล้เคียงกัน โดยผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุระหว่าง 35⁺-40 ปี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศสูงสุดคือเท่ากับ 71.3333 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.5181 เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศใกล้เคียงกันคือเท่ากับ 69.0645 และ 69.1014 ในเพศหญิงและเพศชายตามลำดับ ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศสูงสุดเท่ากับ 73.3571 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.1969 เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีสถานภาพสมรสคู่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศสูงสุดเท่ากับ 69.6977 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.1285 และผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติทางเพศสูงสุดเท่ากับ 72.6250 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.4326

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุต่างกัน

Source	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	5	105.9556	26.4889	.3568
ภายในกลุ่ม	94	7052.2344	74.2340	
รวม	99	7158.1900		

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าคะแนนทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV เพศชายและเพศหญิงด้วย t-test

ผู้ติดเชื้อ HIV	จำนวน	\bar{X}	SD	t-value	df
เพศชาย	69	69.1014	8.4578	0.02	98
เพศหญิง	31	69.0645	8.7443		

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

Source	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	3	327.4354	109.1451	1.5339
ภายในกลุ่ม	96	6830.7546	71.1537	
รวม	99	7158.1900		

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน

Source	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	150.5896	75.2948	1.0422
ภายในกลุ่ม	97	7007.6004	72.2433	
รวม	99	7158.1900		

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติ
ทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีเศรษฐานะต่างกัน

Source	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	4	278.2006	69.5501	.9604
ภายในกลุ่ม	95	6879.9894	72.4209	
รวม	99	7158.1900		

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีเศรษฐานะต่างกัน มีทัศนคติ
ทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย