



### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันโรคเอดส์ ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของแทบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2535 มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกถึง 501,272 คน จาก 168 ประเทศ สำหรับประเทศไทย กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2536 ไว้ว่า มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รวม 3,001 ราย ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์รวม 2,623 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มติดต่อการมีเพศสัมพันธ์ถึง ร้อยละ 76.7 (2,301 ราย) และร้อยละ 77.5 (2,034 ราย) นอกจากนี้กลุ่มทารกที่ติดเชื้อจากมารดาของทั้งสองกลุ่มมีจำนวนร้อยละ 8.4 (251 ราย) และร้อยละ 2.9 (76 ราย) จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ดังกล่าว จำแนกรายจังหวัดแล้วพบว่าจังหวัดเชียงราย มีจำนวนรวมของผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์มากเป็นอันดับ 1 (988 ราย) รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร (900 ราย) และจังหวัดเชียงใหม่ (867 ราย) ตามลำดับโดยจำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ดังกล่าว ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตารางที่ 1** จำนวนผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปี  
ที่เริ่มป่วยตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 สิงหาคม 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม (%)
1. เพศสัมพันธ์	1	1	-	6	2	24	46	315	989	917	2301 76.7
-ชายรักร่วมเพศ	1	-	-	5	2	9	2	5	2	-	26 0.9
-ชายรักสองเพศ	-	1	-	-	-	4	4	4	1	-	14 0.5
-ชายรักต่างเพศ	-	-	-	1	-	10	34	282	890	803	2020 67.3
-หญิงรักต่างเพศ	-	-	-	-	-	1	6	24	96	114	241 8.0
2. ยาเสพติดชนิดฉีด											
เข้าเส้น	-	-	-	1	-	2	20	30	112	102	267 8.9
-ชาย	-	-	-	1	-	2	19	30	110	100	262 8.7
-หญิง	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5 0.2
3. รับเลือด	-	-	-	-	1	1	1	3	9	2	17 0.6
-ชาย	-	-	-	-	-	1	1	3	8	1	14 0.5
-หญิง	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3 0.1
4. ติดเชื้อจากมารดา	-	-	-	-	2	2	7	67	98	75	251 8.4
-ชาย	-	-	-	-	-	1	4	35	46	48	134 4.5
-หญิง	-	-	-	-	2	1	3	32	52	27	117 3.9
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	9	54	102	165 5.5
-ชาย	-	-	-	-	-	-	-	9	50	97	156 5.2
-หญิง	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9 0.3
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>424</b>	<b>1262</b>	<b>1198</b>	<b>3001 100.0</b>
<b>ยังมีชีวิตอยู่</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>254</b>	<b>725</b>	<b>858</b>	<b>1871 62.3</b>

แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2 จำนวนผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (ARC) แยกตามปัจจัยเสี่ยงและแยกตามรายปีที่เริ่มป่วย ตั้งแต่กันยายน 2527 ถึง 31 สิงหาคม 2536

ปัจจัยเสี่ยง	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	รวม (%)
1. เพศสัมพันธ์	-	5	8	12	1	46	171	310	966	515	2034 77.5
-ชายรักร่วมเพศ	-	2	3	7	-	2	6	2	2	-	24 0.9
-ชายรักสองเพศ	-	1	4	1	-	2	2	-	2	-	12 0.5
-ชายรักต่างเพศ	-	1	-	1	1	30	130	253	837	433	1686 64.3
-หญิงรักต่างเพศ	-	1	1	3	-	12	33	55	125	82	312 11.9
2. ยาเสพติดชนิดฉีด											
เข้าเส้น	-	-	-	-	20	48	40	63	107	79	357 13.6
-ชาย	-	-	-	-	19	46	40	59	105	77	346 13.2
-หญิง	-	-	-	-	1	2	-	4	2	2	11 0.4
3. รับเลือด	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	11 0.4
-ชาย	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4 0.2
-หญิง	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	7 0.3
4. ติดเชื้อจากมารดา	-	-	-	-	-	-	10	13	45	8	76 2.9
-ชาย	-	-	-	-	-	-	5	8	21	4	38 1.4
-หญิง	-	-	-	-	-	-	5	5	24	4	38 1.4
5. ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	-	-	-	1	1	5	1	20	52	65	145 5.5
-ชาย	-	-	-	1	-	4	1	17	46	57	126 4.8
-หญิง	-	-	-	-	1	1	-	3	6	8	19 0.7
รวม	-	5	8	13	23	100	223	408	1175	668	2623 100.0
ยังมีชีวิตอยู่	-	5	8	10	14	86	206	356	993	565	2243 85.5

แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันที่มีจำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ และผู้ติดเชื้อโดยไม่มีอาการเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นสำคัญ อีกทั้งยังพบปัญหาดังกล่าวในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาเฉพาะในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นแหล่งส่งต่อที่รับรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์แห่งหนึ่งจากจำนวน 4 โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ อันประกอบด้วย โรงพยาบาลบาราศณราดูร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสและเศรษฐฐานะ

### ขอบเขตการวิจัย

การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV ของแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกคนยกเว้นผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดยาเสพติด มีฤทธิ์ และผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางกายเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว จะมีความรู้สึกทางเพศลดลงหรืออาจหมดความสนใจหรือหมดความรู้สึกทางเพศ

### นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ทัศนคติทางเพศ หมายถึง ความรู้ ความรู้สึก และความพร้อมที่จะ



กระทำเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

2. พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง กิจกรรมทางเพศที่แสดงออกได้แก่ ความสำส่อน รูปแบบและลักษณะของเพศสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย และคุณสมบัติของคู่นอนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

3. ผู้ติดเชื้อ HIV หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่มีอาการที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นต้น ได้แก่ ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) และ GPA (gel particle agglutination test) และผ่านการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แล้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV
2. เป็นประโยชน์ในการวางแผนดำเนินการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์
3. เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย