

บทที่ 4

และการวิจัย

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนตัวอย่างของมลพิษทางอากาศ

สถานที่เก็บตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ	เพศ		อายุ (ปี)							การศึกษา							อาชีพ						
			ชาย	หญิง	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80ขึ้นไป	ไม่เรียน	ป.4-7	ม.1-3 ม.ศ.1-3	ม.ศ.4-6 ปวช.	ปวช.- อนุปริญญา	ปริญญา ตรี	สูงกว่า ปริญญาตรี	1	2	3	4	5	6	7
1. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง	69	13.40	45	24	10	44	11	3	-	1	-	1	23	7	22	6	7	3	-	-	-	-	-	-	69
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข บางเขน สำนักอนามัย กทม.	50	9.71	6	44	22	21	4	1	1	-	1	3	30	8	4	4	1	-	31	4	6	-	-	-	9
3. ฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	51	9.30	24	27	22	21	6	2	-	-	-	-	12	4	8	12	15	-	1	-	1	-	-	-	49
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข บางกระบือ สำนักอนามัย กทม.	25	4.86	6	19	12	10	2	1	-	-	-	2	16	5	-	-	2	-	13	6	4	1	-	-	1
5. กองแพทย์ กรมชลประทาน	44	8.54	14	30	18	14	9	2	1	-	-	1	6	8	20	5	4	-	7	-	1	-	-	-	36
6. ศูนย์บริการสาธารณสุข ลาดพร้าว สำนักอนามัย กทม.	62	12.34	8	54	31	16	8	7	-	-	-	7	41	9	4	-	1	-	29	5	19	2	-	-	7
7. ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าคุณพระ- ประยูรวงศ์ สำนักอนามัย กทม.	37	7.18	5	32	17	6	5	6	1	1	1	3	23	8	1	2	-	-	24	8	3	-	-	-	2
8. สำนักงานแพทย์ การปราบปรามหลวง	21	4.28	4	17	7	7	4	2	1	-	-	-	5	6	6	1	3	-	3	-	2	-	-	-	16
9. สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	44	8.54	27	17	7	17	12	7	1	-	-	-	3	8	15	7	11	-	-	-	-	-	-	-	44
10. โรงพยาบาลการรถไฟแห่งประเทศไทย	36	6.39	18	18	6	5	11	9	5	-	-	2	15	14	4	1	-	-	12	6	1	-	-	-	17
11. ศูนย์บริการสาธารณสุข ประชาภิโย สำนักอนามัย กทม.	34	6.60	4	30	18	6	2	7	1	-	-	5	20	4	2	1	2	-	20	2	5	1	-	-	6
12. ธนาคารแห่งประเทศไทย	42	8.16	26	16	9	20	8	4	1	-	-	1	9	5	11	1	12	3	2	1	-	1	-	1	37
รวม	515	100	137	328	179	197	82	51	11	2	2	25	203	86	97	40	58	6	142	32	42	5	-	1	293

หมายเหตุ อาชีพ 1. แม่บ้าน 2. ไม่มีงานทำ 3. ค้าขายรายย่อย 4. รับจ้างรายวัน 5. ธุรกิจพาณิชย์ 6. พวช.- นักบวช 7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่ของการใช้บริการและการจ่ายค่าบริการ

ความถี่ของการใช้บริการ	จำนวน	ร้อยละ	การจ่ายค่าบริการ	จำนวน	ร้อยละ
1. ครั้งแรก	69	13.40	1. ไม่เสียค่าบริการ	386	74.95
2. ทุกสัปดาห์	12	2.33	2. น้อยกว่า 50 บาท	91	17.67
3. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	73	14.17	3. 51 - 100 บาท	3	0.58
4. ทุกเดือน	127	24.66	4. 101 - 300 บาท	-	-
5. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	151	29.32	5. ไม่ได้อำนาจ	35	6.80
6. มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง	83	16.12			
รวม	515	100	รวม	515	100

ตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละผู้ช้อบยากรานยา ความดีในการช้อบยและการจ่ายค่าช้อบย

ร้อยละผู้ช้อบย	ความดีในการช้อบย	จำนวน	ร้อยละ	การจ่ายค่าช้อบย	จำนวน	ร้อยละ
66.21	1. ทุกวัน	2	0.59	1. ไม่เสียค่าบริการ	6	1.76
	2. หลายครั้ง/เดือน	57	16.72	2. 1 บาท	2	0.59
	3. ทุกเดือน	107	31.38	3. น้อยกว่า 5 บาท	42	12.32
	4. หลายเดือน/ครั้ง	51	14.95	4. 6 - 10 บาท	150	43.99
	5. นานมาก	124	36.36	5. 11 - 30 บาท	120	35.19
				6. 31 - 50 บาท	16	4.70
				7. มากกว่า 50 บาท	5	1.45
จำนวน 341 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	341	100	รวม	341	100

ตารางที่ 4. ตารางแสดงวิธีการชื้อยาจากร้านขายยา

วิธีการ	จำนวน	ร้อยละ
1. มอกอาการของโรคคอบุรุษ	164	48.09
2. มอกชื้อยาคอบุรุษ	150	43.99
3. มอกชื้อกลุ่มยาคอบุรุษ	27	7.92
รวม	341	100

หมายเหตุ

1. ยาที่ผู้ป่วยซื้อโดยมอกอาการของโรค เช่น
ยาแกรอนิน, ยาแก้ปวด, ยาแก้หวัด, ยาแก้ไอ, ยาแก้แพ้, ยาแก้คัน,
ยาแก้ปวดท้อง, ยานอนหลับ, ยาแก้ท้องเสีย
2. ยาที่ผู้ป่วยซื้อโดยมอกชื้อยา เช่น
ยาแก้ไอ, ยาประศระบอโรค, ยาแก้ไอตราคะชาม 5 คิว, decolgen, paracetamol,
ampicillin, apracur, saridon, counterpain
3. ยาที่ผู้ป่วยซื้อโดยมอกชื้อกลุ่มยา เช่น
ยาคุมกำเนิด, วิตามิน

ตารางที่ 5 ตารางแสดงร้อยละผู้ให้บริการจากคลินิก ความถี่ของการให้บริการ และการจ่ายค่าบริการ

ร้อยละ ผู้ให้บริการ	ความถี่ของการให้บริการ	จำนวน	ร้อยละ	การจ่ายค่าบริการ	จำนวน	ร้อยละ
45.83	1. หลายครั้ง/เดือน	6	2.54	1. ไม่เสียค่าบริการ	5	2.12
	2. ทุกเดือน	54	22.88	2. น้อยกว่า 50 บาท	74	31.36
	3. หลายเดือน/ครั้ง	176	74.58	3. 51 - 100 บาท	123	52.12
				4. 101 - 300 บาท	34	14.40
จำนวน 236 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	236	100	รวม	236	100

หมายเหตุ

เหตุผลของการให้บริการจากคลินิก จากจำนวนผู้ป่วย 236 ราย

1. โภชนา จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.64
2. เฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จำนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.14
3. เฉพาะโรค จำนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.22

ตารางที่ 6

ตารางแสดงร้อยละผู้ให้บริการจากแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ความถี่ของการให้บริการและการจ่ายค่าบริการ

ร้อยละ ผู้ให้บริการ	ความถี่ของการให้บริการ	จำนวน	ร้อยละ	การจ่ายค่าบริการ	จำนวน	ร้อยละ
51.46	1. ทุกเดือน	12	4.53	1. ไม่เสียค่าบริการ	148	55.85
	2. หลายเดือน/ครั้ง	37	13.96	2. น้อยกว่า 50 บาท	54	20.38
	3. ปีละครั้ง	216	81.51	3. 51 - 100 บาท	21	7.92
				4. 101 - 300 บาท	11	4.15
				5. ไม่ได้นำมา	31	11.70
จำนวน 265 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	265	100	รวม	265	100

หมายเหตุ

1. สุ่มของการให้บริการจากโรงพยาบาล จากจำนวนผู้ป่วย 265 ราย
 - 1.1 โรคหัวใจ จำนวน 247 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.21
 - 1.2 อื่นๆ จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.79
2. โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยให้บริการ เช่น
ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, วชิรพยาบาล,
โรงพยาบาลกลาง

ตารางที่ 7 ตารางแสดงร้อยละผู้ให้บริการจากแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และการจ่ายค่าบริการ

ร้อยละผู้ให้บริการ	การจ่ายค่าบริการ	จำนวน	ร้อยละ
11.84	1. ไม่เสียค่าบริการ	45	73.77
	2. 500 - 1,000 บาท	3	4.92
	3. น้อยกว่า 3,000 บาท	4	6.56
	4. 3,001 - 6,000 บาท	1	1.64
	5. 6,001 - 10,000 บาท	1	1.64
	6. ไม่ได้อำนาจ	7	11.47
จำนวน 61 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	61	100

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงโรคประจำตัวของผู้ป่วยแบ่งตามระบบต่างๆ

โรคประจำตัว	จำนวน	ร้อยละ
1. Alimentary System	82	15.83
2. Cardio-Vascular System	44	8.53
3. Respiratory System	125	24.20
4. Skeleto Muscular System	42	8.25
5. Nervous System	38	7.44
6. Endocrine System	19	3.78
7. Genito-Urinary System	28	5.59
8. Eye, Ear, Nose, Throat	29	5.67
9. Skin and Skin Appendages	25	4.81
10. No Chronic Ailment	83	15.90
รวม	515	100



ตารางที่ 9 ตารางแสดงชนิดที่กินเป็นประจำของตัวอย่างที่มีโรคประจำตัว

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1. ไม่นึก	245	34.03
2. กินยาเฉพาะโรค	150	20.83
3. กินยาตามอาการ	80	11.11
4. ยาน้ำรุง	168	26.11
5. ชาสมุนไพร	32	4.45
6. ชาสมุนไพร	25	3.47
รวม	720	100

หมายเหตุ

- จำนวนรวมเกิน 515 ตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างบางรายมียาที่กินประจำมากกว่า 1 ชนิด
- ยาเฉพาะโรค เช่น
ยาโรคกระเพาะ, ยาลดความดันเลือด, ยาแก้ลม, ยาแก้ลมประสาท, ยาโรคเบาหวาน,
ยาโรคหัวใจ, ยารักษาโรค
- ยาตามอาการ เช่น
ยาแก้ปวดท้อง, ยาแก้ไอ, ยาแก้ปวดหัว, ยาระบาย
- ยาน้ำรุง เช่น
วิตามิน
- ชาสมุนไพร เช่น
ชาหอม, ชาสมุนไพร, ชาดอก

ตารางที่ 10 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มีอาการต่าง ๆ

อาการต่าง ๆ	วิธีปฏิบัติ						
	ร้อยละ ผู้ลงมือ ทำเอง	ร้อยละ รักษาตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับยา	ร้อยละ พบแพทย์	ร้อยละ รับยา จากภรรยา	ร้อยละที่รับยาต่างๆเอง		
					ไม่รับยา	รับยา	ยาอื่น ๆ
เป็นไข้	7.28	4.86	34.44	13.91	11.26	24.94	3.31
ปวดหัว	9.94	5.40	24.41	13.61	14.25	27.43	4.96
เป็นหวัด	9.03	5.38	32.69	15.70	13.33	23.44	0.43
ไอ เจ็บคอ	7.54	3.65	41.12	14.36	14.84	13.87	4.62
นอนไม่หลับ	46.38	13.82	27.96	2.30	4.60	3.62	1.32
ท้องเสีย	16.24	5.00	22.50	6.56	13.63	33.13	2.94
ปวดเมื่อย	32.63	17.84	15.73	3.52	4.46	22.07	3.75
เป็นผด	11.80	7.38	23.25	1.85	8.49	42.44	4.70
คัน	11.55	13.86	36.63	4.95	8.25	15.52	9.24
เจ็บตา	13.88	13.52	45.91	11.39	11.03	4.27	-

ตารางที่ 11 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยมีอาการต่าง ๆ (จากตารางที่ 10)

อาการต่าง ๆ	วิธีปฏิบัติ		
	ร้อยละที่ไม่รักษา ¹	ร้อยละที่พบแพทย์	ร้อยละที่รักษาเอง ²
เป็นไข้	12.41	36.44	53.42
ปวดหัว	26.00	23.06	56.94
เป็นหวัด	14.41	32.69	52.90
ไอ เจ็บคอ	11.19	41.12	47.69
นอนไม่หลับ	60.20	27.96	11.84
ท้องเสีย	21.25	22.50	56.25
ปวดเมื่อย	50.47	15.73	33.80
เป็นแผล	19.19	23.25	57.56
คัน	25.41	36.63	37.95
เจ็บตา	27.40	45.91	26.69

หมายเหตุ

1. ได้จากผลรวมที่ผู้ป่วยปล่อยอาการให้หายเองและที่รักษาตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับยา
2. ได้จากผลรวมที่ผู้ป่วยซื้อยาจากร้านยาและรักษาต่าง ๆ เองทั้งรู้ชื่อและไม่รู้ชื่อ

ตารางที่ 12 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติของแพทย์ในการรักษาตัวเองโดยไม่รบกวน
เมื่อมีอาการต่าง ๆ

อาการต่าง ๆ	วิธีปฏิบัติ
เป็นโร	<ol style="list-style-type: none"> 1. นอนพัก 2. ออกกำลังกาย 3. รับประทานยาสมุนไพรน้ำเย็น 4. ใช้น้ำมาก ๆ 5. กินอาหารมาก ๆ 6. ใช้น้ำร้อน 7. กินน้ำขม
ปวดหัว	<ol style="list-style-type: none"> 1. นอนพัก 2. กินของเปรี้ยว 3. รับประทานยาสมุนไพรน้ำเย็นแก้หน้า
เป็นหวัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. พักกายบริหาร 2. นอนพัก 3. กินของร้อน 4. รับประทานขมิ้น
ไอ เจ็บคอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับประทาน เฉาก๊วย สดุด 2. ใช้น้ำผึ้งผสมมะนาว

ตารางที่ 12 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติของผู้ป่วยในการรักษาตัวเองโดยไม่รับยา
เมื่อมีอาการต่าง ๆ (ต่อ)

อาการต่าง ๆ	วิธีปฏิบัติ
นอนไม่หลับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อ่านหนังสือ 2. ดูโทรทัศน์ 3. ทำใจให้สงบ 4. พ่างานหนัก 5. สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ 6. อดบุหรี่ 7. อดเหล้า
ท้องเสีย	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับประทานอาหาร ๆ 2. กินชาบูกับเหล้า 3. รับประทานอาหารกระป๋อง
ปวดเมื่อย	<ol style="list-style-type: none"> 1. พักผ่อน 2. วิถีไสยศาสตร์ โคจรคัมภีร์ 3. เฝ้ายาม 4. พักกายวิพักร 5. นวด 6. ไร่กระเป่าน้ำร้อนประคบ
เป็นแผล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปีกพาสเจอร์ 2. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด

ตารางที่ 12 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติของหน่วยในการรักษาตัวเองโดยไม่ใช้ยา
เมื่อมีอาการต่าง ๆ (ต่อ)

อาการต่าง ๆ	วิธีปฏิบัติ
คัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบายบริเวณคัน 2. เกา 3. ใช้สบู่ล้าง
เจ็บตา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างตาด้วยน้ำธรรมดา 2. ล้างตาด้วยน้ำสุก 3. ล้างตาด้วยน้ำเกลือ 4. ล้างตาด้วยน้ำฝน 5. หยดน้ำตาด้วยตนเอง 6. ใช้ไฮยาลูรอน โคมัยโทไซนเปอเนต 7. พักสายตา

ตารางที่ 13 ตารางแสดงยาที่ไร้เม็มน้ำอาการต่าง ๆ จากคำบอกเล่าของผู้ถูกสัมภาษณ์

อาการต่าง ๆ	ยาที่ไร้	ยาสอื่น ๆ	ยาที่ไร้เป็นส่วนมาก
เป็นโร	<p>เอ เฮน ที¹</p> <p>ประสระบอแรก¹</p> <p>หมีใจ¹</p> <p>Apracur²</p> <p>Aspirin¹</p> <p>Decolgen²</p> <p>Deparon¹</p> <p>Medicol¹</p> <p>Novalgin¹</p> <p>Paracetamol¹</p> <p>Pyrana¹</p> <p>Saridon¹</p>	<p>วิคะมิน ซี²¹</p>	<p>หมีใจ¹</p> <p>Decolgen²</p> <p>Paracetamol¹</p>
ปวดหัว	<p>เอ เฮน ที¹</p> <p>ประสระบอแรก¹</p> <p>หมีใจ¹</p> <p>Apracur²</p> <p>Aspirin¹</p> <p>Conmel¹</p> <p>Decolgen²</p> <p>Deparon¹</p> <p>Medicol¹</p> <p>Paracetamol¹</p>	<p>ยาผสม</p> <p>ยานอนหลับ⁷</p> <p>Valium⁸</p>	<p>หมีใจ¹</p> <p>Decolgen²</p> <p>Paracetamol¹</p>

ตารางที่ 13 ตารางแสดงยาที่ใช้เมื่อมีอาการต่าง ๆ จากคำบอกเล่าของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ต่อ)

อาการต่าง ๆ	ยาที่ใช้	ยาอื่น ๆ	ยาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
นอนไม่หลับ	Bellergal ⁷ Diazepam ⁸ Valium ⁸	Antihistamine ³ Chlorpheniramine ³ Franol ²³ Periactin ³	Diazepam ⁸
ท้องเสีย	ยารักษาท้องร่วง ¹¹ ยารักษาอาการ ¹¹ Disento ⁹ Donnatal ¹⁰ Dovert ⁹ Eldoform ⁹ Entero Vioform ⁹ Immodium ⁹ Kaolin ⁹ Lomotil ⁹ Mexaform ⁹ Sulfaguanidine ⁹	ยากดประสาท ¹¹ ยาแก้ปวด ¹¹	ยารักษาท้องร่วง ¹¹ Eldoform ⁹
ปวดเมื่อย	ยาแก้ปวด ¹² น้ำมันขมิ้น ¹² น้ำมันระกำ ¹² น้ำมันกวางสูง ¹² นิวาตาโซน คริม ¹²	แอสไพริน ¹ พาราเซตามอล ¹ ยาแก้ปวด เมอร์ ¹²⁰ Saridon ¹	ยาแก้ปวด ¹² แอสไพริน คริม ¹²



ตารางที่ 13 ตารางแสดงยาที่ไร้เมื่อมีอาการต่าง ๆ จากคำบอกเล่าของผู้ถูกสัมภาษณ์ (ต่อ)

อาการต่าง ๆ	ยาที่ไร้	ยาอื่น ๆ	ยาที่ไร้เป็นส่วนมาก
	เคาน์เตอร์เพน คริม ¹² นิโธคิก้า มาธัม ¹² สโธมาธัม ¹²		
เป็นแผล	น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างแผล ¹³ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ¹³ ยาใส่แผลติ่งเจอร์ ¹³ ยาแกง ¹³ ยาเหลือง ¹³ ฐึ๊งเพนนิซิลิน ¹⁴ ฐึ๊งแมกคาธิน ¹⁴ ฐึ๊งซัลฟา ¹⁴ Ampicillin ⁴	ผงสีเทา ¹³ ยาผง ¹² ฐึ๊ง ดีกูคยเก ¹⁵	ยาใส่แผลติ่งเจอร์ ¹³ ยาแกง ¹³
คัน	คาลาไมนโธธัน ¹⁶ คริมเบ็ทโนเวท ¹⁵ Chlorpheniramine ³	ยาผง ¹² ยาผงเม็นโทลาทซ์ ¹² ฐึ๊งยาแอม-บัก ¹⁷ ฐึ๊งเปอร์ 28 ¹⁷ ฐึ๊ง ¹⁷ คริมคานีสเทน ¹⁷	คาลาไมนโธธัน ¹⁶ ยาผง ¹²
เจ็บตา	ฐึ๊งป้ายคาเพนนิซิลิน ¹⁸ เพอร์คนิซิดทอคคา ¹⁹		ฐึ๊งป้ายคาเทอร์รา- มัยซิน ¹⁸

ตารางที่ 14 ตารางแสดงลักษณะและวิธีปฏิบัติเมื่อสัมกินยา

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
ก. ลักษณะการกินยา		
1. ไม่เคยสัมกินยา	156	30.29
2. ตั้งใจไม่กินยาเอง	23	4.47
3. สัมกินยา		
3.1 สัมเป็นครั้งคราว	202	39.22
3.2 สัมบ่อยครั้ง	129	25.05
4. ไม่ไ้ค่าคอม	5	0.97
รวม	515	100
ข. วิธีปฏิบัติเมื่อสัมกินยา		
1. รับประทานเมื่อนึกได้	87	26.28
2. เว้นเมื่อมันไป	205	61.94
3. กินยาเป็น 2 เท่า	18	5.44
4. เลิกกิน	21	6.34
รวม	331	100

ตารางที่ 15 ตารางแสดงการใช้จ่ายโรคกระเพาะ

ร้อยละ เคยกินยา	การใช้จ่าย	จำนวน	ร้อยละ	ระยะเวลาที่กินยา	จำนวน	ร้อยละ
13.59	1. กินเฉพาะปวดท้อง	27	38.57	1. กินเฉพาะอาหาร	57	81.43
	2. กินตามแพทย์สั่ง	43	61.43	2. พ่วงจากมีอาการเป็น ร.ม.	13	18.57
จำนวน 70 จาก 518 ตัวอย่าง	รวม	70	100	รวม	70	100

ตารางที่ 17 ตารางแสดงการไต่ถามบุคคล

ร้อยละผู้พบผู้ไต่	ลักษณะของการไต่ถามบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
46.99	1. ไต่ถามหมค	44	18.18
	2. ไต่ถามไม่หมค		
	2.1 เก็บไว้ไต่ถามอีก	80	33.06
	2.2 ให้อื่นไต่ถามด้วย	36	14.88
	2.3 หิงไป	77	31.82
	3. ไม่ได้คำตอบ	5	2.06
จำนวน 242			
จาก 515	รวม	242	100
ตัวอย่าง			

ตารางที่ 18 ตารางแสดงการไต่ยาของคนแก่ผู้อื่น

การไต่ยาผู้อื่น	จำนวน	ร้อยละ
1. ไม่เคยไต่	255	49.51
2. เคยไต่	260	50.49
รวม	515	100

หมายเหตุ

ยาที่ไต่ผู้อื่น เช่น

ยาแก้ไอ, ยาแก้ปวด, ยาแก้หวัด, ยาแก้ชัก, ยาแก้ท้องเสีย,
ยาแก้ปวดประจำเดือน, ยานอนหลับ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาอม

ตารางที่ 19 ตารางแสดงการใช้จ่ายเงินของเค็ก จากค่ายออกเฝ้าของตู้ปกครอง

ร้อยละตู้ปกครองที่ได้อาศัย	การใช้จ่าย	จำนวน	ร้อยละ
30.49	1. กินยาจนหมด	98	62.42
	2. กินยาไม่หมด หิ้งไป	47	29.94
	3. กินยาไม่หมด เก็บไว้ก่อน	12	7.64
จำนวน 157 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	157	100

ตารางที่ 20 ตารางแสดงการเก็บยาของผู้ป่วย

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
ก. การเก็บยา		
1. สูยา	244	45.86
2. วางรวมเป็นที	192	36.10
3. สูเย็น	52	9.77
4. วางไว้ทั่วไป	44	8.27
รวม	532	100
ข. สภาพสถานที่เก็บยา		
1. รอน	32	6.21
2. ไม่รอน	483	93.79
รวม	515	100

หมายเหตุ

จาก ก. จำนวนรวมเก็บ 515 ตัวอย่าง เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีสถานที่เก็บยา
มากกว่า 1 แห่ง

ตารางที่ 21 ตารางแสดงความเข้าใจของผู้นำศาสนา ร่มและหมกอายของยา

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
ก. ความเข้าใจของผู้นำ		
1. ยามีการร่มและหมกอาย	363	70.49
2. ยาไม่มีการร่มและหมกอาย	22	4.27
3. ไม่ทราบถึงการร่มและหมกอายของยา	130	25.24
รวม	515	100
ข. สังกศการร่มและหมกอายของยาจาก		
1. เกมนาน 7	165	45.45
2. คุวันหมกอายที่ข้างกลองมรรจุ	59	16.25
3. คุลัษณะยา	129	35.54
4. ไม่ทราบ	10	2.76
รวม	363	100



ตารางที่ 22 ตารางแสดงการไต่รับยาฉิบ

ร้อยละผู้ป่วยที่เคยไต่รับยาฉิบ	สถานที่เคยไต่รับยาฉิบ	จำนวน	ร้อยละ
63.11	1. สถานบริการที่สัมพันธ์	178	51.15
	2. คลินิก	87	25.00
	3. โรงพยาบาล	82	23.56
	4. ศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น	1	0.29
จำนวน 325 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	348	100

หมายเหตุ

จากผู้ป่วยที่เคยไต่รับยาฉิบ 325 ราย บางรายไต่รับการฉิบยาจากสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง

ตารางที่ 23 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการรอมยาгинและยาฉึก

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
ก. ชนิดของยาที่ผู้ป่วยรอม		
1. ยาгин	244	47.38
2. ยาฉึก	106	20.58
3. ความแพทยสิ่ง	131	25.44
4. ไม่มีควมรอมเลย	1	0.19
5. ไม่ไ้คำคอบ	33	6.41
รวม	515	100
ข. เหตุผลของการรอมคยารชนิดต่าง ๆ		
1. รอมยาгин เพราะ		
1.1 กอัวเจ็บ	174	71.31
1.2 กอัวคิกยาฉึก	45	18.44
1.3 กินยาสะควก	23	9.43
1.4 แพียาฉึก	2	0.82
รวม	244	100
2. รอมยาฉึก เพราะ		
2.1 หายเร็ว	87	82.08
2.2 ไม่เสียเวลากินยา	16	15.09
2.3 แพียาгин	3	2.83
รวม	106	100
3. ความแพทยสิ่ง		
3.1 ไ้ค้แต่ยาгин	98	74.81
3.2 ไ้ค้แต่ยาฉึก	8	6.11
3.3 ไ้ค้หังยาгинและยาฉึก	25	19.08
รวม	131	100

ตารางที่ 24 ตารางแสดงการไร้ยาทาภายนอก

ร้อยละที่เคยไร้	ยาที่เคยไร้	จำนวน	ร้อยละ
59.03	1. ยานวค	203	52.05
	2. ยาตา	187	47.95
จำนวน 304 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	390	100

หมายเหตุ

จากผู้ไร้ยาทาภายนอก 304 ราย บางรายเคยไร้ทั้งยานวคและยาตา

ตารางที่ 25 ตารางแสดงการแพทย์

ร้อยละที่แพทย์	อาการแพทย์ที่แสดง	จำนวน	ร้อยละ	วิธีปฏิบัติ	จำนวน	ร้อยละ
17.09	1. เป็นไข้	43	48.85	1. พยาบาลเอง	23	26.14
	2. เป็นลม ใจสั่น	20	22.73	2. พยาบาลและพบแพทย์	65	73.86
	3. ซา	20	22.73			
	4. คลื่นไส้ อาเจียร	2	2.27			
	5. อื่น ๆ					
	5.1 ท้อง	1	1.14			
	5.2 รอนคอ	1	1.14			
	5.3 หายใจไม่ออก	1	1.14			
จำนวน 88 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	88	100	รวม	88	100

หมายเหตุ

ยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้และทราบชื่อ เช่น

ยาคุมกำเนิด, ampicillin, apracur, aspirin, contact 500,

chloramphenicol, deparen, penicillin, sulfonamide,

tetracycline

ตารางที่ 26 ตารางแสดงแหล่งที่มาของวิธีการรักษา

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
ก. แหล่งที่มา		
1. ฉากยา		
1.1 อานเอง	426	75.94
1.2 คนอื่นอาน	23	4.10
2. จำจากแพทย์สั่ง	22	3.92
3. ไรตามความเคยชิน	63	11.23
4. ไรยาเอง	27	4.81
รวม	561	100
ข. ความบ่อยครั้งในการอานฉากยา		
1. อานทุกครั้งที่จะรักษา	226	50.34
2. อานครั้งเดียว	218	48.55
3. ไม่ใช้คำคอม	5	1.11
รวม	449	100

หมายเหตุ

จาก ก. จำนวนรวมเกิน 515 ตัวอย่าง เนื่องจากผู้ข้รายงานรายชื่อแหล่งที่มา
วิธีรักษามากกว่า 1 แหล่ง

ตารางที่ 27 ตารางแสดงวิธีปฏิบัติก่อนกินยาน้ำและภาระที่ไร่ควงยาเป็นร้อยโคะ

ร้อยละผู้ป่วยที่ เคยกินยาน้ำ	วิธีปฏิบัติก่อนกินยา	จำนวน	ร้อยละ	ลักษณะของภาระที่ไร่เป็น ร้อยโคะ	จำนวน	ร้อยละ
79.03	1. เขย่าขวดก่อนกิน	400	98.28	1. แก้วควงยา	53	13.02
	2. ไม่เขย่าขวดก่อนกิน	7	1.72	2. ร่อนส้อม	206	50.61
				3. ร่อนเค็ลอม ร่อนสังกะสี	8	1.97
				4. กูจากที่ข้างขวด	26	6.39
จำนวน 407 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	407	100	รวม	407	100

หมายเหตุ

ในการควงยาแต่ละครั้งนั้น ปริมาณการควงพอดีภาระจำนวน 194 ราย
คิดเป็นร้อยละ 42.67 และปริมาณการควงโดยการประมาณจำนวน 213 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52.33

ตารางที่ 28 ตารางแสดงภาระที่ไร่ควงยาเป็นธัญญา

ร้อยละหน่วยที่ เคยใช้ธัญญา	ลักษณะของภาระที่ไร่เป็นธัญญา	จำนวน	ร้อยละ
	1. ธัญญาที่แจกพร้อมควงยา	153	59.77
	2. แกวควงยา	6	2.34
	3. ธัญญา ธัญญาแกว	81	31.64
	4. คุจากรักข้างควง	-	-
	5. หอศพคยา	1	0.39
	6. ธัญญาผสม	15	5.86
จำนวน 256 จาก 515 ตัวอย่าง	รวม	256	100

หมายเหตุ

ในการควงยาแต่ละครั้งนั้น ปริมาณการควงพอลิภาชนะจำนวน 221 ราย
คิดเป็นร้อยละ 86.33 และปริมาณการควงโดยการประมาณจำนวน 35 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 13.67

ตารางที่ 29 ตารางแสดงลักษณะการกินยาก่อนอาหาร

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1. พร้อมอาหาร	3	0.58
2. ก่อนอาหารทันที	146	28.35
3. ก่อน 5 - 10 นาที	116	22.52
4. ก่อน 15 - 30 นาที	98	19.03
5. ก่อน 30 - 45 นาที	11	2.14
6. ก่อน 1 ชม.	18	3.50
7. อื่น ๆ	85	16.50
8. ไม่ได้คำตอบ	38	7.38
รวม	515	100

หมายเหตุ

จากข้อ 7 เป็นลักษณะการกินยาก่อนอาหารที่ต่างไปจากข้อ 1 - 6 เป็นการกินยาที่ไม่ตามสั่ง เช่น นำยาไปกินหลังอาหารหรือลืมกิน

ตารางที่ 30 ตารางแสดงลักษณะการกินยาหลังอาหาร

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1. พร้อมอาหาร	-	-
2. หลังอาหารทันที	208	40.39
3. หลัง 5 - 10 นาที	176	34.18
4. หลัง 15 - 30 นาที	104	20.19
5. หลัง 30 - 45 นาที	10	1.94
6. หลัง 1 ชม.	5	0.97
7. อื่น ๆ	9	1.75
8. ไม่ใ้ค่าตอบ	3	0.58
รวม	515	100

หมายเหตุ

จากข้อ 7 เป็นลักษณะการกินยาหลังอาหารที่ค้างไปจากข้อ 1 - 6 เป็นการกินยาที่ไม่ตามสั่ง เช่น นำยาไปกินก่อนอาหารหรือลืมกิน

ตารางที่ 31 ตารางแสดงการไ้ยาที่ถูกกึ่งและไม่ถูกกึ่งของผู้ป่วยในวิธีไ้ยาต่าง ๆ

วิธีไ้ยา	จำนวนผู้ เคยไ้ยา	ถูกกึ่ง		ไม่ถูกกึ่ง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยากอนนอน	451	417	92.46	34	7.54
2. ยา 2 เวลา หลังอาหาร	501	414	82.63	87	17.37
3. ยา 3 เวลา หลังอาหาร	510	355	69.61	155	30.39
4. ยา 4 เวลาหลังอาหาร	486	304	62.55	182	37.45
5. ทุก 6 ชม.	295	71	24.07	224	75.93
6. ทุก 4 ชม. เวลาพัก	468	210	44.87	258	55.13
รวม	2,711	1,771	65.33	940	34.67

หมายเหตุ

จาก 515 ตัวอย่าง แสดงการไ้ยาในวิธีต่าง ๆ ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน

ตารางที่ 32 ตารางแสดงการใช้จ่ายไม่ถูกต้อง (จากตารางที่ 14 - 31)

การใช้จ่าย	ร้อยละที่ไม่ถูกต้อง
1. การใช้จ่ายปริมาณ	
1.1 ร้อนโต๊ะ (ร้อนส้ม + ร้อนเค็ลอม + คุกกี้ข้างขวด + อื่น ๆ)	86.98
1.2 ร้อนวา (ร้อนกาแฟ + คุกกี้ข้างขวด + อื่น ๆ)	37.50
2. การใช้จ่ายวิธี	
2.1 สัมภินยา (คังใจไมกินยา + สัมภินยา)	68.74
2.2 หยุดกินยาก่อนที่จะถึงเวลา (เมื่ออาการดีขึ้น + อาการเลวลง)	75.92
2.3 การอ่านฉลากยา (ใ้ช้ตามความเคยชิน + ใ้ช้ยาเอง)	16.04
2.4 ยาก่อนอาหาร (กินภายใน 30 นาที ก่อนกินอาหาร)	70.48
2.5 ยาทหลังอาหาร (แลวแต่ชนิดของยา)	-
2.6 ยาน้ำ (ไม่เขย่าขวดก่อนใ้)	1.72
2.7 ยาโรคกระเพาะ -(กินยาเฉพาะเวลาปวด)	38.57
-(กินยาใ้ก่อนอาหาร)	81.43
2.8 ยาลูกกวาดของเด็ก (กินไม่หมด เก็บกินต่อ)	7.64
2.9 ยาฉีด (นอกจากนุ้กคอกกรทางแพทย์เป็นผู้ฉีก)	0
2.10 ยาพอกคอก (เก็บยาไว้ใ้ฉีก + ใ้ร่วมกัน)	47.94
2.11 ยาทาภายนอก (ใ้กิน)	-
3. การเก็บยาไม่ถูกวิธี	
3.1 สถานที่เก็บยา (วางไว้ทั่วไป)	8.27
3.2 สภาพสถานที่เก็บยา (ร้อน)	6.21
4. ยาเสื่อมสภาพและการหมดอายุของยา (ยาไม่มีอายุ + ไม่ทราบ)	29.51
5. การเอายาของคนเองใ้ผู้อื่นใ้	50.49
6. การพดยา	17.09
7. การกินยาในวิธีการใ้ยาทาง ๆ	34.67

ตารางที่ 33 ตารางแสดงค่า E.C. ของการไถ่ยาเมื่อมีอาการต่าง ๆ

อาการต่าง ๆ	จำนวนที่เป็น	จำนวนที่ไถ่ยาเอง	ค่า E.C. เป็นร้อยละ
เป็นไข้	453	242	53.42
ปวดหัว	490	279	56.94
เป็นหวัด	465	246	52.90
ไอ เจ็บคอ	411	196	47.69
นอนไม่หลับ	304	336	11.84
ท้องเสีย	320	180	56.25
ปวดเมื่อย	426	144	33.80
เป็นแผล	271	156	57.56
คัน	303	115	37.95
เจ็บตา	281	75	26.69
รวม	3,724	1,669	44.82

หมายเหตุ

1. จาก 515 ตัวอย่าง แสดงอาการต่าง ๆ ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน
2. ข้อมูลจากตารางนี้ นำไปคำนวณค่า E.N., C.E. ในตารางที่ 35

ตารางที่ 34 ตารางแสดงค่า E.C. ของการไถ่ยาเมื่อมีอาการต่าง ๆ
(เฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง)

อาการต่าง ๆ	จำนวนที่เป็น	จำนวนที่ไถ่ยาเอง	ค่า E.C. เป็นร้อยละ
เป็นไข้	62	38	61.29
ปวดหัว	63	41	60.29
เป็นหวัด	68	40	63.49
ไอ เจ็บคอ	66	48	72.73
นอนไม่หลับ	43	2	4.65
ท้องเสีย	57	35	61.40
ปวดเมื่อย	62	24	38.71
เป็นแผล	51	30	58.82
คัน	53	17	32.08
เจ็บตา	46	9	19.57
รวม	571	284	44.82

หมายเหตุ

1. จาก 69 ตัวอย่าง แสดงอาการต่าง ๆ ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน
2. ข้อมูลจากตารางนี้ นำไปคำนวณค่า E.N., C.E. ในตารางที่ 37.1 - 37.8

ตารางที่ 35 ตารางแสดงการใช้จ่ายไม่ตามสั่ง แบ่งตามวิธีใช้จ่าย

วิธีใช้จ่าย	การใช้จ่ายไม่ตามสั่ง					
	E.O.	E.C.	E.S.	E.M.	E.N.	C.E.
1. ก่อนอาหาร	6.70	44.82	13.21	4.61	37.05	34.04
2. หลังอาหาร	-	44.82	-	1.76	35.15	31.73
3. ก่อนนอน	2.44	44.82	2.44	5.10	36.55	33.76
4. วันละ 2 เวลา หลังอาหาร	5.99	44.82	10.38	6.99	37.05	34.17
5. วันละ 3 เวลา หลังอาหาร	24.12	44.82	24.51	5.88	40.41	37.06
6. วันละ 4 เวลา หลังอาหาร	29.01	44.82	29.01	8.44	41.55	38.44
7. ทุก 6 ชม.	75.00	44.82	76.79	23.21	48.15	46.88
8. ทุก 4 ชม. เวลาพัก	47.44	44.82	47.44	7.69	45.34	41.19
ค่าเฉลี่ย	23.84	44.82	25.47	7.96	40.16	37.25

หมายเหตุ

- E.O. ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
 E.C. ค่าเฉลี่ยของแพทย์ที่รักษาเอง
 E.S. ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
 E.M. ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
 E.N. ได้จากการคำนวณ
 C.E. ได้จากการคำนวณ

ตารางที่ 36 ตารางเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการไถยาต่อวันกับการไถยาไม่คานสั่ง

จำนวนครั้งของการไถยาต่อวัน	การไถยาไม่คานสั่ง	
	E.N.	C.E.
1. 1 ครั้ง	36.55	33.76
2. 2 ครั้ง	37.05	34.17
3. 3 ครั้ง	40.41	37.06
4. 4 ครั้ง	41.55	38.44
5. 4 ครั้ง (ทุก 6 ชม.)	48.15	46.88

ตารางที่ 37 ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายไม่ตามสั่ง ตามลักษณะประชากรและความถี่ของการใช้บริการ
แผนกคามวิธีการรักษา

ตารางที่ 37.1 ชากอนอาหาร



รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	36.64	33.38
2. หญิง	37.39	34.22
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	36.23	32.99
2. 30 - 39 ปี	36.60	33.81
3. 40 - 49 ปี	36.06	32.78
4. 50 - 59 ปี	35.78	32.63
5. 60 - 69 ปี	35.74	32.49
6. 70 - 79 ปี	35.68	32.40
7. 80 ปีขึ้นไป	35.68	32.38
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	35.72	32.45
2. ป.4 - 7	36.34	32.23
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	36.08	32.84
4. ม.ศ. 4 - 6, ปวช.	36.16	32.84
5. ปวส. - อนุปริญญา	35.83	32.53
6. ปริญญาตรี	35.93	32.61
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.72	32.41

ตารางที่ 37.1 ยาก่อนอาหาร (ต่อ)

รายการ	B.N.	C.E.
อาหาร		
1. แขนงาน ไม่มีงานทำ	35.87	32.74
2. ค้าขายรายย่อย	35.83	32.53
3. รับจ้างรายวัน	35.85	32.60
4. ธุรกิจพาณิชย์	35.72	32.42
5. พระ นักบวช	-	-
6. พหาร ตำรวจ	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	37.17	33.87
ความถี่ของการใช้บริการ		
1. ทุกสัปดาห์	40.54	37.06
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.40	36.93
3. ทุกเดือน	40.97	37.45
4. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	41.11	37.58
5. มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง	40.83	37.32

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.2 ยาทังอาหาร

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	35.15	31.80
2. หญิง	35.15	31.83
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	35.15	31.76
2. 30 - 39 ปี	35.15	31.73
3. 40 - 49 ปี	35.15	31.76
4. 50 - 59 ปี	35.15	31.79
5. 60 - 69 ปี	35.15	31.76
6. 70 - 79 ปี	35.15	31.73
7. 80 ปีขึ้นไป	35.15	31.73
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	35.15	31.73
2. ป.4 - 7	35.15	31.78
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	35.15	31.79
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	35.15	31.73
5. ปวส. - อปวธิญา	35.15	31.73
6. ปริญญาตรี	35.15	31.75
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.15	31.73

ตารางที่ 37.2 ยาล้างอาหาร (ต่อ)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>อาหาร</u>		
1. แมมาม ไน้งานท่า	35.15	31.83
2. คารายรายย่อย	35.15	31.73
3. รั้งจางรายวัน	35.15	31.75
4. รุกกิจพาณิชย์	35.15	31.78
5. พระ นั้กบวร	-	-
6. พหาร คำรวจ	-	-
7. ขารารการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	35.15	31.79
<u>ความถี่ของการให้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	40.06	36.50
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.06	36.50
3. ทุกเดือน	40.06	36.50
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	40.06	36.50
5. มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง	40.06	36.50

หมายเหตุ

ความถี่ของการให้บริการ คือเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.3 ยากอนแดน

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	36.12	33.11
2. หญิง	36.51	33.53
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	36.21	36.05
2. 30 - 39 ปี	36.28	33.33
3. 40 - 49 ปี	36.12	33.01
4. 50 - 59 ปี	36.07	32.99
5. 60 - 69 ปี	36.07	32.87
6. 70 - 79 ปี	36.07	32.87
7. 80 ปีขึ้นไป	36.07	33.87
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	36.07	32.89
2. ป.4 - 7	36.29	33.24
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	36.12	32.99
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	36.17	33.05
5. ปวส. - อนุปริญญา	36.17	32.99
6. ปริญญาตรี	36.12	32.91
7. สูงกว่าปริญญาตรี	36.07	32.91

ตารางที่ 37.3 ยากอนนอน (ต่อ)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>อาหาร</u>		
1. แมม่าน ไม้มังง่า	36.21	33.05
2. ค้าขายรายย่อย	36.12	32.93
3. ริมจ้างรายวัน	35.55	33.01
4. ธุรกิจพาณิชย์	36.07	32.87
5. พระ นักบวช	-	-
6. ทหาร ตำรวจ	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	36.08	32.87
<u>ความถี่ของการให้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	41.22	37.97
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	41.22	37.97
3. ทุกเดือน	41.22	38.24
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	41.80	38.64
5. มากกว่า 3 เดือน	41.22	37.97

หมายเหตุ

ความถี่ของการให้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.4 ย่า 2 เวลา หลังอาหาร

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	36.12	32.97
2. หญิง	36.25	33.14
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	35.78	32.45
2. 30 - 39 ปี	36.10	32.91
3. 40 - 49 ปี	35.61	32.35
4. 50 - 59 ปี	35.44	32.18
5. 60 - 69 ปี	35.38	32.01
6. 70 - 79 ปี	35.32	32.93
7. 80 ปีขึ้นไป	35.32	31.93
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	35.34	31.97
2. ป.4 - 7	35.75	32.60
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	35.67	32.41
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	35.82	32.50
5. ปวส. - อนุปริญญา	35.48	32.14
6. ปริญญาตรี	35.55	32.20
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.32	31.93

ตารางที่ 37.4 ย่า 2 เวลา หลังอาหาร (ต่อ)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>อาหาร</u>		
1. แมมบ้าน ไม้มิ่งานท่า	35.57	32.26
2. คารายรายชอย	35.38	32.03
3. รั้งจางรายวัน	35.44	32.20
4. รุรกีฬาคาอิชัย	35.34	31.95
5. พระ นั๊กบวช	-	-
6. ทหาร คำรวจ	-	-
7. ชารารการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	36.56	33.44
<u>ความถี่ของการใช้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	40.40	36.93
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.68	37.32
3. ทุกเดือน	40.68	37.45
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	40.97	37.71
5. มากกว่า 3 เดือน	40.68	37.45

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.5 ย่า 3 เวลา หลังอาหาร

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	37.29	33.98
2. หญิง	38.30	34.85
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	36.53	33.04
2. 30 - 39 ปี	37.18	33.80
3. 40 - 49 ปี	36.28	32.87
4. 50 - 59 ปี	35.83	32.49
5. 60 - 69 ปี	35.27	31.80
6. 70 - 79 ปี	35.22	31.80
7. 80 ปีขึ้นไป	35.18	31.77
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	35.41	31.99
2. ป.4 - 7	35.99	33.63
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	36.24	32.81
4. ม.ศ.4 - 6	36.32	32.83
5. ปวศ. - อปปริญา	35.52	32.11
6. ปริญญาตรี	35.86	32.38
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.18	31.82

ตารางที่ 37.5 ยา 3 เวลา หลังอาหาร (คอ)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>สารที่</u>		
1. แมงมัน ไม่นั่งงาทำ	36.22	32.81
2. ค้าขายรายย่อย	35.62	32.19
3. รับจ้างรายวัน	35.81	32.13
4. ธุรกิจพาณิชย์	35.29	31.88
5. พระ นักรบ	-	-
6. ทหาร ค้ากร	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	38.13	34.81
<u>ความถี่ของการใช้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	40.45	36.90
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.17	36.77
3. ทุกเดือน	40.45	37.16
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	42.72	39.10
5. มากกว่า 3 เดือน	41.58	38.19

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.6 ยา 4 เวลา หลังอาหาร

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	37.97	34.75
2. หญิง	41.46	38.00
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	37.41	33.96
2. 30 - 39 ปี	37.88	34.60
3. 40 - 49 ปี	36.56	33.33
4. 50 - 59 ปี	36.18	32.98
5. 60 - 69 ปี	35.63	32.32
6. 70 - 79 ปี	35.56	32.23
7. 80 ปีขึ้นไป	35.54	32.23
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	35.75	32.55
2. ป.4 - 7	34.39	34.37
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	36.82	33.52
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	36.78	33.44
5. ปวส. - อนุปริญญา	35.97	32.67
6. ปริญญาตรี	36.35	32.96
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.54	32.27

ตารางที่ 37.6 ภา 4 เวลา หลังอาหาร (ต่อ)

รายการ	E.N.	C.B.
<u>อาชีพ</u>		
1. แม्यान โม่ในงานทำ	36.56	33.30
2. คารายรายย่อย	35.01	32.69
3. รับจ้างรายวัน	36.26	32.98
4. ธุรกิจพาณิชย์	35.67	32.32
5. พระ นักร้อง	-	-
6. ทหาร ตำรวจ	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	39.20	35.97
<u>ความถี่ของการใช้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	40.45	36.90
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.74	37.29
3. ทุกเดือน	41.30	38.19
4. 2 - 3 ครั้ง/ปี	42.01	38.71
5. มากกว่า 3 เดือน	43.00	39.48

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.7 ยาทูก 6 ข.ม.

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	36.64	35.38
2. หญิง	37.39	34.22
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	42.16	39.79
2. 30 - 39 ปี	41.84	39.51
3. 40 - 49 ปี	39.48	37.12
4. 50 - 59 ปี	39.01	36.71
5. 60 - 69 ปี	38.73	36.36
6. 70 - 79 ปี	38.73	36.25
7. 80 ปีขึ้นไป	38.69	36.23
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	38.92	36.47
2. ป.4 - 7	41.70	38.25
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	40.01	37.58
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	40.29	37.77
5. ปวส. - อปวุฒิปริญญา	39.58	36.19
6. ปริญญาตรี	39.62	36.19
7. สูงกว่าปริญญาตรี	38.78	36.34

ตารางที่ 37.7 ยาทูก 6 ร.ม. (คต)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>อาชีพ</u>		
1. แขนงาน ไม้มุงงานทำ	40.66	38.34
2. ค้าขายรายย่อย	37.38	36.88
3. รับจ้างรายวัน	39.70	37.36
4. ธุรกิจพาณิชย์	38.80	36.32
5. พระ นักบวช	-	-
6. ทหาร ตำรวจ	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	42.76	40.66
<u>ความถี่ของการใช้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	43.23	40.71
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	43.84	41.29
3. ทุกเดือน	45.05	42.29
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	45.81	43.29
5. มากกว่า 3 เดือน	41.18	44.57

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตารางที่ 37.8 ยาทก 4 ร.ม. เวลาพัก

รายการ	E.N.	C.E.
<u>เพศ</u>		
1. ชาย	39.08	35.69
2. หญิง	39.12	35.90
<u>อายุ</u>		
1. 20 - 29 ปี	38.82	35.49
2. 30 - 39 ปี	35.86	36.00
3. 40 - 49 ปี	37.45	34.15
4. 50 - 59 ปี	36.67	33.48
5. 60 - 69 ปี	36.16	32.92
6. 70 - 79 ปี	35.86	32.59
7. 80 ปีขึ้นไป	35.81	32.59
<u>การศึกษา</u>		
1. ไม่เรียน	36.24	32.98
2. ป.4 - 7	39.72	36.47
3. ม.1 - 3, ม.ศ.1 - 3	37.06	33.81
4. ม.ศ.4 - 6, ปวช.	38.00	34.59
5. ปวส. - อนุปริญญา	36.29	33.01
6. ปริญญาตรี	37.02	33.70
7. สูงกว่าปริญญาตรี	35.90	32.62

ตารางที่ 37.8 ยาทูก 4 ร.ม. เวลาพัก (ต่อ)

รายการ	E.N.	C.E.
<u>อาชีพ</u>		
1. แม้าน ไม้งานทำ	37.92	34.75
2. ค้าขายรายย่อย	36.45	33.19
3. รับจ้างรายวัน	37.32	33.01
4. ธุรกิจพาณิชย์	35.99	32.62
5. พระ พักบวช	-	-
6. ทหาร ตำรวจ	-	-
7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ	41.78	35.60
<u>ความถี่ของการใช้บริการ</u>		
1. ทุกสัปดาห์	40.40	36.93
2. 2 - 3 ครั้ง/เดือน	40.68	37.32
3. ทุกเดือน	41.82	38.32
4. 2 - 3 เดือน/ครั้ง	42.53	39.01
5. มากกว่า 3 เดือน	41.96	38.49

หมายเหตุ

ความถี่ของการใช้บริการ คัดเฉพาะกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง