

## บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการศึกษานี้พบว่า การใช้ยาขันประจ้าเดือนและ/หรือยาทหลอมการตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการเกิดความพิการของทารกแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) และสกอร์ที่ใช้บันทึกภาวะเสียงที่การเกิดความพิการของทารกแรกเกิดเป็น 2 เท่าของสกอร์มิตรรภที่ไม่ได้ใช้ยา การศึกษานี้ออกผลเพียงว่ามีภาวะเสียงที่การเกิดความพิการของทารกแรกเกิด มีใช้การใช้ยาขันประจ้าเดือนและ/หรือยาทหลอมการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของการเกิดความพิการแต่ก่อนเด็ก

## ยาขันประจ้าเดือนที่นิยมใช้กันมี 2 ชนิดคือ

1. ยาแผนโบราณ
2. ยาชุดแผนปัจจุบัน

ในยาแผนโบราณมีประกอบด้วยตัวยาที่มีฤทธิ์ในทางขันประจ้าเดือนและมีฤทธิ์ทำให้ร้อนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ ส่วนยาชุดแผนปัจจุบันเกือบทุกชุดจะมีชื่อร์โนมนเพ็ท ergot alkaloids และทวินนิเป็นส่วนประกอบ ซึ่งยาทาง ๆ เหล่านี้มีผลต่อการเกิดความพิการแก่เด็กของทารก

ยาทหลอมการตั้งครรภ์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป มีหัวขันที่เป็นยาขันประทานและยาอีก มีส่วนประกอบเป็นชอร์โนมนเพ็ทคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเทอโรน เช่น เทียวกัน

สกอร์มิตรรภที่ใช้ยาขันประจ้าเดือนและ/หรือยาทหลอมการตั้งครรภ์ จะใช้ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำเนิดอยู่ระหว่างท่า ฯ ความพิการที่พบมากในการศึกษา นั้นคือ ปากแหว่ง เพศกันโนห์ และความพิการของแขน ฯ

ความพิการแทรกในเชิงทางกเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาทาง ๆ ทางค้านครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขคามมา ควรจะมีการควบคุมการขยายของร้านขายยาทั่ว ๆ ในประเทศแก่ประชาชนดึงข้อควรระวังในการใช้ยา อันตรายของการใช้ยาในขณะทั้งครรภ์ เพื่อให้ประชาชนไม่มีความรู้และระมัดระวังในการใช้ยา กระทรวงสาธารณสุขควรสอนการใช้ยาสำหรับนักเรียนประจำเดือนและแผนโน้ตราย และแผนปัจจุบันควบ

การศึกษานี้ควรจะให้กราฟบ่งบอกว่างานในประเทศไทยทุกกลุ่มและทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาทั่วประเทศฯ เช่นและบทสอนการตั้งครรภ์มากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ จะได้นำมาเป็นแนวทางและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยส่วนหนึ่ง.