



## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่รับการรักษาในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเซตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ แสดงในตารางที่ 4

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมและเป็นรายเรื่องดังแสดงไว้ในตารางที่ 5-9

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ เจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมและเป็นรายเรื่อง จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน การได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ และการมีผู้สูงอายุในครอบครัว แสดงไว้ในตารางที่ 10-26

เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำสัญลักษณ์พร้อมทั้งความหมายของสัญลักษณ์มาใช้ดังนี้

- |           |         |   |
|-----------|---------|---|
| $\bar{X}$ | หมายถึง | ค่าคะแนนเฉลี่ย  |
| S.D.      | หมายถึง | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   |
| n         | หมายถึง | จำนวนตัวอย่างในกลุ่ม  |
| t         | หมายถึง | ค่าทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน 2 กลุ่ม         |
| F         | หมายถึง | ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป |

**ผลการวิเคราะห์ข้อมูล****ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ**

**ตารางที่ 4** จำนวน ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามอายุ วุฒิสุงสุดทางการศึกษาพยาบาล การอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ ประสพการณ์การทำงานแผนกที่ปฏิบัติงาน การมีผู้สูงอายุในครอบครัว

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=345)	ร้อยละ
1. อายุ		
22-27 ปี	141	40.9
28-33 ปี	97	28.1
34-39 ปี	54	15.7
40 ปีขึ้นไป	53	15.4
2. วุฒิสุงสุดทางการศึกษาพยาบาล		
อนุปริญญา	5	1.4
ปริญญาตรี	334	96.8
ปริญญาโท	6	1.7
3. การอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ		
เคยอบรม	59	17.1
ไม่เคยอบรม	286	82.9
4. ประสพการณ์การทำงาน (ปี)		
1-5 ปี	161	46.7
6-11 ปี	93	27.0
12 ปีขึ้นไป	91	26.4

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (n=345)	ร้อยละ
5. แผนกที่ปฏิบัติงาน		
อายุกรรม	100	29.0
ศีลยกรรม	154	44.6
นรีเวชกรรม	91	26.4
6. การมีผู้สูงอายุในครอบครัว		
มี	267	77.4
ไม่มี	78	22.6

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพที่เป็นตัวอย่างประชากรส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 22-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.9 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 96.4 ไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 82.9 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี เป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วน 6-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป มีจำนวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 27 และ 26.4 ตามลำดับ ปฏิบัติงานในแผนก ศัลยกรรมเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ แผนกอายุรกรรมและนรีเวชกรรม คิดเป็นร้อยละ 29 และ 26.4 ตามลำดับ มีผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 77.4

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นรวมและเป็นรายเรื่อง แสดงไว้ในตารางที่ 5-9

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน	คะแนนเต็ม	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. ความรู้	30	12.82	2.81	น้อย
2. เจตคติ	120	86.32	6.57	ดี
3. การปฏิบัติ	300	221.41	28.45	มาก

จากตารางที่ 5 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพมีความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 12.82 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุในทางบวกและอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 86.23 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน และมีการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 221.41 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกเป็นรายเรื่อง

ความรู้เรื่อง	คะแนนเต็ม	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. ภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่	6	3.10	1.18	น้อย
2. ภาวะกลืนบัสสาวะไม่อยู่	7	2.77	1.29	น้อย
3. แผลกดทับ	3	1.12	.61	น้อย
4. หกล้ม	3	1.71	1.07	น้อย
5. ความจำเสื่อมและสับสน	11	4.11	1.46	น้อย
รวม	30	12.81	2.81	น้อย

จากตารางที่ 6 แสดงว่าความรู้เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ความรู้เรื่อง ท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่ กลืนบัสสาวะไม่อยู่ แผลกดทับ หกล้ม ความจำเสื่อมและสับสน อยู่ในระดับน้อย

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกเป็นรายเรื่อง

เจตคติต่อการพยาบาล	คะแนนเต็ม	$\bar{X}$	S.D.	ทิศทางของเจตคติ
1. ภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่	25	21.65	2.68	บวก
2. ภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่	25	20.82	2.74	บวก
3. แผลกดทับ	15	11.95	1.68	บวก
4. หกล้ม	20	14.76	1.60	บวก
5. ความจำเสื่อมและภาวะสับสน	35	23.79	2.72	บอกทิศทาง ไม่ได้

จากตารางที่ 7 แสดงว่าเจตคติของพยาบาลวิชาชีพต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่ กลืนปัสสาวะไม่อยู่ แผลกดทับและหกล้ม มีทิศทางบวก ส่วนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมและภาวะสับสน ไม่สามารถบอกทิศทางได้

**ตารางที่ 8** ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกเป็นรายเรื่อง

การปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. ภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่	69.05	8.19	มาก
2. ภาวะกลืนน้ำสภาวะไม่อยู่	75.33	9.04	มาก
3. แผลกดทับ	56.90	5.73	มาก
4. หกล้ม	69.41	8.66	มาก
5. ความจำเป็นและภาวะสับสน	87.46	12.01	มาก

จากตารางที่ 8 แสดงว่า ระดับการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่ กลืนน้ำสภาวะไม่อยู่ แผลกดทับ หกล้ม ความจำเป็นและสับสนอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นรายด้าน

การปฏิบัติด้าน	คะแนนเต็ม	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. การส่งเสริมสุขภาพ	90	67.60	9.38	มาก
2. การป้องกันโรค	90	65.17	9.22	มาก
3. การรักษายาบาล	85	64.93	8.54	มาก
4. การฟื้นฟูสุขภาพ	35	23.72	5.26	มาก
รวม	300	221.41	28.45	3.63

จากตารางที่ 9 แสดงว่า ระดับการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษายาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ในระดับมาก



ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ เจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม และเป็นรายเรื่อง จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน การได้รับการอบรม เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ และการมีผู้สูงอายุในครอบครัว แสดงไว้ในตารางที่ 10-26

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ เจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน	ประสบการณ์การทำงาน (ปี)						F
	1-5		6-11		>12		
	(n=161)		(n= 93)		(n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ความรู้	12.66	2.71	13.10	2.89	12.81	2.91	.4894
2. เจตคติ	85.99	6.82	86.80	6.60	86.43	6.12	.6364
3. การปฏิบัติการพยาบาล	220.06	26.90	219.58	30.16	225.69	29.18	.2458

จากตารางที่ 10 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี 6-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
ของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน

ด้าน	แผนกที่ปฏิบัติงาน						F
	อายุรกรรม (n=100)		ศัลยกรรม (n=154)		นรีเวชกรรม (n=91 )		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ความรู้	12.54	2.93	12.90	2.69	12.98	2.89	.4947
2. เจตคติ	87.67	7.35	85.99	6.32	85.41	5.91	.0413
3. การปฏิบัติการพยาบาล	216.19	29.14	224.62	26.56	221.73	30.19	.0688

จากตารางที่ 11 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และ  
นรีเวชกรรม มีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาล  
ผู้สูงอายุ จำแนกตามการได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุของ  
พยาบาลวิชาชีพ

ด้าน	การอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ				t
	ได้รับ		ไม่ได้รับ		
	(n = 59)		(n = 286)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ความรู้	12.31	3.14	12.92	2.73	.124
2. เจตคติ	93.05	7.02	92.96	7.53	.894
3. การปฏิบัติการ พยาบาล	359.66	40.70	357.84	41.01	.493

จากตารางที่ 12 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ  
และไม่ได้รับการอบรม มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาล  
ผู้สูงอายุ จำแนกตามการมีผู้สูงอายุในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน	การมีผู้สูงอายุในครอบครัว				t
	ไม่มี		มี		
	(n = 78)		(n = 267)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ความรู้	13.15	2.86	12.72	2.80	.230
2. เจตคติ	85.00	6.40	86.71	6.59	.043*
3. การปฏิบัติการ พยาบาล	219.88	26.74	221.86	28.96	.590

\*  $P < .05$

จากตารางที่ 13 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว มีเจตคติต่อ  
การพยาบาลผู้สูงอายุดีกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทาง  
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ  
ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นรายเรื่อง จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน	ประสบการณ์การทำงาน (ปี)						F
	1-5		6-11		>12		
	(n=161)		(n= 93)		(n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและกลิ่นอุจจาระไม่อยู่	2.99	1.12	3.24	1.92	3.18	1.24	.2131
2. ภาวะกลิ่นปัสสาวะไม่อยู่	2.71	1.32	2.85	1.31	2.80	1.22	.7035
3. แผลกดทับ	1.14	.63	1.09	.54	1.31	.64	.8019
4. หกล้ม	1.66	1.05	1.76	1.09	1.74	1.10	.7523
5. ความจำเสื่อมและภาวะสับสน	4.16	1.40	4.16	1.58	3.97	1.46	.5682

จากตารางที่ 14 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี 6-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุในเรื่องภาวะท้องผูกและกลิ่นอุจจาระไม่อยู่ ภาวะกลิ่นปัสสาวะไม่อยู่ แผลกดทับ หกล้ม ความจำเสื่อมและภาวะสับสน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นรายเรื่อง จำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

ความรู้เรื่อง	แผนกที่ปฏิบัติงาน						F
	อายุรกรรม		ศัลยกรรม		นรีเวชกรรม		
	(n=100)		(n=154)		(n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่	2.95	1.34	3.19	1.13	3.13	1.06	.2795
2. ภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่	2.53	1.34	2.81	1.16	2.99	1.26	.0447*
3. แผลกดทับ	1.17	.68	1.08	.57	1.13	.58	.5397
4. หกล้ม	1.84	1.11	1.70	1.70	1.05	1.13	.5397
5. ความจำเสื่อมและภาวะสับสน	12.54	2.93	12.90	2.69	12.98	2.89	.4947

\* P < .05

จากตารางที่ 15 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในแผนกนรีเวชกรรม มีความรู้เรื่อง ภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม หลังการทดสอบรายคู่ โดยวิธีเชฟเน่แล้ว พบว่า พยาบาลวิชาชีพในแผนกนรีเวชกรรมมีความรู้เรื่อง ภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ

ความรู้เรื่อง	การอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ				t
	ได้รับ		ไม่ได้รับ		
	(n = 59)		(n = 226)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอุจจาระไม่อยู่	3.17	1.15	3.09	1.18	.641
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	2.68	1.36	2.79	1.28	.531
3. แผลกดทับ	1.07	.67	1.33	.60	.454
4. หกล้ม	1.51	1.10	1.75	1.07	.113
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	3.88	1.53	4.15	1.45	.193

จากตารางที่ 16 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความรู้เป็นรายเรื่องไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการมีผู้สูงอายุในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ

ความรู้เรื่อง	การมีผู้สูงอายุในครอบครัว				t
	มี		ไม่มี		
	(n = 267)		(n = 78)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอาหารไม่อยู่	3.14	1.16	2.99	1.23	.318
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	2.78	1.22	2.77	1.51	.974
3. แผลกดทับ	1.10	1.58	1.21	.69	.212
4. หกล้ม	1.70	1.10	1.73	.99	.847
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	4.00	1.49	4.46	1.33	.015 <sup>a</sup>

<sup>a</sup>P < .05

จากตารางที่ 17 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวมีความรู้เรื่องความจำเสื่อมและภาวะสับสนดีกว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรู้เรื่องอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน



ตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง  
จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

เจตคติต่อการพยาบาล	ประสบการณ์การทำงาน (ปี)						F
	1-5		6-11		>12		
	(n=161)		(n= 93)		(n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและกลิ่นอูจจาระไม่อยู่	21.76	2.72	21.58	2.69	21.52	2.62	.7499
2. ภาวะกลิ่นปัสสาวะไม่อยู่	21.01	2.90	20.72	2.77	20.60	2.43	.4917
3. แผลกดทับ	11.94	1.63	12.04	1.81	11.88	1.63	.7972
4. หกล้ม	14.49	1.67	15.16	1.52	14.82	14.47	.0047 <sup>*</sup>
5. ความจำเสื่อมและภาวะสับสน	23.47	2.592	23.97	2.19	24.18	2.81	.1091

\* P < .05

จากตารางที่ 18 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี 6-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป มีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่หกล้มแตกต่างกัน โดยกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ 6-11 ปี มีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่หกล้มดีกว่ากลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ 1-5 ปี และ 12 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

เจตคติต่อการพยาบาล	แผนกที่ปฏิบัติงาน						F
	อายุรกรรม		ศัลยกรรม		นรีเวชกรรม		
	(n = 100)		(n = 154)		(n = 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอาหารไม่อยู่	21.9	2.74	21.69	2.68	21.31	2.61	.3047
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	21.46	2.97	20.77	2.67	20.22	2.48	.0069 <sup>*</sup>
3. แผลกดทับ	12.40	1.68	11.79	1.66	11.74	1.63	.0060 <sup>*</sup>
4. หกล้ม	14.71	1.44	14.82	1.66	14.70	1.67	.7933
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	23.93	3.13	23.65	2.45	23.88	2.69	.6802

\* P < .05

จากตารางที่ 19 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และนรีเวชกรรม มีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่ และแผลกดทับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังการทดสอบรายคู่โดยวิธี เซฟเฟ่แล้ว ปรากฏว่าพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมมีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ เรื่องภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่และแผลกดทับดีกว่าพยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรมและนรีเวชกรรม ส่วนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ

เจตคติต่อการพยาบาล	การอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ				t
	ได้รับ		ไม่ได้รับ		
	(n = 59)		(n = 226)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลั้นอุจจาระไม่อยู่	21.76	2.37	21.63	2.75	.722
2. ภาวะกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่	20.95	2.83	20.80	2.73	.699
3. แผลกดทับ	12.24	1.69	11.89	1.68	.150
4. หกล้ม	14.95	1.76	14.72	1.56	.317
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	23.15	2.20	23.92	2.80	.047 <sup>a</sup>

<sup>a</sup>P > .05

จากตารางที่ 20 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้รับการอบรมเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุและมีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมและภาวะสับสนดีกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการมีผู้สูงอายุในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ

เจตคติต่อการพยาบาล	การมีผู้สูงอายุในครอบครัว				t
	มี		ไม่มี		
	(n = 267)		(n = 78)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลิ่นอุจจาระไม่อยู่	21.70	2.78	21.49	2.35	.545
2. ภาวะกลิ่นปัสสาวะ ไม่อยู่	20.92	2.75	20.49	2.72	.219
3. แผลกดทับ	12.10	1.60	11.44	1.65	.002 <sup>a</sup>
4. หกล้ม	14.83	1.62	14.53	1.48	.142
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	23.85	2.79	23.60	2.48	.487

<sup>a</sup>P < .05

จากตารางที่ 21 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวมีเจตคติต่อการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับดีกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนเจตคติของพยาบาลวิชาชีพต่อการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง  
จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติการพยาบาล	ประสบการณ์การทำงาน (ปี)						F
	1-5		6-11		>12		
	(n=161)		(n= 93)		(n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่	68.53	7.87	68.69	8.40	70.34	8.49	.2131
2. ภาวะกลืนบัสสาวะไม่อยู่	75.11	8.38	74.94	9.63	76.12	9.60	.6197
3. แผลกดทับ	56.81	5.62	56.76	5.53	57.21	6.15	.8364
4. หกล้ม	68.73	8.28	69.06	8.97	70.96	8.89	.1331
5. ความจำเสื่อมและภาวะสับสน	87.12	11.33	86.70	12.92	88.81	12.25	.4386

จากตารางที่ 22 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี 6-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป ปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่ ภาวะกลืนบัสสาวะไม่อยู่ แผลกดทับ หกล้ม ความจำเสื่อมและภาวะสับสน ไม่แตกต่างกัน



ตารางที่ 23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง  
จำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติการพยาบาล	แผนกที่ปฏิบัติงาน						F
	อายุรกรรม		ศัลยกรรม		นรีเวชกรรม		
	(n = 100)		(n = 154)		(n = 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอาหารไม่อยู่	67.85	8.29	69.83	7.79	69.04	8.65	.1698
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	74.00	9.32	76.29	8.25	75.18	9.89	.1401
3. แผลกดทับ	57.12	5.54	57.27	5.13	56.04	6.78	.2461
4. หกล้ม	67.67	6.92	70.20	7.99	69.98	9.26	.0570
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	84.34	12.24	86.67	11.36	88.82	12.33	.0064*

\*  $P < .05$

จากตารางที่ 23 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และนรีเวชกรรม ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมและภาวะสับสน ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบด้วยวิธีเซฟเฟแล้วปรากฏว่า พยาบาลวิชาชีพในแผนกนรีเวชกรรมปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุความจำเสื่อมและภาวะสับสนมากกว่า พยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรมปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุความจำเสื่อมและภาวะสับสนมากกว่าพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรม ส่วนการพยาบาลผู้สูงอายุในเรื่องอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายด้าน  
จำแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติการพยาบาล	แผนกที่ปฏิบัติงาน						F
	อายุรกรรม (n=100)		ศัลยกรรม (n=154)		นรีเวชกรรม (n= 91)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. การส่งเสริมสุขภาพ	66.02	9.51	68.64	8.66	67.58	10.24	.0944
2. การป้องกันโรค	63.77	9.29	65.92	8.86	65.44	9.65	.1837
3. การรักษาพยาบาล	64.09	8.54	65.59	8.17	64.73	9.11	.3794
4. การฟื้นฟูสุขภาพ	22.31	5.88	24.48	4.63	23.99	5.31	.0047*

\* P < .05

จากตารางที่ 24 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และนรีเวชกรรม ให้การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่แล้วปรากฏว่า พยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรมให้การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าพยาบาลวิชาชีพ ในแผนกอายุรกรรมและนรีเวชกรรม

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติกรพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการได้รับการอบรมเรื่องกรพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติกรพยาบาล	การอบรมเรื่องกรพยาบาลผู้สูงอายุ				t
	ได้รับ		ไม่รับ		
	(n = 59)		(n = 286)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอาหารไม่อยู่	69.14	7.87	69.03	8.27	.929
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	75.63	9.03	75.27	9.06	.785
3. แผลกดทับ	56.51	5.88	56.98	5.71	.564
4. หกล้ม	69.71	8.71	69.35	8.66	.768
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	88.68	11.61	87.20	12.10	.391

จากตารางที่ 25 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเรื่องกรพยาบาลผู้สูงอายุและไม่ได้รับการอบรมให้กรพยาบาลผู้่วยสูงอายุเป็นรายเรื่องไม่แตกต่างกัน



ตารางที่ 26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติกรพยาบาลผู้สูงอายุเป็นรายเรื่อง จำแนกตามการมีผู้สูงอายุในครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ

การปฏิบัติกรพยาบาล	การมีผู้สูงอายุในครอบครัว				t
	มี		ไม่มี		
	(n = 267)		(n = 78)		
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1. ภาวะท้องผูกและ กลืนอาหารไม่อยู่	69.30	8.31	68.19	7.74	.294
2. ภาวะกลืนปัสสาวะ ไม่อยู่	75.32	9.18	75.38	8.62	.955
3. แผลกดทับ	57.00	5.92	56.56	5.04	.555
4. หกล้ม	69.61	8.88	68.73	7.87	.433
5. ความจำเสื่อมและ ภาวะสับสน	87.62	12.27	87.20	11.14	.642

จากตารางที่ 26 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวและไม่มีผู้สูงอายุในครอบครัว ให้การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะท้องผูกและกลืนอาหารไม่อยู่ ภาวะกลืนปัสสาวะไม่อยู่ แผลกดทับ หกล้ม ความจำเสื่อมและภาวะสับสน ไม่แตกต่างกัน