

กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล*

Ekpanyaskul C. Sick building syndrome. Chula Med J 2005 Feb; 49(2): 91 - 100

During the past two decades, a new civilized syndrome with no specific etiology among workers in modern office buildings has become apparent in occupational and environmental practice. Its symptoms usually develop after entering the building and are relieved soon after leaving. Its occurrence is associated with indoor environmental quality, which is affected by occupants, work activity, office equipment, plants, furnishing, building material, ventilation system of the building, and outdoor pollution. These work-related symptoms have been defined by the World Health Organization (WHO) as "sick building syndrome".

This article presented sick building syndrome concerning its definition, epidemiology, clinical presentation, diagnosis and assessment. Lastly, prevention was also discussed.

Keywords : Sick building syndrome, Office worker, Indoor environmental quality.

Reprint request: Ekpanyaskul C. Department of Preventive and Social Medicine. Faculty of Medicine. Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand.

Received for publication. November 10, 2004.

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบถึงขนาดของปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร ของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน
- เพื่อให้ทราบถึงลักษณะอาการ แนวทางการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการประเมิน ในผู้เกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร
- เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วงการอาชีว-เวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเริ่มมีการกล่าวถึงความเจ็บป่วยเหตุความคิดว่าไอล์ป่วยภูมิในกลุ่มคนทำงานในอาคารสำนักงานสมัยใหม่ โดยไม่ทราบสาเหตุที่จำเพาะกลุ่มอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ป่วยความรุนแรงเมื่ออยู่ในอาคารและหายไปเมื่อออกนอกอาคาร⁽¹⁻⁶⁾ ปัญหาดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาการ กิจกรรมในงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ลักษณะพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งอาคาร ระบบระบายอากาศและมลพิษจากภายนอกอาคาร^(7,8) องค์กรอนามัยโลกเรียกกลุ่มอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนี้ว่า “กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร”^(9,10)

บทความนี้ถ้าถือว่ากลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร ของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน ในเนื้อหาเกี่ยวกับนิยาม วิทยาการระบาด อาการทางคลินิก การวินิจฉัยและการประเมิน โดยมีกล่าวถึงการป้องกันในตอนท้ายของบทความ

นิยาม (Definition)

กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร หรือ Sick building syndrome (SBS) หมายถึง ภาวะผิดปกติ ด้านสุขภาพ ทางตา จมูก ลำคอ ภารหายใจส่วนล่าง ผิวหนัง และอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นคล้ายกันในกลุ่มคนทำงานในอาคาร สำนักงานที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่อยู่ในอาคาร แต่ไม่สามารถบุสเหตุที่แน่นอนได้ ปัญหาอาจเกิดขึ้น เนื่องจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรือกับทุกส่วนของอาคารก็ได้ โดยอาการป่วยดังกล่าวเป็นอาการที่ไม่มี ลักษณะเฉพาะโรค และมักจะดีขึ้นหรือหายไปเมื่อออก นอกอาคาร^(1-6,9-11) ซึ่งมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ความเจ็บป่วย เหตุไม่จำเพาะในอาคาร (Non specific building-related illness), กลุ่มอาการอาคารปิดสนิท (Tight building syndrome)

การเจ็บป่วยที่เกิดในอาคารจากสาเหตุที่ระบุ ได้ไม่เรียกว่ากลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร แต่จะเรียกว่า ความเจ็บป่วยเหตุจำเพาะในอาคาร (specific building-

related illness) ตัวอย่างเช่น โรคทหารผ่านศีก (legionellosis) ที่เกิดจากเชื้อก่อโรค legionella

วิทยาการระบาด (Epidemiology)

องค์กรอนามัยโลกประเมินการว่าอาคารสำนักงานใหม่ หรือที่มีการปรับปรุงร้อยละ 30 จะพบกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร⁽¹⁰⁾ ขณะเดียวกันพบว่า ผู้ทำงานในอาคาร สำนักงานที่ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร ร้อยละ 20-35 สามารถพบอาการของกลุ่มอาการป่วยเหตุ อาคารได้ เช่นกัน⁽²⁾ มีการสำรวจในกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ทำงานในอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง ปิดทึบ และ มีระบบปรับอากาศและระบบอากาศแบบรวมร้อยละ 20 พบรุ่มอาการป่วยเหตุอาคารป่วยภูมิขึ้นทุกสปดาห์⁽¹²⁾ และผู้ทำงานในอาคารสำนักงานเก่าจะป่วยภูมิอาการมากกว่าอาคารสำนักงานใหม่⁽¹³⁾

ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการพบรุ่มอาการป่วยเหตุอาคารปะกอบด้วยปัจจัยบุคคล ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และลักษณะอาคาร แสดงดัง ตารางที่ 1 ซึ่งความชุกและอาการในแต่ละกลุ่มอาการ ของกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารมีความแตกต่างกันตามอาคาร เมื่อจาก

1. ปัจจัยบุคคลนลายปัจจัยทำให้มีความไวต่อ การเกิดโรค (susceptibility) เพิ่มขึ้น⁽³¹⁻³²⁾

2. การสัมผัสมลพิษในอาคารขึ้นอยู่กับลักษณะ งานของแต่ละบุคคล ไม่พบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นผล ให้มีอาการรัดเจนแม้จะได้รับมลพิษชนิดเดียวกัน โดย แต่ละคนอาจมีระดับการตอบสนองและการแสดงออกที่ แตกต่างกัน⁽⁴⁾

3. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือมลภาวะของ อาคารภายนอก ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคาร รวมทั้งกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยในอาคาร หรืออุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน ล้วนทำให้เกิดความแตกต่างกันใน microenvironment ของสถานที่ต่าง ๆ ในอาคารเดียวกัน⁽³³⁾

ในปัจจุบันมีการสำรวจและสืบค้นสาเหตุการ เกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุการกันอย่างกว้างขวาง พบ

ตารางที่ 1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชารของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน

ปัจจัยบุคคล	ลักษณะงาน
เพศหญิง (12,14-20)	งานสารบран เลขานุการ (15,18)
อายุน้อย (< 40 ปี) (12,17-21)	ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน (12,14-16,18-20,25)
ประวัติโรคภูมิแพ้ (12,14,17-22)	ใช้กระดาษสำเนาพิมพ์ชนิดไดร์คัร์บอน (12,19,25)
สูบบุหรี่ (15,18,23)	ใช้งานหรือนั่งใกล้เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร (12,16,21,25) พรินเตอร์ (12,15) มีชั่วโมงการทำงานนาน (23)
ปัญหาทางจิตสังคมในงาน เช่น เครียด ไม่เพียงพอในงาน (12,14,17-19,21)	
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	ลักษณะอาคาร
มีคนนั่งทำงานเป็นจำนวนมาก (19,24)	อาคารเก่า (15)
พื้นปูพรม (15)	อาคารปรับอากาศ (16,26-28)
มีน้ำร้อนหรือซึม (12)	มีระบบปรับความชื้นในอาคาร (19,27)
ขาดการทำความสะอาด (12,15,24)	อาคารหมุนเวียนน้อย (การระบายอากาศ <10 ลิตร/วินาที/คน) (20,29,30)
ปัญหาการยศาสตร์ (11,14,16)	

helysa เนตุ เช่น (ก) พิษของสารเคมีภายในอาคาร เช่น โอลิฟิน สารประกอบอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds) (33-35) ซึ่งระเหยออกมายในระดับต่ำจากเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งในอาคาร น้ำยาทำความสะอาด สารเคมี และอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ร่วมกับปฏิกิริยาการก่อภูมิไวต่อสารเคมี (ข) การปนเปื้อนของจุลทรรศ (36,37) ในบริเวณที่ปูพรม มีน้ำร้อนหรือซึม และในระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบบรวมตามห้องเย็น ตัวกรอง ตัวปรับความชื้น (๔) (ค) ผุนตามพื้นผิว (35-36,38) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ (20) ความชื้น (39) แสง (33) เสียง (38) และ (ง) การระบายอากาศในอาคารสำนักงานไม่เพียงพอ (18,29,30) เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางด้านจิตสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวปรับเปลี่ยนการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชาร (40-43) อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ เพราะไม่พบว่ามีสาเหตุทางสิ่งแวดล้อมเพียงสาเหตุเดียวหรือกลุ่มเดียวที่สามารถอธิบายการเกิดโรคได้ชัดเจน และมักตรวจพบว่าระดับน้ำพิษชนิดต่างๆ ภายในอาคารมีความเข้มข้นต่ำกว่าระดับที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของโรค (5,6,16)

ลักษณะทางคลินิก (Clinical presentation)

กลุ่มอาการป่วยเหตุอาชารประกอบด้วยกลุ่มอาการในระบบต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มอาการทางตา จมูก ลำคอ กลุ่มอาการระบบการหายใจส่วนล่าง กลุ่มอาการทั่วไปของระบบประสาท และกลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ผู้พบกลุ่มอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเข้าทำงาน และมักจะดีขึ้นภายในไม่กี่นาทีหลังออกจากอาคาร (2-6,10,44) โดยกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชารในแต่ละระบบนั้นมีอาการแตกต่างกันดังนี้

1. กลุ่มอาการทั่วไป

ลักษณะอาการส่วนใหญ่ไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่ง แต่เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปของระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะแบบตื้อเมื่อนอนมีอะไรบ้านบัด มีนศีรษะ ง่วงนอน หงุดหงิด ขาดสมาร์ทในการทำงานคลื่นไส้ รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย

2. กลุ่มอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุ

การระคายเคืองต่อเยื่อบุสัมผัส เช่น เยื่อบุตา จมูก หรือลำคอ เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ทำงานในอาคารปรับอากาศ (12,16) โดยกลุ่มอาการทางตา ส่วนใหญ่เป็นการระคายเคืองตา น้ำตาไหล คันตา ตาแห้ง

แบบตา ตาแดงโดยที่ไม่การอักเสบหรือติดเรื้อรังตา ผู้ไขค่อนแทรกเลนส์จะพบว่ามีการใส่ค่อนแทรกเลนส์ลำบาก กลุ่มอาการทางจมูก มีอาการดังแต่ รู้สึกระคายเคืองจมูก ตัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคภูมิแพ้ บางครั้งอาจพบอาการแบบจมูก เลือดกำเดาไหล หรือการได้รับกลิ่นของจมูกมีดีปฏิกติ และกลุ่มอาการทางลำคอ มีอาการคล้ายการติดเชื้อการหายใจ เช่น คอแห้ง แบบคอ ระคายคอ เจ็บคอ กลืนลำบาก เสียงแหง

3. กลุ่มอาการระบบการหายใจส่วนล่าง

ลักษณะอาการส่วนในญี่ปุ่นคล้ายกับโรคหอบหืด เช่น แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก อีดอัดบริเวณทรวงอก หายใจขัด แต่ไม่เคยมีประวัติโรคหอบหืดในอดีต ไอในผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ โดยกลุ่มอาการในระบบนี้พบได้น้อยกว่ากลุ่มอาการอื่น

4. กลุ่มอาการทางผิวหนัง

มักเป็นบริเวณที่สัมผัสได้ง่าย อาการที่พบ เช่น ระคายเคืองใบหน้า ผื่นบริเวณใบหน้าซึ่งมักพบในผู้ทำงาน กับคอมพิวเตอร์⁽⁴⁵⁾ ผิวแห้ง ผื่นนูนแดง ผื่นคัน ผื่นผิวหนังอักเสบ

แม้อาการเหล่านี้ไม่ทำให้เจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ก็ส่งผลกระทบทำให้ขาดสมรรถภาพในการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดลง ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และขาดแรงจูงใจ ในการซึ่งแสดงออกมากในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขาดงาน เพิ่มขึ้น ขาดความสนใจในงาน ทำงานนอกเวลาหนักอย่าง มีการเปลี่ยนงานบ่อยๆ โดยพบว่ามากกว่าสามในสี่ของผู้ มีอาการในกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารในกรุงเทพมหานคร รายงานว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน⁽¹²⁾ และ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศไทยรู้สึกเมริการพบว่ากลุ่มอาการ ป่วยเหตุอาคารทำให้สูญเสียประมาณร้อยละ 0.5-1.0 ของ นุ辱ค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศไทย⁽¹⁰⁾

การวินิจฉัย (Diagnosis)

อาการที่พบในกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารเป็น อาการที่ไม่จำเพาะ อาการเหล่านี้ป่วยได้ในหลายโรค

โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบการหายใจ อาการหล่ายอาการ ในระบบเดียวกันจะมีความเชื่อมต่อได้กว่าเป็นกลุ่มอาการป่วยเหตุอาการมากกว่าอาการรบกวนอาการในราย ๆ ระบบ⁽²⁾ ดังนั้นการวินิจฉัยกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารนั้น ต้องเน้นอยู่กับอาการที่ปรากฏในผู้ป่วย อาการที่มีลักษณะคล้ายกันในเพื่อนร่วมงาน อาการที่ปรากฏเมื่อยู่ภายในอาคาร และดีขึ้นเมื่อออกจากสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่พบศิริแพทย์สภาพ และไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์สำคัญในการวินิจฉัยกลุ่มอาการป่วยเหตุอาการของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน ดังนั้น การวินิจฉัยควรประกอบด้วยกลุ่มอาการที่มีลักษณะสำคัญ ดังนี้^(2-6,8,11)

1. มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัมพันธ์กับการทำงาน เช่น อาการป่วยขึ้นเฉพาะเวลาทำงานในอาคาร อาการดีขึ้นเมื่อออกนอกอาคาร หรือหยุดงาน

2. มีการแยกโรคหรือภาวะอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นต้นออกก่อน

3. ไม่พบปัจจัยที่บ่งบอกแนวริดได้กว่า ปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นดัน เช่น การติดเชื้อ ลิ่วโอนเลลา โรคปอดอักเสบจากภาวะภูมิไภกิน หรือโรคหอบหืด

การวินิจฉัยแยกโรค (Differential diagnosis)

การเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากผู้ทำงานในสถานที่ทำงาน นอกจากการกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารแล้วยังมีโรคหรือกลุ่มอาการที่มีลักษณะอาการคล้ายกัน อาจทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ ทำให้การแก้ไขป้องกันไม่ตรงกับสาเหตุ ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกภาวะอื่นออกจากกัน ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร โรคที่ควรมีการวินิจฉัยแยกออก ได้แก่

1. Specific building-related illness อาการค่อนข้างจะคล้ายกับกลุ่มอาการป่วยเหตุจำนวนมาก แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ พบรสาเหตุการเกิดโรคที่สามารถอธิบายการเจ็บป่วยนั้นได้ โดยมีรายละเอียดข้อแตกต่างที่สำคัญแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2. ข้อแตกต่างระหว่าง Specific building-related illness กับ Sick building syndrome^(4,8,44)

ข้อแตกต่าง	Specific building-related illness	Sick building syndrome
• ระยะเวลาการเกิดอาการ	- เป็นทั้งแบบฉบับพลันและเรื้อรัง	- มักเป็นแบบฉบับพลัน
• รูปแบบอาการทางคลินิก	- มีลักษณะเหมือน ๆ กัน	- มีอาการที่หลากหลายแตกต่างกัน
• อาการ	- อาการของโรคติดเชื้อ โรคเกียวกับภูมิคุ้มกัน โรคภูมิแพ้ สารพิษ	- อาการของโรคไม่ชัดเจน บ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
• การตรวจร่างกาย	- พบรักษาอาการตามโรคที่เกิดขึ้น	- สำรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใด ๆ
• การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	- พบรความผิดปกติตามอาการที่ป่วย	- ไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัย
• สาเหตุของอาการ	- พบรดานเหตุการเกิด เกิดจากปัจจัยเดียว	- ไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากหลายปัจจัย
• ลักษณะการเกิดอาการ	- พบรได้ค่อนข้างน้อย	- พบรได้ทั่วไป พ布บอย
• อาการเมื่อออกนอกอาคาร	- ใช้เวลานานอาการดังกล่าวจึงหายไป	- อาการดังกล่าวหายไปเร็วกว่า

2. Mass psychogenic illness มีอาการได้หลากหลาย แต่อาการเด่นมักเป็นอาการทางระบบประสาท อาการที่พบมักคล้ายกับอาการ hyperventilation เช่น แน่นหน้าอกร หายใจขัด วิงเวียน อ่อนเพลีย หรืออาการ อื่น ๆ โดยมีลักษณะสำคัญ คือ มักพบในเพศหญิงมากกว่า เพศชาย ในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ต่อนั้น มักเกิดในชุมชนปิด กระบวนการของโรคเกิดจากการได้ยินหรือได้เห็นอาการ ของผู้อื่นหลังเกิดผู้ป่วยรายแรก โดยมีปัจจัยการกระตุ้น คือ การที่ร่างกายหรือจิตใจอยู่ในภาวะเครียด มักเกิดใน ผู้มีปัญหาทางอารมณ์บ่อย ๆ⁽⁴⁶⁾ โดยภาวะนี้แตกต่างจาก กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร คือ อาการไม่หายไปหลังจาก ออกนอกอาคาร ลักษณะการเกิดเป็นแบบกระจายเป็น เครือข่าย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารที่มี แนวโน้มการเกิดเป็นแบบกลุ่ม

3. Multiple chemical sensitivity เป็นอาการที่ เกิดขึ้นหลังจากเคยได้รับสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงครั้งเดียวหรือได้รับซ้ำ ๆ โดยอาการเป็นแบบฉบับพลันเมื่อได้รับ สารเคมีชนิดอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปี Doyle น้ำหอม หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ภายในอาคาร แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการจะปรากฏในหลายระบบ ได้แก่ ระบบ ประสาท (เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อย) ระบบการหายใจส่วนต้นและส่วนกลาง ผิวนัง และหัวใจ อาการเหล่านี้สามารถเกิดอย่างเรื้อรังได้ และจะ

ปรากฏพร้อมอาการ hyperventilation ได้ หรือออกกล้าม อาการเกินความเป็นจริง⁽⁴⁷⁾ ซึ่งที่แตกต่างระหว่างภาวะนี้กับ กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร คือ เกิดได้ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร มีลักษณะการเกิด เป็นแบบ endemic ขณะที่กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารมัก เป็นแบบ epidemic โดยอาการไม่จำเพาะต่อสถานที่ ทำงานและไม่หายไปหลังจากมีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือได้รับการรักษา

การประเมิน (Assessment)

1. การประเมินอาการทางคลินิก

สิ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยได้มากที่สุดและควร กระทำเป็นลำดับแรก เมื่อพบผู้มีกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร คือ การซักประวัติ เพทย์ควรมีการซักประวัติอย่างละเอียด เกี่ยวกับอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาการของผู้ป่วย และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและที่บ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับงาน รวมไปถึงลักษณะงานและสิ่ง แวดล้อมภายในอาคาร การระบายน้ำอากาศ แหล่งของการ สัมผัส ปริมาณฝุ่น และปัจจัยทางด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง ที่สำคัญควรค้นหาการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งแวดล้อมการทำงาน เช่น การปรับปรุงงาน บุறรูม ใหม่ เครื่องใช้กุปกรณ์ชนิดใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มี ความสัมพันธ์กับการเกิดหรือการกระตุ้นให้เกิดอาการ

การป่วยภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับในกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานด้วยกัน การที่ทำการป่วยขณะอยู่ภายในอาคารและดีขึ้น เมื่อออกจากอาคาร จะเป็นตัวชี้วัดในการวินิจฉัยกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร (^{4-6,11,44,48-50}) นอกจากนี้ควรซักถามเกี่ยวกับปัญหาในงานและสภาพของคุณภาพด้วย เช่น ความพึงพอใจในงาน ปริมาณงาน ระดับความเครียด ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน (⁴⁰)

การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการมักจะไม่พบความผิดปกติ แต่เนื่องจากอาการของกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารมีลักษณะไม่จำเพาะและเกิดขึ้นในหลายระบบ ดังนั้นควรมีการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นบางอย่างเพื่อคัดแยกสาเหตุอื่นออกก่อน ถ้าผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับการเจ็บป่วยเหตุจำเพาะในอาคาร เช่น หอบหืด หรือปอดอักเสบภูมิไฟเกินควรทำการเอ็กซเรย์ปอด ทำ spirometry และวัด peak flow หากมีอาการทางระบบการหายใจส่วนล่าง เช่น ไอหายใจซัด เป็นอาการเด่น ควรมีการวินิจฉัยว่ามีภาวะ hyper-reactive airway) หรือไม่ เนื่องจากการที่จะแยกระหว่างการระคายเคืองการหายใจกับโรคหอบหืดจากประวัติกระทำได้ยาก (⁴⁻⁶)

2. การประเมินในอาคารและสถานที่ทำงาน

เมื่อพบกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร การประเมินคุณภาพอากาศจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ทีมงานที่ประเมินควรประกอบด้วยแพทย์นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรที่ดูแล้านอาคารและกระบวนการอากาศ โดยสิ่งที่ควรกระทำ คือ การเดินสำรวจ (walk through survey) เพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลพื้นฐานและประวัติการใช้งานชั่วโมงความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุง เครื่องมือผู้อาศัยและประวัติสุขภาพ (^{3-6,44})

การสอบถามผู้อยู่ภายในอาคารโดยใช้แบบสอบถามจะช่วยค้นหาส่วนที่มีปัญหา (⁵¹) ซึ่งพบว่าถ้ามีอัตราความซูกของกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารมากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่าอาคารสำนักงานดังกล่าวมีปัญหาระบบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (⁵²) และเพื่อให้ประหยัดงบประมาณ

ในการสืบสาน ควรใช้ประสบการณ์ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาประเมินการสมัคร ประเมินระบบปรับอากาศและระบบยาอากาศ อากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ และการกระจายตัวของอากาศ (⁵) นอกจากนี้ควรมีการติดตามหลังการสำรวจ ซึ่งเป็นการเฝ้าติดตามความสำเร็จหลังมีมาตรการแก้ไข เพราะผู้มีกลุ่มอาการเหล่านั้นมักจะยังคงอยู่ภายในอาคารหลังจากการแก้ไขปัญหา

การป้องกัน (Prevention)

กลุ่มอาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นและสามารถป้องกันได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร ต้องเป็นความร่วมมือทั้งผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคารสำนักงานและเจ้าของอาคารสถานที่ ถึงแม้ว่าจะไม่พบเหตุปัจจัยโดยตรง แต่การแก้ไขเหตุปัจจัยทางช่องลมก็สามารถทำให้อาการดีขึ้น โดยใช้ทั้งมาตรการทางการบริหารจัดการและการควบคุมทางวิศวกรรมควบคู่กันไป ดังนี้

1. ควบคุมลพิษและแหล่งก่อมาลพิษในอาคาร เช่น เลือกวัสดุอุปกรณ์สำนักงานหรือสารเคมีที่เป็นพิษน้อยและใช้เท่าที่จำเป็น การเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นแหล่งสะสมและทำให้菊ลซีพแพร์กระจาย ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยน้อย จัดวางเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในที่ที่มีระบายอากาศอย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพรม ผุ่นตามพื้นผิว ควบคุมและกำจัดแหล่งก่อความชื้น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อมาลพิษในอาคาร เช่น การสูบบุหรี่ ช่องแอร์สถานที่ทำงานขณะมีผู้ทำงานอยู่ (^{10,34,52-55})

2. ดูแลรักษา ทำความสะอาดและระบบปรับอากาศและระบบยาอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มการไอล์เวียนของอากาศมากกว่า 10 ลิตรต่อวินาทีต่อคน (⁴) อาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศและระบบยาอากาศแบบรวม ควรลดการนำอากาศจากภายนอกเข้าอาคารโดยตรง เช่น การเปิดหน้าต่าง และในสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขณะที่ทำงานควรเปิดพัดลมระบบยาอากาศเพื่อให้

อาการหมุนเวียน⁽¹³⁾

3. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักริ่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร ความมีการอธิบายและให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ผู้มีความไวต่อการเกิดโรค ควรหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานใกล้แหล่งกำเนิดพิษ⁽³²⁾ เมื่อพบกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ควรให้ความสำคัญ รับดำเนินการ และความมีเจ้าน้ำที่สาธารณะหรือเจ้าน้ำที่ฝ่ายอาชีวอนามัยร่วมออกสำรวจ และประเมินความเสี่ยง เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้คำแนะนำแก้ไขตามหลักวิชาการ⁽¹⁾ ในขณะที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ควรย้ายงานหรือเปลี่ยนหน้าที่ให้กับผู้มีอาการก่อน⁽⁴⁾

4. มีการจัดระเบียบสถานที่ทำงานไม่ให้แออัด ควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมทั้งด้านกายภาพ การยศาสตร์ และทางจิตสังคมในงาน⁽¹⁷⁾

สรุป

กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารกำลังเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น และพบได้บ่อยในกลุ่มคนทำงานในอาคารสำนักงาน เมื่อเวลาการดังกล่าวจะตรวจไม่พบความผิดปกติใด ๆ และเกิดขึ้นไม่ถาวร แต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นในการประเมินเพื่อค้นหาการเจ็บป่วย ควรพิจารณาทั้งปัจจัยบุคคล ลักษณะการทำงานและสถานที่ทำงาน มีการคัดแยกความเจ็บป่วยเหตุจำเพาะในอาคารจากประวัติ และตรวจว่าງกายออกก่อน นอกจากนี้การประเมินอาคารสถานที่ยังเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและการปรับปรุง โดยการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดพิษในสำนักงาน การดูแลระบบบายอากาศスマ่เสมอ การให้ความรู้ และการควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเหมาะสม ก็สามารถการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารได้

อ้างอิง

- สมชัย บรรกิตติ, นิตยา จันทร์เรือง มหาพล. กลุ่มอาการอาคารป่วย-โรคเหตุความคิวไลซ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2546 พ.ย.-ธ.ค;12(6):1040 - 3
- Hodgson MJ. Sick building syndrome. In: Stellman JM, ed. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office, 1998:13.3 - 13.6
- Burge PS. Sick building syndrome. Occup Environ Med 2004 Feb; 61(2):185 - 90
- Menzies D, Bourbeau J. Building-related illnesses. N Engl J Med 1997 Nov 20;337(21):1524 - 31
- Redlich CA, Sparer J, Cullen MR. Sick-building syndrome. Lancet 1997 Apr 5; 349(9057): 1013 - 6
- Appleby PH. ABC of work related disorders. Building-related illnesses. Br Med J 1996 Sep 14; 313(7058): 674 – 7
- Kumar S, Fisk WJ. IEQ and the impact on building occupants. ASHRAE Journal 2002 Apr; 44(4): 50 - 2
- McLellan RK, McCunney RJ. Indoor air pollution. In: McCunney RJ, ed. A Practical Approach to Occupational and Environmental Medicine. 2nd ed. New York: Little Brown, 1994:633 - 50
- World Health Organization. Indoor Air Pollutants: Exposure and Health Effects: EURO Reports and Studies. No.78. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1983
- World Health Organization. Sick Building Syndrome: Local Authorities, Health and Environment Briefing Pamphlet Series 2. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1995
- พรชัย สิทธิศรรณ์กุล, สมชัย บรรกิตติ. แนวทางการวินิจฉัยโรคเหตุอาชีพ ตอนที่ (6). วารสารวิชาการสาธารณสุข 2543 ต.ค.-ธ.ค;9(4): 391 - 404
- ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้ที่ทำงาน

- ในอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์หลักศูนย์ปฏิญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีศาสตร์ ภาควิชา
เคมีศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546
13. จันทนี พันธุ์ประสีทธิ์, วิทยา ออยู่สุข. คุณภาพอากาศ
ภายในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร.
วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2544;
11(4): 50 - 7
14. Skyberg K, Skulberg KR, Eduard W, Skaret E,
Levy F, Kjuus H. Symptoms prevalence
among office employees and associations to
building characteristics. Indoor Air 2003
Sep;13(3): 246 - 52
15. Bholah R, Fagoonee I, Subratty AH. Sick building
syndrome in Mauritius: Are symptoms
associated with the office environment?
Indoor Built Environ 2000 Jan-Feb; 9(1):
44 - 51
16. Muzi G, Abbritti G, Accattoli MP, dell'Omo M.
Prevalence of irritative symptoms in a
nonproblem air-conditioned office building.
Int Arch Occup Environ Health 1998 Sep;71(6):
372 - 8
17. Ooi PL, Goh KT, Phoon MH, Foo SC, Yap HM.
Epidemiology of sick building syndrome and
its associated risk factors in Singapore.
Occup Environ Med 1998 Mar;55(3):188 - 93
18. Bourbeau J, Brisson C, Allaire S. Prevalence of
the sick building syndrome symptoms in
office workers before and after being exposed
to a building with an improved ventilation
system. Occup Environ Med 1996 Mar;53(3):
204 - 10
19. Zweers T, Preller L, Brunekreef B, Boleij JSM.
Health and indoor climate complaints of 7043
office workers in 61 buildings in the
Netherlands. Indoor Air 1992 Sep; 2(3):
127 - 36
20. Menzies RI, Tamblyn RM, Farant JP, Hanley J,
Nunes F, Tamblyn RT. The effect of varying
levels of outdoor air supply on the symptoms
of sick building syndrome. N Engl J Med
1993 Mar 25; 328(12): 821 - 7
21. Stenberg B, Eriksson N, Hoog J, Sundell J, Wall
S. The sick building syndrome (SBS) in office
workers. A case-referent study of personal,
psychosocial and building-related risk
indicators. Int J Epidemiol 1994 Dec;23(6):
1190 - 7
22. Hedge A, Erickson WA, Rubin G. Predicting sick
building syndrome at the individual and
aggregate levels. Environ Int 1996; 22(1):
3 - 19
23. Mizoue T, Reijula K, Andersson K. Environmental
tobacco smoke exposure and overtime work
as risk factors for sick building syndrome in
Japan. Am J Epidemiol 2001 Nov 1;154(9):
803 - 8
24. Chao HJ, Schwartz J, Milton DK, Burge HA. The
work environment and workers' health in four
large office buildings. Environ Health Persp
2003 Jul;111(9): 1242 - 8
25. Jaakkola MS, Jaakkola JJ. Office equipment and
supplies: A modern occupational health
concern ? Am J Epidemiol 1999 Dec;150(11):
1223 - 8
26. Mendell MJ, Fisk WJ, Deddens JA, Seavey WG,
Smith AH, Smith DF, Hodgson AT, Daisey
JM, Goldman LR. Elevated symptom

- prevalence associated with ventilation type in office buildings. *Epidemiology* 1996 Nov; 7(6): 583 - 9
27. Jaakkola JJ, Miettinen P. Type of ventilation system in office buildings and sick building syndrome. *Am J Epidemiol* 1995 Apr 15; 141(8): 755 - 65
28. Mendell MJ, Smith AH. Consistent pattern of elevated symptoms in air-conditioned office buildings: a reanalysis of epidemiologic studies. *Am J Public Health* 1990 Oct; 80(10): 1193 - 9
29. Jaakkola JJ, Miettinen P. Ventilation rate in office buildings and sick building syndrome. *Occup Environ Med* 1995 Nov; 52(11):709 - 14
30. Sundell J, Stenberg B, Lindvall T. Association between type of ventilation and air flow rates in office buildings and the risk of SBS-symptoms among occupants. *Environ Int* 1994; 20(2): 239 - 51
31. Hodgson M, Storey E. Patient and the sick building syndrome. *J Allergy Clin Immunol* 1994 Aug; 94(2 Pt 2): 335 - 43
32. Brooks SM. Host susceptibility to indoor air pollution. *J Allergy Clin Immunol* 1994 Aug; 94(2 Pt 2):344-51
33. Hodgson MJ, Frohlicher J, Permar E, Tidwell C, Traven ND, Olenchock SA, Karpf M. Symptoms and microenvironmental measures in nonproblem buildings. *J Occup Med* 1991 Apr; 33(4): 527 - 33
34. Hodgson MJ, Levin H, Wolkoff P. Volatile organic compounds and indoor air. *J Allergy Clin Immunol* 1994 Aug; 94(2 Pt 2): 296 - 303
35. Menzies D, Tamblyn RM, Nunes F, Hanley J, Tamblyn RT. Exposure to varying levels of contaminants and symptoms among workers in two office building. *Am J Public Health* 1996 Nov; 86(11):1629 - 33
36. Harrison J, Pickering CA, Faragher EB, Austwick PK, Little SA, Lawton L. An investigation of the relationship between microbial and particulate indoor air pollution and the sick building syndrome. *Respir Med* 1992 May; 86(3): 225 - 35
37. Teeuw KB, Vandenbroucke-Grauls CM, Verhoef J. Airborne gram-negative bacteria and endotoxin in sick building syndrome. A study in Dutch government office buildings. *Arch Intern Med* 1994 Oct;154(20): 2339 - 45
38. Niven RM, Fletcher AM, Pickering CA, Faragher EB, Potter IN, Booth WB, Jones TJ, Potter PD. Building sickness syndrome in healthy and unhealthy buildings: an epidemiology and environmental assessment with cluster analysis. *Occup Environ Med* 2000 Sep;57(9): 627 - 34
39. Reinikainen LM, Jaakkola JJ, Heinonen OP. The effect of air humidification on different symptoms in office workers-an epidemiologic study. *Environ Int* 1991; 7(4): 243 - 50
40. Lahtinen M, Sundman-Digert C, Reijula K. Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis. *Occup Environ Med* 2004 Feb; 61(2):143 - 9
41. Rollins V, Swift GH. Psychological issues: a multifaceted problem, a Multi-dimensional approach. In: Rostrom J, ed. *Sick Building Syndrome: Concepts, Issues and Practice*.

- 1st ed. Reprinted. London: E & FN Spon, 1998: 69 - 83
42. Ooi PI, Goh KT. Sick building syndrome: an emerging stress-related disorder ? Int J Epidemiol 1997 Dec; 26(6): 1243 - 9
43. Spurgeon A, Gompertz D, Harrington JM. Modifiers of non-specific symptoms in occupational and environmental syndromes. Occup Environ Med 1996 Jun; 53(6): 361 - 6
44. Fischman ML. Building-associated illness. In: LaDou J, ed. Current Occupational & Environmental Medicine. 3rd ed. New York: McGraw Hill, 2004: 744 - 56
45. Stenberg B, Eriksson N, Mild KH, Hoog J, Sandstrom M, Sundell J, Wall S. Facial skin symptoms in visual display terminal (VDT) workers. A case-referent study of personal, psychosocial, building- and VDT-related risk indicators. Int J Epidemiol 1995 Aug; 24(4): 796 - 803
46. Jones TF. Mass psychogenic illness: role of the individual physician. Am Fam Physician 2000 Dec 15; 62(12): 2649 - 56
47. Bolt HM, Kiesswetter E. Is multiple chemical sensitivity a clinically defined entity? Toxicol Lett 2002 Mar; 128(1-3): 99 - 106
48. Marshall L, Weir E, Abelsohn A, Sanborn MD. Identifying and managing adverse environmental health effects 1. Taking an exposure history. CMAJ 2002 Apr 16; 166(8): 1049 - 55
49. Newman LS. Occupational illness. N Engl J Med 1995 Oct 26; 333(17): 1128 - 34
50. Schneider T, Skov P, Valbjorn O. Challenge for indoor environment research in the new office. Scand J Work Environ Health 1999 Dec; 25(6): 574 - 9
51. Reijula K, Sundman-Digert C. Assessment of indoor air problems at work with a questionnaire. Occup Environ Med 2004 Jan; 61(1): 33 - 8
52. Godish T. Sick Buildings: Definition, Diagnosis and Mitigation. Indiana: Lewis, 1994
53. Tearle P. The sick building syndrome. Commun Dis Public Health 1999 Dec; 2(4): 303 - 4
54. Wargocki P, Bako-Biro Z, Clausen G, Fanger PO. Air quality in a simulated office environment as a result of reducing pollution sources and increasing ventilation. Energy and Building 2002 Sep 34(8): 775 - 83
55. Farris GJ. Indoor environmental control. In: Stellman JM, ed. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office, 1998: 45.1 - 45.25

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์

ท่านสามารถได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ กลุ่มที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งประเทศไทยสภาก (คปพ.) จากการอ่านบทความเรื่อง “กลุ่มอาการป่วยเหตุอาชาร” โดยตอบคำถามข้างล่างนี้ ที่ท่านคิดว่าถูกต้องโดยใช้แบบฟอร์มคำตอบ ท้ายคำถาม โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.ccme.or.th>

คำถาม - คำตอบ

1. กลุ่มอาการได้ไม่พูดในกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชาร
 - ก. กลุ่มอาการทางตา
 - ข. กลุ่มอาการทางระบบประสาท
 - ค. กลุ่มอาการทางระบบผิวนัง
 - ง. กลุ่มอาการทางระบบการหายใจ
 - จ. กลุ่มอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
2. ผู้ทำงานในอาคารสำนักงานใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชารน้อยที่สุด
 - ก. ห้องน้ำ
 - ข. พนักงานเพศหญิง
 - ค. พนักงานที่มีความเครียดในงาน
 - ง. พนักงานคอมพิวเตอร์
 - จ. พนักงานที่นั่งทำงานในห้องปรับอากาศ
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มอาการป่วยเหตุอาชารของผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน
 - ก. อาการเป็นแบบฉบับลับ
 - ข. และมักจะดีขึ้นเมื่อออกจากสิ่งแวดล้อมนั้น
 - ค. พนักงานปัจจัยภายใน เช่น หน้าจอภาพเป็นสาเหตุของเกิดกลุ่มอาการ
 - ง. การตรวจร่างกายและทางห้องปฏิบัติการมักไม่พบความผิดปกติ
 - จ. ปัจจัยด้านจิตสังคมในงานมีผลต่อการเกิดกลุ่มอาการ
 - ฉ. มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร

คำตอบ สำหรับความเรื่อง “กลุ่มอาการป่วยเหตุอาชาร”

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-23-201-9010/0502-(1002)

ชื่อ - นามสกุลผู้เข้าร่วม CME credit เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม.....
ที่อยู่.....

1. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

2. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

3. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

4. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

5. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

4. สิ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มอาการป่วยเหตุอาหารมากที่สุด คือ
- ก. การซักประวัติ
 - ข. การตรวจร่างกาย
 - ค. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 - ง. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 - จ. การเดินสำรวจสถานที่ทำงาน
5. ผู้ทำงานในอาคารสำนักงาน สามารถป้องกันการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาหาร ได้โดย
- ก. จัดระเบียบสถานที่ทำงาน วางกองเอกสารหรือหนังสือให้เป็นสัดส่วน
 - ข. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อมลพิษ เช่น การสูบบุหรี่ การประกอบอาหารในอาคาร
 - ค. ผู้มีความไวต่อการเกิดโรค ควรหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานใกล้เครื่องใช้สำนักงาน
 - ง. เมื่อพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ควรมีการถือสารให้ผู้ดูแลอาคารทราบ
 - จ. ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย สำหรับทุกคน รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-23-201-9010/0501-(1001)

1. จ 2. ข 3. ก 4. ค 5. ก

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่ประสงค์จะได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME credit)
กรุณาส่งคำตอบพร้อมรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มด้านหน้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ตีกอานันทนนิคล ชั้น 5

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตปทุมวัน กทม. 10330