

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ในเขตอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 ราย และ ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ในเขตอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 คน ผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้รับการดูแลโดยใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณีโดยวัดภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยายและนำเสนอ ดังนี้

- ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี
- ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณีจำแนกตามรายข้อ

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลัง
การใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อน
และหลังการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณีจำแนกตามรายด้าน

ตัวแปร	ก่อนทดลอง		หลังทดลอง		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ภาระการดูแล					
เชิงปรนัย	37.90	3.29	29.95	4.50	13.54*
เชิงอัตนัย	39.85	3.55	32.05	5.24	9.30*
รวม	77.75	5.74	62.00	9.33	13.93*

*p < .05

จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาระในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลโดยรวมและแยกราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยภาระในการดูแลผู้ป่วยของ
ผู้ดูแลหลังทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลัง
การใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณีจำแนกตามรายชื่อ
ตารางที่ 7 คะแนนภาวะ(เชิงประนัย)ในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ก่อนและ
หลังการทดลองจำแนกตามรายชื่อ

ภาวะในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล	ก่อนการทดลอง		หลังการทดลอง		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
	การดูแลผู้ป่วยทำให้ท่านมีปัญหาสุขภาพ	4.00	0.79	3.30	
เวลาในการดูแลสุขภาพร่างกายลดลง	3.70	0.57	3.15	0.67	4.81*
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมลดลง	3.40	0.59	3.10	0.55	2.34*
การดูแลผู้ป่วยรบกวนกิจวัตรประจำวันของท่าน	3.50	0.88	2.80	1.00	6.65*
การดูแลผู้ป่วยทำให้ท่านไม่มีเวลาพักผ่อน	3.25	0.63	2.80	0.76	2.65*
การดูแลผู้ป่วยทำให้ท่านนอนหลับไม่เพียงพอ	3.85	0.81	2.70	1.03	8.75*
เวลาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวน้อยลง	3.00	0.64	2.70	0.57	2.85*
ท่านต้องเสียเวลาทำงาน	3.50	0.51	2.60	0.82	6.28*
ท่านต้องรับผิดชอบงานหรือกิจกรรมมากขึ้น	2.75	0.55	2.10	0.64	5.94*
ผู้ป่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวได้รับอันตราย	2.60	0.82	1.50	0.76	7.67*
เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว	2.35	0.58	1.50	0.60	10.37*
เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและชุมชน	2.00	0.56	1.50	0.51	4.35*

* $p < .05$

จากตารางที่ 7 พบว่า ภาวะในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลด้านภาวะเชิงประนัยจำแนกตามราย
ชื่อก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 12 ข้อ โดยที่
คะแนนหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนสูงสุดหลังการทดลอง
คือ การดูแลผู้ป่วยทำให้ท่านมีปัญหาสุขภาพ (3.30 คะแนน) สำหรับข้อที่มีคะแนนต่ำสุดคือ เกิด
ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและชุมชน (1.50 คะแนน)

ตารางที่ 8 คะแนนภาวะ(เชิงอัตนัย)ในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ก่อนและ
หลังการทดลองจำแนกตามรายชื่อ

ภาวะในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล	ก่อนการ		หลังการ		t
	ทดลอง		ทดลอง		
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ท่านรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย	4.35	0.48	4.30	0.57	0.56
ท่านกังวลว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีท่าน	4.35	0.87	4.20	1.05	1.37
ท่านรู้สึกเครียดจากการดูแลผู้ป่วย	4.30	0.73	3.40	0.99	7.28*
ท่านรู้สึกกลัวเมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรง	3.70	0.65	2.70	0.92	5.62*
ท่านรู้สึกผิดที่ลงโทษหรือตำหนิผู้ป่วย	3.00	0.32	2.60	0.59	2.99*
ท่านรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตนเอง	3.35	0.81	2.45	0.94	4.41*
ท่านรู้สึกซึมเศร้าจากการดูแลผู้ป่วย	3.00	0.56	2.35	1.04	3.57*
ท่านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย	3.95	0.88	2.30	0.97	9.90*
ท่านรู้สึกท้อแท้ในการดูแลผู้ป่วย	3.15	0.67	2.20	0.89	6.19*
ท่านรู้สึกอายชาวบ้านเมื่อผู้ป่วยขุ่นวาย	2.60	0.75	2.10	0.85	3.68*
ท่านรู้สึกกังวลใจเมื่อต้องพาผู้ป่วยออกนอกบ้าน	2.80	0.76	2.00	0.56	4.29*
ท่านรู้สึกสงสารผู้ป่วย	1.35	0.48	1.45	0.60	-1.45

* $p < .05$

จากตารางที่ 8 พบว่า ภาวะในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลด้านภาวะเชิงอัตนัยจำแนกตามรายชื่อก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 9 ข้อ โดยที่คะแนนหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง และภาวะก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 3 ข้อ เมื่อพิจารณาข้อสูงสุดและข้อต่ำสุดพบว่าข้อที่มีคะแนนสูงสุดหลังการทดลอง คือ ท่านรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (4.30 คะแนน) และข้อที่มีคะแนนภาวะต่ำสุดคือ ท่านรู้สึกสงสารผู้ป่วย (1.45 คะแนน)