

รายงานฉบับสมบูรณ์

แลกดิกแอชิตแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากระพงขาว

Lates calcarifer

คณะผู้ทำวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ปิยะธีรธิตวรกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

นางสาวทศพร เรืองรักษลิขิต

นางสาวสรวงสุดา สุภาลัย

นายเสรี ดอนเหนือ

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร 10330

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยนี้เน้นการคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกในการเพิ่มความแข็งแรง ความต้านทานโรค และการเจริญเติบโตแก่ปลากระพงขาว เพื่อเป็นแนวทางการใช้วิธีการทางชีวภาพในการต้านทานโรคแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาว เพื่อลดปัญหาการตกค้างของสารเหล่านี้ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยให้เป็นแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2548

การวิจัยนี้ได้ดำเนินการที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแห่งเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิทยาศาสตร์ทางทะเล และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การแยกแกลกติกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารของปลากะพงขาว เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีสมบัติเป็นโพรไบโอติก ด้วยเทคนิค well agar diffusion ผลพบว่า มี 5 ไอโซเลต (กำหนดให้เป็น LAB-1 - LAB-5) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ *Aeromonas hydrophila* แบคทีเรียก่อโรคในปลาได้ ผลการวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบในอาหารผสมแบบเปียก พบว่า ปริมาณสารอาหารต่างๆ ในอาหารมีเพียงพอกับความต้องการของปลากะพงขาว ยกเว้นปริมาณ ไขมันที่ต่ำเกินไป ความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ที่ทำให้ปลาตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LC₅₀) หลังจากที่ได้รับเชื้อแล้ว 72 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7.76 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร และที่ 96 และ 120 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7.47 และ 7.26 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร ตามลำดับ ผสมอาหารกับแต่ละไอโซเลตที่คัดแยกได้ให้มีความเข้มข้น 10⁷ เซลล์/กรัมอาหาร นำมาเลี้ยงกับปลากะพงในตู้กระจก พบว่า มีเพียง LAB-4 เท่านั้น ที่มีการเสริมการเจริญเติบโตของปลาและต้านโรคที่เกิดจาก *A. hydrophila* ได้อย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) และเมื่อทำการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง โดยใช้ LAB-4 ผสมในอาหารปลาโดยใช้ความเข้มข้น 10⁵ และ 10⁷ เซลล์/กรัมอาหาร พบว่า ทุกกลุ่มทดลองมีอัตราการรอดชีวิต การเจริญเติบโตและความสามารถในการต้านโรคที่เกิดจาก *A. hydrophila* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P > 0.05$) สามารถตรวจพบ LAB-4 ในลำไส้ของปลากะพงขาวทั้ง 2 กลุ่มทดลองและไม่พบ LAB-4 ในกลุ่มควบคุม ปลากะพงขาวที่ตายหลังจากการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจนและสามารถตรวจพบ *A. hydrophila* ในเนื้อเยื่อของปลาที่ตายด้วยเทคนิคทาง Immunohistochemistry ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ LAB-4 ด้วยการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะ ปริมาณกรดแกลกติกด้วยเทคนิค HPLC และตรวจสอบสมบัติบางประการทางชีวเคมี รวมทั้งการหาลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA เพื่อใช้เทียบกับลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA ของ *Weissella confusa* ที่มีรายงานใน Genbank พบว่า ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ LAB-4 มีความใกล้เคียงกับ *Weissella* sp.

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	
1. บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา.....	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.4 ขอบเขตการทำงาน.....	2
2. สํารวจเอกสาร	
2.1 ปลากระพง.....	4
2.1.1 ลักษณะทั่วไป.....	4
2.1.2 แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย.....	5
2.1.3 วิธีการเพาะเลี้ยง.....	5
2.1.4 สมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยง.....	6
2.1.5 อาหาร.....	8
2.1.6 ระบบทางเดินอาหาร.....	10
2.1.7 โรคที่พบ.....	11
2.2 โพรไบโอติก.....	14
2.2.1 คำจำกัดความของโพรไบโอติก.....	14
2.2.2 คุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติก.....	15
2.2.3 การใช้โพรไบโอติกในสัตว์น้ำ.....	16
2.3 แลกติกแอซิดแบคทีเรีย.....	17
2.3.1 ข้อมูลทั่วไปและการจัดจำแนก.....	17
2.3.2 แลกติกแอซิดแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของปลา.....	19
2.3.3 สารยับยั้งการเจริญที่ผลิตโดยแลกติกแอซิดแบคทีเรีย.....	19
2.3.4 กลไกการออกฤทธิ์ของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย.....	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. การดำเนินการศึกษา	
3.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี.....	24
3.1.1 วัสดุอุปกรณ์.....	24
3.1.2 เคมีภัณฑ์.....	24
3.1.3 สารเคมีสำหรับการศึกษา Immunohistochemistry.....	25
3.1.4 สารเคมีสำหรับการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA.....	26
3.2 วิธีดำเนินการทดลอง.....	26
3.2.1 การคัดแยกแลกดิกแซทริคแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว.....	26
3.2.2 คัดเลือกแลกดิกแซทริคแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ.....	26
3.2.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแลกดิกแซทริคแบคทีเรีย.....	27
3.2.4 การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก (Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว	28
3.2.5 การหาค่าความเข้มข้นของเชื้อทดสอบที่ทำให้ปลากะพงขาวตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (Median Lethal concentration; LC ₅₀).....	29
3.2.6 การผสมแลกดิกแซทริคแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อ ใช้เลี้ยงในตู้กระจก.....	30
3.2.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจก.....	31
3.2.8 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อ การเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i>	31
3.2.9 การผสมแลกดิกแซทริคแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อ ใช้เลี้ยงในกระชัง.....	31
3.2.10 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชัง.....	32
3.2.11 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการ เหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i>	33
3.2.12 การตรวจดูแบคทีเรียในทางเดินอาหารปลากะพงขาว โดยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope).....	33
3.2.13 วิทยาของปลาที่ได้รับ <i>Aeromonas hydrophila</i> และการตรวจเนื้อเยื่อด้วย Immunohistochemistry.....	35

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3. การดำเนินการศึกษา (ต่อ)

3.2.14 การวิเคราะห์หากรดแล็กติกในส่วนน้ำไลต์ที่ได้จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).....	38
3.2.15 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ (16S ribosomal DNA) ของแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย.....	39

4. ผลการทดลอง

4.1 คัดแยกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว.....	44
4.2 คัดเลือกแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ.....	44
4.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย.....	45
4.4 การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก(Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว.....	48
4.5 การหาค่าความเข้มข้นของเชื้อทดสอบที่ทำให้ปลากะพงขาวตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (Median Lethal concentration; LC ₅₀).....	49
4.6 การผสมแล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้ เลี้ยงปลา ในตู้กระจก.....	51
4.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจก.....	51
4.8 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำ ให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	55
4.9 การผสม LAB-4 กับอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้เลี้ยงปลาในกระชัง.....	56
4.10 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชัง.....	57
4.11 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำ ให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i>	60
4.12 การตรวจดูแบคทีเรียในทางเดินอาหารปลากะพงขาว โดยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope).....	62
4.13 วิทยาของโรคและการตรวจหา <i>A. hydrophila</i> ด้วย Immunohistochemistry	63
4.14 การวิเคราะห์หากรดแล็กติกในส่วนน้ำไลต์ที่ได้จาก LAB-4 โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).....	65

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4. ผลการทดลอง (ต่อ)	
4.15 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16เอส โรโบโซมัลดีเอ็นเอของ LAB-4.....	65
5. วิจัยและสรุปผลการทดลอง	67
5.1 คัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว.....	67
5.2 คัดเลือกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ.....	68
5.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย.....	69
5.4 การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก (Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว.....	69
5.5 การหาค่าความเข้มข้นที่ทำให้ปลากะพงขาวตาย 50 % (Median Lethal concentration; LC ₅₀).....	70
5.6 การผสมแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้กับอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้ เลี้ยงปลาในตู้กระจกและกระชัง.....	71
5.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจกและการทดสอบ ความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจาก เชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	72
5.8 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชังและการทดสอบ ความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจาก เชื้อก่อโรค <i>Aeromonas hydrophila</i> รวมทั้งการตรวจดูแบคทีเรียด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และ Immunohistochemistry.....	74
5.9 การวิเคราะห์หากกรดแลกติกในส่วนน้ำไลต์ที่ได้จาก LAB-4 โดยวิธี High- Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ การวิเคราะห์ลำดับนิ วคลีโอไทด์ 16เอสโรโบโซมัล ดีเอ็นเอ ของ LAB-4.....	75
รายการอ้างอิง.....	77

สารบัญตาราง

	หน้า
1. ความแตกต่างระหว่างแบคทีเรียโอสินและสารปฏิชีวนะ.....	22
2. นิวคลีโอไทด์ไพร์เมอไรท์ที่ใช้สำหรับหานิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอของ แลกติกแอซิดแบคทีเรีย.....	43
3. ขนาดความกว้างของบริเวณยับยั้งที่เกิดจากเชื้อทดสอบโดยส่วนน้ำไลของ LAB.....	45
4. สมบัติทางกายภาพและทางชีวเคมีของ LAB-1 – LAB-5.....	46
5. การใช้คาร์โบไฮเดรตของ LAB-1 – LAB-5.....	46
6. การเจริญของ LAB-1 – LAB-5 ในอาหารที่มีเกลือระดับความเข้มข้นต่างๆ.....	47
7. การเจริญของ LAB-1 – LAB-5 ในอาหารที่มีเกลือระดับความเข้มข้นต่างๆ.....	47
8. ระดับโปรตีนและไขมันของส่วนประกอบต่างๆในอาหารปลา.....	48
9. ส่วนประกอบของอาหารปลากะพงขาวในการทดลอง.....	48
10. ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารปลาแบบเปียก(Moist diet).....	49
11. จำนวนปลากะพงขาวที่ตายหลังเติม <i>A. hydrophila</i> ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆใน น้ำเลี้ยงปลา เป็นเวลา 120 ชั่วโมง.....	50
12. ปริมาณแลกติกแอซิดแบคทีเรียเฉลี่ยในอาหารปลา(น้ำหนักเปียก).....	51
13. น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย ไฮโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ <i>A. hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	52
14. น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย ไฮโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ <i>A. hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	53
15. คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในตู้กระจก เป็นระยะเวลา 30 วัน.....	55
16. น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร ในกระชัง.....	57
17. ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร ในกระชัง.....	58
18. คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน.....	60

สารบัญรูป

	หน้า
1. ปลากะพงขาว white seabass <i>Lates calcarifer</i>	4
2. ค่า LC ₅₀ ของ <i>A. hydrophila</i> ที่ทำให้ปลากะพงขาวตายที่เวลาต่างๆ.....	50
3. น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ <i>A. hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	53
4. ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ <i>A. hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	54
5. การรอดชีวิตวันที่ 30 ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิด แบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ <i>A. hydrophila</i> ในตู้กระจก.....	54
6. ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวน้ำให้เกิดโรคด้วย <i>A. hydrophila</i> หลังการเลี้ยงในตู้กระจก เป็นระยะเวลา 30 วัน.....	56
7. น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10 ⁵ (LAB-4/5) และ 10 ⁷ (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร ในกระชัง.....	58
8. ความยาวเฉลี่ยปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10 ⁵ (LAB-4/5) และ 10 ⁷ (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร ในกระชัง.....	59
9. การรอดชีวิตวันที่ 60 ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10 ⁵ (LAB-4/5) และ 10 ⁷ (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร ในกระชัง.....	59
10. ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวน้ำให้เกิดโรคด้วย <i>A. hydrophila</i> หลังการเลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน ด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความ เข้มข้น 10 ⁵ (LAB-4/5) เซลล์ต่อกรัมอาหาร.....	61
11. ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวน้ำให้เกิดโรคด้วย <i>A. hydrophila</i> หลังการเลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน ด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความ เข้มข้น 10 ⁷ (LAB-4/7) เซลล์ต่อกรัมอาหาร.....	61
12. การยึดเกาะของแบคทีเรียภายในลำไส้ของปลากะพงขาว.....	62
13. วิจารณ์ของโรคที่เกิดจากการเหนียวน้ำให้เกิดโรคด้วย <i>A. hydrophila</i> โดยรูป.....	63
14. เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของปลากะพงขาวที่ถูกเหนียวน้ำให้เกิดโรคด้วย <i>A. hydrophila</i>	64
15. ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ LAB-4.....	65

แลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว

Lates calcarifer

1.1 หลักการและเหตุผล

อาชีพหลักของคนไทย คือ การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย พืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ ในอาชีพดังกล่าวการประมงนับว่าเป็นอาชีพที่สร้างผลผลิตทางการเกษตรก่อให้เกิดกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากแขนงหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตทั้งหมดได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ปริมาณที่จับได้ไม่แน่นอน ทำให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกันอย่างแพร่หลาย และสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ก็คือ ปลากะพงขาวเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูงจึงเป็นปลาที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เพาะเลี้ยงและมีแนวโน้มจะประกอบเป็นอาชีพหลักกันมากขึ้น

ปลากะพงขาว(*Lates calcarifer*) เป็นปลาที่มีการเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ปลาชนิดนี้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มสูง ในประเทศไทยนอกจากจะมีการเลี้ยงในกระชังตามชายฝั่งทะเล ยังมีการเลี้ยงในบ่อน้ำจืดในหลายจังหวัด เช่น ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี เป็นต้น (จิรศักดิ์ และคณะ, 2534) ปลากะพงขาวเป็นปลาที่นิยมนำมาบริโภคเนื่องจากมีรสชาติดีสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลายแบบรวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการ มีส่วนประกอบของไขมันเพียงเล็กน้อยและมีวิตามินบี12 ในปริมาณมาก(สมใจ, 2527) ปลากะพงขาวจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยง ปัจจุบันเกษตรกรไทยนิยมผลิตลูกปลานี้ส่งไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซียและไต้หวัน(กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2535) ในการเลี้ยงปลากะพงขาวให้มีสุขภาพแข็งแรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งผู้เลี้ยงประสบปัญหาต่างๆ อย่างหลักเลี้ยงไม่ได้ เช่น ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานและน้ำกักทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงทำให้ปลามีอาการซึมลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำและกินอาหารน้อยลง ก่อให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียและเกิดโรคระบาดได้ง่าย แบคทีเรียสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในปลากะพงขาว ได้แก่ *Vibrio* spp. และ *Aeromonas hydrophila* การรักษาโดยทั่วไปนั้นใช้สารปฏิชีวนะ เช่น เทตราไซคลิน คลอแรมเฟนิคอล 2.8-3.0 กรัมผสมกับอาหาร 1 กิโลกรัม ให้ปลากินติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน หรือ นำสารปฏิชีวนะในปริมาณมากกว่าปริมาณที่กำหนดผสมกับน้ำและนำปลามาแช่ในระยะเวลาสั้นซึ่งความเข้มข้นดังกล่าวหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้ปลาตายได้ (Powell, 2000) ในปัจจุบันพบปัญหาการ

คือยาของแบคทีเรียและปัญหาสารปฏิชีวนะตกค้าง จึงมีการรณรงค์ให้ลดการใช้สารปฏิชีวนะ และหาวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในปลากะพงขาวด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้วัคซีน พบว่าในลูกปลากะพงขาววัคซีนให้ผลในการป้องกันโรคแต่ไม่สามารถช่วยให้ปลาที่ได้รับวัคซีนมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าในลูกปลากะพงขาวที่ไม่รับวัคซีน(จิรศักดิ์ และคณะ, 2534) การใช้โพรไบโอติกเป็นอีกวิธีที่เริ่มมีการศึกษาได้ผลแล้วในไก่(ฐิติพงษ์, 2539) สุกกร (Zani, 1988) กุ้ง (วรรณิกา, 2539) และปลาบางชนิด เช่น Rainbow trout (Nikoskelainen, 2001) แต่ยังไม่มีการศึกษาในปลากะพงขาว ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกหาแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกเพื่อเพิ่มความต้านทานโรค ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตให้แก่ปลากะพงขาวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การใช้โพรไบโอติกแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะมีความปลอดภัยมากกว่ารวมทั้งสามารถลดปัญหาการตกค้างของสารเหล่านี้ต่อการส่งออกด้วย ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงปลาชนิดนี้ของเกษตรกรมีความเสี่ยงลดลงและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียจากทางเดินอาหารของปลากะพงขาวที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากะพงขาวได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ได้สายพันธุ์แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกในการเพิ่มความแข็งแรง ความต้านทานโรค และการเจริญเติบโตแก่ปลากะพงขาว

1.3.2 เป็นแนวทางในการหาวิธีการทางชีวภาพในการต้านทานโรคแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในปลากะพงขาวเพื่อลดปัญหาการตกค้างของสารเหล่านี้

1.4 ขอบเขตการทำงาน

1.4.1 คัดเลือกและศึกษาสมบัติของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบกลุ่ม Vibrionaceae จากทางเดินอาหารปลากะพงขาว

1.4.2 ศึกษาการเติบโตของปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารที่ผสมแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่ได้จากการคัดแยก

1.4.2.1 เลี้ยงในตู้กระจกภายในห้องปฏิบัติการ

1.4.2.2 เลี้ยงในกระชังที่อยู่ในบ่อดิน

1.4.3 ทดสอบความสามารถของปลากระพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila*

1.4.4 ศึกษาเนื้อเยื่อปลาที่ได้รับเชื้อก่อโรคในด้วยวิธี Immunohistochemistry

1.4.5 วิเคราะห์หารวดแลกติกจากแลกติกแอซิดแบคทีเรีย โดยวิธี

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

1.4.6 วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ (16S ribosomal DNA) ของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.1 ปลากะพงขาว

2.1.1 ลักษณะทั่วไป

ลักษณะลำตัวค่อนข้างยาวและหนา แบนข้างเล็กน้อย บริเวณไหล่จะโค้งมน ส่วนตัวจะลาดชันและเว้า ส่วนของขากรรไกรล่างจะยื่นยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย ปากกว้าง ขอบปากบนเป็นแผ่นใหญ่ แยกเป็นแนวตอนต้นและตอนท้ายอย่างชัดเจน บริเวณส่วนปากจะยึดหดได้บ้าง ช่องปากเฉียงลงด้านล่างเล็กน้อย มีฟันเล็กละเอียดบนขากรรไกรบนและล่าง และที่เพดานปาก ตาของปลาชนิดนี้มีขนาดกลาง ไม่มีเยื่อที่เป็นไขมันหุ้ม แขนงแก้มมีขนาดใหญ่ มีขอบหลังเป็นหนามแหลม 4 ซี่ และเรียงต่อกันด้วยซี่เล็กๆ จัดตามแนวหลัง ด้านบนส่วนหัวและบนแผ่นเหงือกมีเกล็ดขนาดต่างๆกัน เกล็ดบริเวณลำตัวค่อนข้างใหญ่ ด้านหลังมีสีเทาเงินหรือเขียวปนเทา ส่วนท้องจะมีสีเงินแกมเหลือง บริเวณด้านข้างของลำตัวมีสีเงิน ครีบหลังครีบกัน ครีบหาง จะมีสีเทาปนเงิน บางๆ มีครีบหลังสองตอน ตอนแรกอยู่ตรงตำแหน่งของครีบท้อง มีก้านครีบแข็งแหลมคมขนาดใหญ่ 7-8 ก้าน เชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆ ครีบหลังตอนที่สอง แยกจากตอนแรกอย่างเห็นได้ชัด มีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน ก้านครีบอ่อนมีปลายแตกแขนง มี 10-11 ก้าน ครีบหูและครีบอกยาวไม่ถึงรู ก้าน ครีบกันมีตำแหน่งใกล้เคียงกับครีบหลังตอนที่สอง ซึ่งประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 3 ก้าน ก้านครีบอ่อน 7-8 ก้าน ข้องหางสั้น ครีบหางค่อนข้างกลม เส้นข้างตัวโค้งไปตามแนวสันหลัง มีเกล็ดบนเส้นข้างตัว 52-61 เกล็ด(สโมสรคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531)



รูปที่ 1 ปลากะพงขาว White seabass *Lates calcarifer*

ที่มา : www.fao.org

2.1.2 แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย

ปลากะพงขาวเป็นปลาในท้องถิ่นที่พบตามชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และจัดเป็นตัวอย่างของปลาเขตร้อนที่มีการแพร่กระจายในบริเวณค่อนข้างกว้างมาก คือ บริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวเปอร์เซีย บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ไทย มาเลเซีย กัมพูชาประชาธิปไตย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ตอนเหนือของออสเตรเลีย และตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน(สมใจ, 2527) เนื่องจากปลากะพงขาวพบในหลายประเทศ ทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ เช่น ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ giant perch, white seabass, silver seaperch, palmer และ cock-up seabass ภาษาอินเดีย begti, gitador และ boor ภาษาฟิลิปปินส์ kakap, katuyot และ bulgan ภาษาอินโดนีเซีย pelak, telap และ petcham เป็นต้น

ปลากะพงขาวเป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่ที่สุด เจริญเติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและน้ำจืด จัดได้ว่าเป็นปลาประเภทสองน้ำ คือ ในช่วงชีวิตของปลากะพงขาวจะมีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม ปลากะพงขาวขนาดใหญ่จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ห่างไกลออกไปจากฝั่งมากนัก พบมากตามบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง ปากทะเลสาบและปากอ่าวบริเวณที่เป็นป่าไม้ชายเลนที่มีน้ำเค็มท่วมถึง สำหรับประเทศไทยสามารถพบปลากะพงขาวตามชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ๆที่มีทางออกติดต่อกับทะเลมีป่าไม้ชายเลนขึ้นปกคลุม เช่น จังหวัดตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฯลฯ

ปลากะพงขาวจะผสมพันธุ์และวางไข่ในน้ำทะเลที่มีความเค็มประมาณ 28-32 ส่วนในพันส่วน ในทะเลที่มีความลึก หลังจากนั้นไข่จะถูกพัดพาเข้าสู่บริเวณชายฝั่งและฟักออกเป็นตัว ลูกปลากะพงขาวที่ฟักออกเป็นตัว จะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำกร่อยและน้ำจืด จนมีอายุได้ 2-3 ปี มีขนาด 3-5 กิโลกรัม จะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเล เพื่อทำการผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป (สมใจ,2527)

2.1.3 วิธีการเพาะเลี้ยง

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

2.1.3.1 การเลี้ยงปลาในนาุ้ง ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป ลูกปลาที่ปล่อยมีขนาด 1-2 เซนติเมตร ความหนาแน่นที่เลี้ยงไร่ละ 800-1,600 ตัว

2.1.3.2 การเลี้ยงปลาในบ่อน้ำกร่อย ขนาด 2.5-10 ไร่ ความหนาแน่นที่เลี้ยงไร่ละ 1,600-3,200 ตัว

2.1.3.3 การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นวิธีที่นิยมมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำกว่าการขุดบ่อเลี้ยงเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถปล่อยพันธุ์ปลาลงเลี้ยงได้เป็นจำนวนมากกว่าเพราะน้ำถ่ายเทได้ดีช่วยให้ปลามีอัตราการรอดสูง ขนาดของกระชังที่นิยมใช้ คือ 5x5 เมตร สามารถปล่อยเลี้ยงได้ตั้งแต่ 10-20 ตัวต่อตารางเมตร (วิเศษและวิไลวรรณ, 2529)

2.1.4 สมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยง (คู่มือขุดทดสอบฟอสเฟต ไนโตรเจน ไนเตรทและแอมโมเนียรวม ของบริษัท ปริมาเทค จำกัด; มั่นสิน, 2539)

2.1.4.1 อุณหภูมิของน้ำ ควรมีค่าคงที่ สม่ำเสมอตลอดฤดูกาลเพาะเลี้ยง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอยู่ระหว่าง 28-30 องศาเซลเซียส

2.1.4.2 ความเค็มของน้ำ ควรอยู่ในช่วง 27-32 ส่วนในพัน และมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงที่ไม่กว้างมากนัก อย่างไรก็ตามความเค็มของน้ำที่อยู่ในช่วง 10-32 ส่วนในพัน จะสามารถทำการเลี้ยงปลากะพงขาวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ปลากะพงขาวยังสามารถเจริญเติบโตในน้ำจืดได้เช่นกัน

2.1.4.3 ปริมาณของออกซิเจนในน้ำ ควรจะมีอยู่ในปริมาณที่สูงพอสมควร และมีค่าคงที่อยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นักประมงได้สรุปอิทธิพลของออกซิเจนในน้ำไว้ดังนี้ หากมีออกซิเจนในน้ำน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร นานหลายชั่วโมง ปลาอาจตายได้ ออกซิเจนในน้ำอยู่ระหว่าง 1-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปลาจะเจริญเติบโตช้าและไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ดี ออกซิเจนในน้ำมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกินระดับอิ่มตัว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์

2.1.4.4 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถดำรงอยู่ได้ที่ pH ที่เป็นกลางประมาณ 6-9 pH ที่สูงหรือต่ำเกินไปจะสร้างความเครียดให้กับปลา บางครั้งถึงกับทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายได้ทันที

2.1.4.5 ความเป็นด่าง (alkalinity) สภาพต่าง หมายถึง ความสามารถของน้ำที่จะรับ H^+ เพื่อทำให้กรดเป็นกลาง ความเป็นด่างจะวัดในรูปของ $CaCO_3$ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาควรมีความเป็นด่างมากกว่า 20-40 ppm และควรมีค่าอยู่ระหว่าง 100-120 ppm ผลของความเป็นด่างนั้นจะส่งผลต่อปริมาณฟอสเฟตและสารอาหารอื่นๆในน้ำด้วย

2.1.4.6 ฟอสเฟต(PO_4^{3-}) เป็นสารประกอบที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสสำหรับแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรีย ที่จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติในบ่อ ได้แก่

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน โดยปกติแล้วปริมาณฟอสเฟตในน้ำจะอยู่ในระดับต่ำตลอดเวลา เนื่องจากฟอสเฟตสามารถดูดซึมอย่างรวดเร็วโดยแพลงก์ตอนและแบคทีเรียอีกทั้งยังตกตะกอนกับแคลเซียมในสภาพที่น้ำมี pH สูง และตกตะกอนกับอลูมิเนียมและเหล็กในสภาพที่น้ำมี pH ต่ำ การที่ปริมาณฟอสเฟตในน้ำสูงบ่งชี้ว่าน้ำมีของเสียมาก แพลงก์ตอนพืชจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้น้ำเน่าเสียซึ่งเป็นต้นเหตุให้ออกซิเจนในน้ำต่ำลง จนปลาเป็นอันตรายได้ โดยในแหล่งน้ำเค็มทั่วไปจะมีฟอสเฟตอยู่ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร หากปริมาณของฟอสเฟตเปลี่ยนแปลงไปควรแก้ไข ดังนี้ ปริมาณของฟอสเฟตในช่วง 0.0-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าพื้นที่ดินกรด ควรปรับ pH ดินให้ได้มากกว่า 5.5 และเติมปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 400 กรัมต่อไร่ ทุก 7 วัน ปริมาณของฟอสเฟตในช่วง 1.0-10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่ามีการเลี้ยงปลาในปริมาณที่หนาแน่นและอาจมีอาหารตกค้างมาก การเลี้ยงปลาในน้ำเค็มควรควบคุมให้น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และในน้ำจืดควรควบคุมให้น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.1.4.7 ไนไตรท์ (NO_2^-) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนีย การสะสมไนไตรท์ในน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเน่าสลายของสารอินทรีย์และปล่อยแอมโมเนียออกมามาก ในสภาวะที่มีออกซิเจนแอมโมเนียจะเปลี่ยนเป็นไนไตรท์และในกรณีที่มี pH สูงกว่า 8 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนไนไตรท์ให้เป็นไนเตรทจะลดลงทำให้เกิดการสะสมไนไตรท์ในน้ำ ซึ่งไนไตรท์จะถูกดูดซึมเข้าสู่ปลาทางเหงือกและจะไปทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือดทำให้ไม่สามารถขนถ่ายออกซิเจนได้ เลือดจะเป็นสีน้ำตาล หรือเรียกว่าโรคเลือดสีน้ำตาล ความเป็นพิษของไนไตรท์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีแอมโมเนียสูง ไนไตรท์ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าระดับที่ทำให้สัตว์น้ำตาย จะทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและติดโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียได้ง่าย ในน้ำเลี้ยงปลาควรมีไนไตรท์น้อยกว่า 0.1-0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.1.4.8 ไนเตรท (NO_3^-) เป็นสารประกอบที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนสำหรับแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติในบ่อ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ไนเตรทมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่ำมาก แต่การสะสมของไนเตรทในน้ำปริมาณสูงๆ อาจแสดงให้เห็นถึงภาวะในแหล่งน้ำ และในบางสภาวะที่เกิดการขาดออกซิเจนไนเตรทอาจถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปไนไตรท์ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ในแหล่งน้ำทั่วไปจะมีไนเตรทอยู่ 0.0-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรทที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาควรอยู่ในช่วง 0.01-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.1.4.9 แอมโมเนียรวม ($\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$) เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่เกิดจากการปล่อยของเสียจากการกินอาหารพวกโปรตีนออกมาในรูปแอมโมเนียและการเน่าสลายของเศษ

อาหาร ซึ่งเกิดจากอาหารที่เหลือและเศษอาหารที่ขับถ่ายออกมาภายในบ่อแล้วเกิดการย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์ภายในบ่อ แอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำมี 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนีย(NH_3) ที่ยังไม่แตกตัวจะเป็นพิษกับสัตว์น้ำ และแอมโมเนียมไอออน (NH_4^+) ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อแอมโมเนีย คือ ออกซิเจนในน้ำ ค่า pH ปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำช่วง 0.4-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ผลของแอมโมเนียจะทำให้สัตว์อ่อนแอ ติดเชื้อโรคน่าง่าย ไม่สามารถขับถ่ายออกได้ ปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำควรรอยู่ในช่วง 0.0-0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.1.5 อาหาร

ปลากะพงขาวจะกินอาหารตามช่วงอายุ ช่วงชีวิตส่วนใหญ่จะกินเนื้อหรือกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร จึงจัดเป็น Carnivorous fish เราสามารถแบ่งชนิดและระยะเวลาการให้อาหารในการเลี้ยงปลากะพงขาว ได้ดังนี้

2.1.5.1 คลอเรลลา จัดเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดเล็กมาก เหมาะที่จะใช้เลี้ยงลูกปลากะพงขาวที่มีอายุ 2-10 วัน คลอเรลลาที่ใส่ลงในบ่ออนุบาลจะเป็นอาหารสำหรับให้ลูกปลาและไรติเฟอร์กินเป็นอาหารช่วยบดบังแสงแดดให้กับลูกปลา และช่วยขับของเสียบางอย่างที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพดีด้วย

2.1.5.2 ไรติเฟอร์ เป็นไรน้ำขนาดเล็ก กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร การให้ไรติเฟอร์เป็นอาหารแก่ลูกปลานั้น ใช้ถุงแพลงก์ตอนเก็บรวบรวมไรติเฟอร์จากบ่อเพาะไรติเฟอร์ไปใส่ในบ่ออนุบาลลูกปลาให้เพียงพอ ประมาณ 5-10 ตังต่อน้ำ 1 มิลลิลิตร ปกติจะให้ไรติเฟอร์เป็นอาหารเมื่อลูกปลาอายุครบ 3 วันจนลูกปลาอายุได้ 14 วัน

2.1.5.3 อาร์ทีเมีย เริ่มให้อาร์ทีเมียแก่ลูกปลา เมื่อลูกปลาอายุได้ 8 วัน เพราะมีลูกปลาดำโตที่ สามารถกินอาร์ทีเมียแทนไรติเฟอร์ได้ ปกติแล้วจะให้อาร์ทีเมียจนกว่าลูกปลาจะกินเนื้อปลาสดได้ หรือเมื่อลูกปลามีอายุได้ 20 วัน

2.1.5.4 เนื้อปลาสับละเอียด ลูกปลามีอายุครบ 21 วันขึ้นไป เริ่มฝึกให้กินเนื้อปลาสับละเอียดโดยในตอนแรกลูกปลาซึ่งไม่เคยกินและยังไม่ยอมกิน ต้องพยายามฝึกเป็นประจำ

2.1.5.5 เนื้อปลาเป็นชิ้น เมื่อปลาอายุได้ 2-3 เดือน ปลากะพงขาวจะชินกับเหยื่อที่ตายแล้วและปลาเริ่มโต ปลาที่ให้ไม่จำเป็นต้องสับละเอียดอีก ให้หั่นเป็นชิ้นๆ ใช้เลี้ยงปลากะพงขาวจนถึงขนาดที่จะบริโภคหรือขายได้ (สมใจ, 2527)

นอกจากอาหารที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เมื่อปลาผ่านพ้นช่วงอนุบาลลูกปลา สามารถฝึกปลากะพงขาวให้กินอาหารผสม(Mixed Diet) ในรูปอาหารเม็ดแบบเปียก (Moist Pellet) ได้ โดยต้องมีระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลา(วิเชียรและคณะ, 2532) ส่วนประกอบทั่วไปของอาหารปลากะพงขาว ประกอบด้วย ปลาป่น, รำข้าว, วิตามิน, แร่ธาตุ, แป้งเจลาติน, วิตามินซี, น้ำมันปลาทะเล, น้ำมันพืช, น้ำ(Boonyaratpalin, 1988)

วิเชียรและคณะ(2532) ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดความยาวเฉลี่ย 7.57 เซนติเมตร น้ำหนักตัวเฉลี่ย 5.07 เซนติเมตร ด้วยอาหารผสม(Mixed Diet) และใช้ในรูปแบบเปียก (Moist Pellet) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้อาหารผสมที่มีโปรตีน 3 ระดับ คือ 45, 48 และ 51 % แต่ละระดับมีไขมัน 13 และ 18 % รวมเป็นอาหาร 6 สูตร และเป็นอาหารผสมอีก 1 สูตร ซึ่งมีระดับโปรตีน 54 % ไขมัน 13 % เป็นอาหารเปรียบเทียบ พบว่า อาหารสูตรที่มีโปรตีน 45 % ไขมัน 18 %(จากการคำนวณ) มีอัตราการรอด 100 %และการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด และจากการวิเคราะห์อาหารสูตรดังกล่าว พบว่า มีระดับโปรตีน 46.71 % ไขมัน 15.64 %

Catacutan และ Coloso(1997) ศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรต 2 ระดับ คือ 15, 20 % และระดับไขมัน 3 ระดับ คือ 6, 12, 18 % ระดับโปรตีนคงที่ 42.5 %ทุกสูตรอาหารในอาหารผสม ปลากะพงขาวที่ใช้มีน้ำหนักเริ่มต้น 0.85-0.93 กรัม เลี้ยงเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่มีระดับคาร์โบไฮเดรต 20 %กับระดับไขมัน 12 หรือ 18 % ทำให้น้ำหนักและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีอัตราสูงสุด และสูตรอาหารที่มีระดับคาร์โบไฮเดรต 15 % กับระดับไขมัน 6 % ทำให้น้ำหนักและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีอัตราต่ำสุด

Boonyaratpalin (1997) รายงานระดับสารอาหารที่ปลากะพงขาวต้องการไว้ว่า ปลากะพงขาวต้องการโปรตีน 45-55 %, ไขมัน 15-18 %, คาร์โบไฮเดรต ไม่เกิน 20 % ส่วนระดับและชนิดของวิตามิน, แร่ธาตุขึ้นอยู่กับขนาดและระยะการเจริญของปลา

Williams et al.(2003) ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 230 กรัม ด้วยอาหารผสมที่ระดับโปรตีน 38, 42.5 และ 52 % ไขมัน 7, 12.8 และ 18.3 % พบว่า สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 52 กับ ไขมัน 18.3 % ทำให้น้ำหนักและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด ส่วนปลากะพงขาวน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 80 กรัม ด้วยอาหารผสมที่ระดับโปรตีน 43.8 และ 64.7 % ไขมัน 11.5 และ 22.4 % พบว่า สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 64.7 กับ ไขมัน 22.4 % ทำให้น้ำหนักและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด

2.1.6 ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นตั้งแต่ปากไปสุดที่รูทวารหนัก อาหารจะผ่านจากช่องปากของปลาตรงเข้าไปในคอหอย (Pharynx) ปลาบางชนิด เช่น พวกปลาหลังเขียว (herrings) จะมีคอหอยที่ดัดแปลงเป็นกล้ามเนื้อหนาช่วยในการบดอาหาร ทำหน้าที่คล้ายกระเพาะบดในพวกนก พวกปลากินเนื้อจะมีพื้นที่คอหอยทำหน้าที่ช่วยกัดหรือบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กลง ปลากินพืชหรือหอยที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปลาวงศ์ตะเพียนจะมีพื้นที่คอหอยมีลักษณะคล้ายฟันกรามของมนุษย์

จากคอหอยจะเป็นอวัยวะที่เรียกว่า กระเพาะอาหาร(stomach) มีลักษณะเป็นรูปถุงยาว ก้นถุงแคบ มีสีน้ำตาลอ่อน ผิวภายนอกเรียกว่าหลอดคอ กระเพาะอาหารจะทอดไปตามยาวของตัวปลา ผิวภายในของกระเพาะอาหารเป็นรอยย่นดี และมีต่อมทำหน้าที่ขับน้ำย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนของทางเดินอาหารที่ขยายใหญ่และเจริญดีในพวกปลากินเนื้อที่จับเหยื่อขนาดใหญ่ ปลาหลายชนิดไม่มีกระเพาะอาหารที่แท้จริง มีแต่ท่อทางเดินอาหารที่ขยายใหญ่อยู่ทางด้านหน้าของลำไส้เล็ก (small intestine) ลำไส้เล็กแยกออกจากกระเพาะอาหารด้วยกล้ามเนื้อหูรูด ลักษณะอาจจะเป็นท่อเหยียดตรงหรือขดม้วนทับกันเป็นก้อนใหญ่ ลำไส้เล็กของปลาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ส่วนต้น(duodenum) เป็นส่วนที่ยาวกว่าส่วนอื่นและมีกล้ามเนื้อหนาห่อหุ้มไว้ อยู่ถัดจากส่วนท้ายของกระเพาะอาหารทอดยาวไปทางหาง หรืออาจขดงอเล็กน้อย ร่องรอยที่บ่งชี้ว่าแยกออกจากกระเพาะอาหาร คือ มีสีด่างกว่ากระเพาะอาหารเพราะมีท่อน้ำดีมาเปิดเข้าในบริเวณนี้ ส่วนกลาง(jejunum) มีขนาดสั้นกว่าแต่สีและขนาดไม่แตกต่างกัน ส่วนปลาย(ileum) มีขนาดสั้นและแคบกว่าส่วนอื่นๆและตรงไปทางท้าย บริเวณส่วนต้นของลำไส้เล็กจะพบไส้ติ่ง(pyloric caeca) เป็นท่อปลายตัน มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ มีความกว้างและยาวต่างๆกันขึ้นกับชนิดของปลา มีหน้าที่ช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการย่อยอาหาร ส่วนของทางเดินอาหารที่ต่อจากลำไส้เล็ก คือ ลำไส้ใหญ่ (large intestine) แยกจากส่วนของลำไส้เล็กโดยรอยคอดกึ่งผนังภายในจะมีรอยย่นมากกว่าของลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ในปลากระดูกแข็งมี rectum แล้วถึงช่องทวาร

นอกจากนี้ยังมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารที่สำคัญได้แก่ ตับ(liver) มีหน้าที่ช่วยเก็บอาหารพวกน้ำตาลและไขมันไว้ใช้ในยามขาดแคลน ตับจะช่วยในการย่อยอาหารโดยการสร้างน้ำย่อยไปให้ลำไส้ ช่วยเก็บของเสียจากน้ำดี ถุงน้ำดี(gall bladder หรือ bile sac) เป็นถุงใสค่อนข้างกลม ภายในถุงมีน้ำดี(bile) ซึ่งผลิตจากตับบรรจุอยู่เต็ม น้ำดีมีรสขม จากถุงน้ำดีจะมีท่อเรียกว่า common bile duct นำน้ำดีไปสู่ส่วนต้นของลำไส้เล็กช่วยในการย่อยอาหารประเภทไขมัน น้ำดีใช้เป็นสารกระจายไขมัน(emulsifying agent) และช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำย่อย

อาหารให้เหมาะสม ตับอ่อน(pancreas) มีหน้าที่ผลิตน้ำย่อยและฮอร์โมน(วิมล, 2540; สุภาพร, 1999)

2.1.7 โรคที่พบ

การเลี้ยงปลากะพงขาว เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างแพร่หลายและมักจะประสบปัญหาต่างๆ มากมายจากการเพาะเลี้ยง นับตั้งแต่การผสมพันธุ์ เพาะฟัก อนุบาล จนกระทั่งเลี้ยงได้ขนาดที่ตลาดต้องการก็ประสบปัญหาเช่นกัน แต่ปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับความเสียหายอย่างมากคือปัญหาเป็นโรค

โรคเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น คุณภาพของอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ ทำให้ปลาอ่อนแอและเกิดโรคได้ หรืออาจเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างกะทันหัน เช่นในช่วงฤดูฝน คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงมากทั้งความเค็มและอุณหภูมิ ซึ่งจะเกี่ยวข้องไปถึงคุณสมบัติด้านอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อปลาด้วย โรคที่พบเสมอในการเลี้ยงปลากะพงขาวมีสาเหตุในการเกิดโรคแตกต่างกัน พอจะสรุปได้ดังนี้

2.1.7.1 โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

2.1.7.2 โรคที่เกิดจากตัวเบียน

2.1.7.3 โรคที่เกิดจากเชื้อรา

2.1.7.4 โรคที่เกิดจากไวรัส

2.1.7.5 โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

2.1.7.6 โรคที่เกิดจากสภาพน้ำไม่เหมาะสม

2.1.7.7 โรคที่เกิดจากการขาดอาหาร

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียเท่านั้น

โดยทั่วไปในน้ำจะมีแบคทีเรียชนิดต่างๆปนอยู่มากมายหลายชนิดและเมื่อปลาอ่อนแออันสืบเนื่องมาจากขั้นตอนต่างๆ ในการเลี้ยงจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมของการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นอย่างยิ่ง เมื่อแบคทีเรียในน้ำได้เข้าสู่ปลาก็จะเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำบริเวณนั้นมีปริมาณแบคทีเรียสูงมากเป็นสาเหตุให้เชื้อแบคทีเรียเข้าเกาะปลาตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเดียวกันและเกิดโรคระบาดขึ้นในที่สุด แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในปลากะพงขาวมีดังนี้

- *Vibrio* spp.

มีลักษณะเป็นท่อนสั้นหรือโค้งงอ เจริญได้ดีทั้งในที่ที่และไม่มีออกซิเจน อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ มีขนาด $0.5 \times 1.0-2.0$ นาโนเมตร แบคทีเรียตัวนี้มักอยู่ร่วมกับ *Aeromonas hydrophila* พบในปลากระพงขาวที่เลี้ยงในน้ำเค็มและน้ำกร่อย

อาการที่พบ ปลามีอาการตกเลือดตามลำตัวเป็นจุดแดง ครีบกร่อน เป็นแผลบริเวณลำตัว ท้องบวม ดับและโตบวม ถ้าปลามีอาการดังนี้แล้วไม่ได้รับการรักษาทันทีจะทำให้ปลาตายได้

การป้องกันรักษา ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น เทตราไซคลิน ออกซีเทตราไซคลิน คลอแรมเฟนิคอล 2.8-3.0 กรัมผสมกับอาหาร 1 กิโลกรัม ให้ปลากินติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน

- *Aeromonas hydrophila*

รูปร่างเป็นแท่งสั้นตรง มีความยาวประมาณ 1.0-1.8 ไมครอน มีแฟลกเจลลัม 1 เส้น ลักษณะกลมผิวเรียบ ตรงกลางโค้งนูน สีขาวนวลอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ บางครั้งอาจอยู่เป็นคู่หรือเป็นสายสั้นๆ

อาการที่พบ รอยขีดแดง เป็นแผลเน่าเปื่อยถ้าเป็นมากครีบจะเปื่อยหลุด สีที่ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ท้องมีอาการบวม น้ำ ภายในมีน้ำเลือดจางๆปนอยู่

การป้องกันรักษา ต้องมันดูแลและรักษาคุณภาพน้ำ หรือคุณสมบัติของน้ำในแหล่งที่เลี้ยงให้อยู่ในสภาพดีเสมอ แต่หากปลาติดเชื้อนี้แล้วให้ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น เทตราไซคลิน คลอแรมเฟนิคอล 2.8-3.0 กรัมผสมกับอาหาร 1 กิโลกรัม ให้ปลากินติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน หรือ นำสารปฏิชีวนะในปริมาณมากกว่าปริมาณที่กำหนดผสมกับน้ำและนำปลามาแช่ในระยะเวลาสั้นซึ่งความเข้มข้นดังกล่าวหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้ปลาตายได้

- *Pseudomonas fluorescense*

มีลักษณะเป็นแท่ง มีขนาดความกว้าง 0.5-1 ไมครอน ความยาว 1.5-4.0 ไมครอน มีเส้น 1 เส้น ใช้เคลื่อนที่ พบได้ทั่วไปในน้ำ ส่วนมากจะอยู่ในน้ำจืดแต่ก็มีพบบ้างในน้ำกร่อยและน้ำเค็ม แบคทีเรียนี้ติดต่อกันทางปาก ผิวหนังที่เป็นบาดแผล หรือเหงือกเมื่อเข้าไปในตัวปลาจะสร้างสารพิษซึ่งจะทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ปลาเป็นโรคนี้นี้เนื่องจากการจัดการของผู้

เลี้ยงไม่ดี คุณสมบัติของน้ำไม่ดี และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ เช่น สารพิษในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง และการขาดสมดุลของอาหารก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้ แบคทีเรียตัวนี้มีการติดต่อกันทางปาก ผิวน้ำที่เป็นบาดแผลหรือเหงือกเมื่อเข้าไปในตัวปลาจะสร้างสารพิษซึ่งจะทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ

อาการที่พบ โคนครีบ ปาก ขากรรไกรล่าง และรอบๆ ทวารเป็นสีแดง ลักษณะภายในเนื้อเยื่อช่องท้อง อวัยวะภายในตกเลือด ในลำไส้มีของเหลวปนเลือด ในกล้ามเนื้ออาจจะตกเลือด

การป้องกันรักษา จัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ให้ปลามีสุขภาพดีอยู่เสมอ ควบคุมปริมาณการให้อาหาร อัตราการปล่อยเลี้ยงอย่าให้แน่นเกินไป คุณภาพน้ำต้องควบคุมให้ดีอยู่เสมอ การให้ยาต้องให้ยาจำพวกต้านจุลชีพ ได้แก่ ออริโอมัยซิน ให้กินในอัตราส่วน 55 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัมต่อวัน ผสมในอาหารให้กินนาน 10 วัน หรืออาจจะละลายน้ำให้มีความเข้มข้น 10-20 ส่วนในล้านส่วน แช่นานตลอดไป หรือ กานามัยซิน ในอัตราส่วน 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัมต่อวัน ผสมในอาหารให้กินนาน 20 วัน

- *Flexibacter columnaris*

รูปร่างเป็นแท่งยาว พันเป็นสายต่อกัน มีขนาดความกว้าง 0.5-0.7 ไมครอน ความยาว 5-150 ไมครอน พบได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย แบคทีเรียชนิดนี้จะเจริญบนผิวของปลาทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "โรคคอล้มเนาริส" ซึ่งปกติโรคนี้จะไม่เกิดขึ้นเองแต่จะเกิดจากปลาได้รับความบอบช้ำหรือบาดเจ็บจากการจับ การขนส่งลำเลียง หรือการถูกรบกวนบ่อยๆ โดยการยกกระชังขึ้นสูง ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสุขภาพของปลาและสายพันธุ์ของแบคทีเรีย ถ้าปลาบอบช้ำมากอัตราการตายของปลาที่เป็นโรคจะสูงขึ้น ปลาที่มีอายุน้อยจะมีโอกาสเป็นโรคและตายมาก มักจะเป็นกับปลาที่มีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป โรคนี้จะเกิดมากในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และอาจเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

อาการที่พบ เริ่มแรกโรคนี้จะเกิดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บบนลำตัว ครีบ และบริเวณส่วนหัว หลังจากนั้นปลาจะอ่อนแอไม่ค่อยกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง เกล็ดหลุด บริเวณแผลจะเป็นชุยขาวๆ เหลืองคล้ายเชื้อรา เป็นแถบแผลพาดตามลำตัว ขอบแผลจะมีลักษณะเป็นสีเทาจางๆ มีเมือกปกคลุมหนามาก บางครั้งจะพบจุดเลือดบริเวณนั้นด้วย

การป้องกันรักษา หลังจากการลำเลียงขนย้ายปลาควรมีการป้องกันโดยแช่ปลาในยาเหลือง ความเข้มข้น 25 ส่วนในล้านส่วน 3 วันติดต่อกัน หากปลาติดเชื้อและเป็นโรคนี้ให้ใช้ฟู

รานเสถียรภาพความเข้มข้น 1.5 ส่วนในล้านส่วน แชนใน 1 ชั่วโมง ถ้ายังไม่หายต้องทำซ้ำติดต่อกันนาน 3 วัน อาจใช้คอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 40 ส่วนในล้านส่วน แชนาน 20 นาที

- *Flavobacterium* sp.

รูปร่างมีตั้งแต่เป็นแท่งสั้นเกือบกลมจนถึงแท่งยาว เคลื่อนที่โดยใช้แฟ้ พบได้ทั่วไปในน้ำจืดและน้ำเค็ม พบทั่วไปบนผิวหนังของปลา ปกติแล้ว *Flavobacteria* จะไม่ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่เมื่อมีบาดแผลหรือเกิดอาการเครียด จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ปลาอ่อนแอ มีความต้านทานน้อยลง *Flavobacteria* sp. จึงเข้าทำอันตรายได้

อาการของโรค มีอาการตกเลือดตามที่ต่างๆภายในจะมีจุดเลือดในเยื่อช่องท้อง เยื่อยึดอวัยวะภายใน อวัยวะภายในและกล้ามเนื้อ ถ้าไล่อาจจะตกเลือด

การป้องกันรักษา ยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอน แต่ควรป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยการควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยง อาหารและคุณภาพน้ำที่ดีจะลดอัตราการเกิดโรคได้

- *Renibacterium* sp.

รูปร่างเป็นแท่ง ไม่เคลื่อนที่ มักจะอยู่เป็นคู่

อาการของโรค ตาขาวขุ่นมัวและโปนออกมาตาอาจบอดได้ ท้องบวมเล็กน้อย หรือมีฝ้าใต้ผิวหนัง อวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ไตและตับ จะมีก้อนสีขาวอยู่ในเนื้อเยื่อ ไตจะแข็งกว่าปกติ สีดำ มีจุดขาวแทรกอยู่เป็นแห่งๆ

การป้องกันรักษา ใช้อีลิโทรมัยซินหรือซัลฟาเมอราซีน ผสมในอาหารให้ปลากินติดต่อกัน การให้ยาอาจใช้เวลานานถึง 2 เดือน ให้ใช้ในปริมาณต่างๆ เพราะอาจเป็นผลให้แบคทีเรียดื้อยาได้

2.2 โพรไบโอติก (Probiotics)

2.2.1 คำจำกัดความของโพรไบโอติก

Gatesoupe(1999) รายงานคำจำกัดความของ "โพรไบโอติก" ที่มีผู้ศึกษาไว้ ดังนี้

Parker (1974) : จุลินทรีย์และสารที่ก่อให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร

- Fuller (1989) : จุลินทรีย์มีชีวิตที่เสริมในอาหารสัตว์แล้วให้ผลดีโดยก่อให้เกิดสมดุลในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ชนิดนั้น
- Tannock (1997) : เชลล์จุลินทรีย์มีชีวิตที่ใช้เสริมลงในอาหารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสุขภาพ

2.2.2 คุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติก

Gatesoupe(1999) รายงานคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเสริมสุขภาพของสัตว์ ดังนี้

- ต่อด้านจุลินทรีย์ก่อโรคในระดับหลอดทดลอง
- มีศักยภาพในการยึดเกาะผนังทางเดินอาหาร
- เพิ่มความต้านทานโรคเมื่อทดลองเหนี่ยวนำให้เกิดโรคในสัตว์เจ้าบ้าน

ส่วน Gilliland (1979) และ Fuller (1989) รายงานหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติก ไว้ดังนี้

- เป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ก่อโรค เป็นสายพันธุ์ที่มีความจำเพาะต่อเซลล์เจ้าบ้านสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่เป็นกรดสูง เช่น ในกระเพาะอาหาร และสามารถทนต่อเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากบริเวณลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการหลั่งน้ำดีจากตับอ่อน

- สามารถเจริญเพิ่มจำนวนและมีเมแทบอลิซึมในระบบทางเดินอาหารได้
- สามารถแข่งขันเข้ายึดเกาะกับจุลินทรีย์ก่อโรคในบริเวณเยื่อทางเดินอาหารได้

- ผลิตรวดอินทรีย์และสารต่อต้านจุลชีพซึ่งมีผลลดจำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคลง
- มีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ ทำให้สัตว์มีการสร้างแอนติบอดีมากขึ้น
- เพาะเลี้ยงได้ง่าย เจริญเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดชีวิตสูง

เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน

- ในกรณีที่ใช้ร่วมกับสารปฏิชีวนะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ควรมีสมบัติต่อสารปฏิชีวนะที่ผสมในอาหารสัตว์ด้วย

Vine et al. (2004) แนะนำเกณฑ์ในการคัดเลือกโพรไบโอติกของสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลองด้วยค่า Ranking Index(RI) ด้วยสูตร $RI=1/(\lambda \times t_d) \times 100$ เมื่อ λ คือ lag period และ t_d คือ ระยะเวลาที่เชื้อเจริญเป็นสองเท่า(doubling time)

2.2.3 การใช้โพรไบโอติกในสัตว์น้ำ

วรรณิกา (2539) ศึกษาการใช้โพรไบโอติกเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้แบคทีเรีย *Bacillus* S11 ที่แยกได้จากลำไส้กุ้งกุลาดำที่มีสุขภาพดีและมีสมบัติเป็นโพรไบโอติก เมื่อทดสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วพบว่าเป็น *Bacillus* sp. โดยใช้อาหารเลี้ยงกุ้งที่ผสมโพรไบโอติก เลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 100 วัน พบว่า กุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารที่ผสม *Bacillus* S11 จะมีการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิตและความต้านทานต่อโรคสูงกว่ากุ้งกุลาดำที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสม *Bacillus* S11 อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ได้ทดสอบการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *Vibrio harveyi* D331 พบว่าหลังจากการเลี้ยง 10 วันกุ้งกุลาดำในกลุ่มควบคุมมีอัตราการรอดชีวิต 26 % แต่กุ้งกุลาดำในกลุ่มที่มีการเติม *Bacillus* S11 มีอัตราการรอดชีวิต 100%

Nikoskelainen et al.(2001) รายงานการใช้ *Lactobacillus rhamnosus* ซึ่งมีสมบัติเป็นโพรไบโอติกในคนป้องกันโรค furunculosis ซึ่งมีสาเหตุมาจาก *Aeromonas salmonicida* ใน rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) พบว่า ที่ความเข้มข้นของ *Lactobacillus rhamnosus* 10^9 เซลล์/มล. มีเปอร์เซ็นต์การตาย 18.9 % ความเข้มข้น 10^{12} เซลล์/มล. มีเปอร์เซ็นต์การตาย 46.3 % และกลุ่มควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การตาย 52.6 %

Nikoskelainen et al.(2001) ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของแบคทีเรียที่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นโพรไบโอติกในคน 6 สายพันธุ์ ซึ่งได้แก่ *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 53103 / *Lactobacillus casei* Shirota / *Lactobacillus bulgaricus* / *Lactobacillus rhamnosus* LC 705 / *Bifidobacterium lactis* Bb 12 / *Lactobacillus johnsonii* La 1 และ ในสัตว์ 1 สายพันธุ์ คือ *Enterococcus faecium* Tehobak เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดโรคซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 สายพันธุ์ ได้แก่ *Vibrio anguillarum* / *Flavobacterium psychrophilum* และ *Aeromonas salmonicida* ใน rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) ด้วยเทคนิค *in vitro* ติดตามผลการยึดติดบนเมือก การเจาะทะลุเมือก การยับยั้งการเจริญและการยึดติดของแบคทีเรียก่อโรคด้วยการติดฉลากสารกัมมันตรังสี [methyl-1,2- 3 H]thymidine บนแบคทีเรียที่สนใจ นอกจากนี้ยังหาความสามารถในการต้านทานต่อน้ำดีอีกด้วย พบว่า โพรไบโอติกมีความสามารถในการยึดติดและเจาะทะลุเมือกของ rainbow trout ได้ดี มีความสามารถในการยับยั้งและยึดติดกับเมือกของ rainbow trout ได้ดีกว่าแบคทีเรียก่อโรค และต้านทานต่อน้ำดีได้ดีกว่าแบคทีเรียก่อโรคเช่นกัน

Gatesoupe(2002) รายงานการใช้โพรไบโอติก Bactocell (*Pediococcus acidilactici*), Levucell (*Saccharomyces cerevisiae*) และฟอर्मิลดีไฮด์ในการลดปริมาณ *Vibrio*

alginoliticus ใน *Artemia nauplii* เพื่อให้ในการเลี้ยง pollack วัยอ่อน พบว่า เมื่อนำ *Artemia* ไปฝักตัวในน้ำที่มีฟอร์มาลดีไฮด์ปริมาณ 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร อัตราการฝักตัวของ *Artemia* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นนำ *Artemia* ที่ฝักตัวในน้ำที่มีฟอร์มาลดีไฮด์ปริมาณ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ไปเลี้ยง Pollack (*Pollachius pollachius*) ติดต่อกันนาน 3 เดือน ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางพันธุกรรมของ *Vibrio alginolyticus* เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อนำ *Artemia* ที่ฝักตัวในโพไบโอติกไปเลี้ยง pollack วัยอ่อน สามารถทำให้ปลา มีน้ำหนักมากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่ง *Artemia* ไม่ได้ฝักตัวในโพไบโอติก

Villamil et al.(2003) รายงานการควบคุม *Vibrio alginolyticus* ใน *Artemia* ด้วยโพไบโอติกแบคทีเรีย พบว่า *Lactobacillus brevis* สามารถกำจัด *Vibrio alginolyticus* ในน้ำเลี้ยง *Artemia* ได้ทั้งหมด ส่วนใน *Artemia* มี 2 สายพันธุ์ที่สามารถกำจัด *Vibrio alginolyticus* ได้ทั้งหมด คือ *Lactobacillus casei* และ *Lactobacillus brevis* เมื่อทดสอบผลของ extracellular products ของทั้ง 6 สายพันธุ์ที่ศึกษา พบว่า ทั้ง 6 สายพันธุ์ ซึ่งได้แก่ *Lactobacillus helveticus* / *Lactobacillus casei* / *Lactobacillus brevis* / *Lactobacillus mesenteroides* / *Lactobacillus lactis* และ *Lactobacillus acidilactici* สามารถทำให้จำนวน *Vibrio alginolyticus* ลดลงได้

ศิริเพ็ญ(2546) รายงานการใช้ *Bacillus* P11 ผสมในอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นระยะเวลา 100 วัน พบว่า กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม *Bacillus* P11 มีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และสามารถพบเซลล์แบคทีเรียรูปแท่งคล้าย *Bacillus* ที่บริเวณผนังลำไส้กุ้งในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม *Bacillus* P11 ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเมื่อเหนี่ยวนำให้กุ้งเกิดโรคด้วย *Vibrio harveyi* 639 พบว่า กุ้งในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม *Bacillus* P11 สามารถต้านทานโรคได้ดีกว่ากุ้งในกลุ่มควบคุม

2.3 แลกติกแอซิดแบคทีเรีย

2.3.1 ข้อมูลทั่วไปและการจัดจำแนก

แลกติกแอซิดแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลและมีสกุลใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Sillanpaa, 2001) โดยทั่วไปมีรูปร่างท่อนและกลม มีการจัดเรียงตัวทั้งแบบคู่, สี่, กลุ่มหรือสายโซ่ยาว ติดสีแกรมบวก ไม่เคลื่อนที่ ไม่มีไซโทโครม ไม่สร้างสปอร์ ค่ะตะเลสลบ ต้องการอากาศเพียงเล็กน้อยหรือบางชนิดไม่ต้องการอากาศ ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการหมักคือกรดแลกติก ต้องการสารอาหารที่ซับซ้อน ต้องการคาร์โบไฮเดรต กรดอะ

มิโน เปปไทด์ อนุพันธ์ของกรดนิวคลีอิกและวิตามินต่างๆ(Ringo et al., 1998) สามารถพบได้ตามธรรมชาติทั่วไป เช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์ ในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์(พงษ์เทพ, 2546)

แลกติกแอซิดแบคทีเรียสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการหมักได้เป็น 2 กลุ่ม(ฐิติพงศ์, 2538) คือ Homofermentative Lactic Acid Bacteria ได้แก่ แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถหมักน้ำตาลกลูโคส หรือ น้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 ตัว ให้กรดแลกติก 85-95 % ส่วนที่เหลืออาจนำไปใช้เพื่อให้อพลังงาน และ Heterofermentative Lactic Acid Bacteria ได้แก่ แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถหมักน้ำตาลกลูโคส หรือ น้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 ตัว ให้กรดแลกติกประมาณ 50 % ส่วนที่เหลือเป็นกรดอะซิติกและเอทิลแอลกอฮอล์ 20-25 % และสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ 20-25 %

การจำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียสามารถใช้ลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางชีวเคมี ลักษณะสัณฐานวิทยา องค์ประกอบของผนังเซลล์ กรดไขมันภายในเซลล์ G+C(โมล%)ในDNA รวมถึงระดับย่อย คือ ระดับ rRNA ได้(Christensen et al., 1999) และในปัจจุบันมีการนำเทคนิคในระดับโมเลกุลมาใช้ในการจำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียอย่างกว้างขวาง(Sillanpaa, 2001) มีรายงานการจัดจำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียไว้แตกต่างกัน ดังนี้

Ringo (1997) จำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียได้ 8 สกุล ดังนี้ *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Aerococcus*, *Enterococcus*, *Vagococcus*, *Lactobacillus* และ *Carnobacterium*

Axelsson(1998) จำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียได้ 12 สกุล ได้แก่ *Aerococcus*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, *Streptococcus* และ *Weissella*

Sillanpaa(2001) รายงานเกี่ยวกับการจำแนกแลกติกแอซิดแบคทีเรียไว้ 13 สกุล โดย 12 สกุลแรกนั้นเหมือนกับที่ Axelsson(1998) ได้รายงานไว้ แต่เพิ่ม *Streptococcus sensu stricto* ขึ้นมาอีก 1 สกุล

2.3.2 แลกติกแอซิดแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารปลา

แลกติกแอซิดแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่พบมากในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมีรายงานว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้มีสมบัติเป็นโพรไบโอติก(Ouwehand et al., 1999, Nikoskelainen et al., 2001) ในปลาก็เช่นเดียวกัน มีรายงานหลายฉบับรายงานเกี่ยวกับแลกติกแอซิดแบคทีเรียว่าเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ในระบบทางเดินอาหารของปลาและมีสมบัติเป็นโพรไบโอติกด้วย (Gildberg et al., 1995; Gildberg et al., 1998 และ Gatesoupe, 1999) แต่แบคทีเรียในทางเดินอาหารปลาจะเป็นแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คุณภาพน้ำเลี้ยง และอาหาร

Hagi et al.(2004) รายงานความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของแลกติกแอซิดแบคทีเรียในฤดูกาลต่างๆ ในลำไส้ของปลา 4 ชนิด ได้แก่ silver carp(*Hypophthalmichthys molitrix*), common carp(*Cyprinus carpio*), channel catfish(*Ictalurus punctatus*)และ deepboied crucian carp(*Carassius cuvieri*) ที่เลี้ยงใน Kasumigaura Lake ประเทศญี่ปุ่น พบว่า สายพันธุ์ของแลกติกแอซิดแบคทีเรียจะโดดเด่นแตกต่างกันตามฤดูกาล กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคม 2001 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อน(อุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส) พบ *Lactococcus lactis* จำนวนมากในลำไส้ของปลาทุกชนิด และในเดือนธันวาคม 2001 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาว(อุณหภูมิของน้ำ 4-10 องศาเซลเซียส) พบ *Lactococcus raffinolactis* จำนวนมากในปลาทุกชนิด เมื่อทำการทดลองในช่วงเวลาเดียวกันในปีถัดมาก็ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน ส่วนในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง(อุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 13-17 องศาเซลเซียส) สายพันธุ์ของแลกติกแอซิดแบคทีเรียในลำไส้ของปลาจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไม่มีสายพันธุ์ใดโดดเด่น

2.3.3 สารยับยั้งการเจริญที่ผลิตโดยแลกติกแอซิดแบคทีเรีย

2.3.3.1 กรดอินทรีย์

กรดอินทรีย์ที่แลกติกแอซิดแบคทีเรียสร้างขึ้นระหว่างการเจริญ ทำให้ค่า pH ลดลงในช่วงแรกของการเจริญ มีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มไม่ทนกรด เช่น *Bacillus* sp., *Escherichia coli*, *Salmonella* sp., *Pseudomonas* sp. เป็นต้น กรดอินทรีย์มีผลยับยั้งกระบวนการเมแทบอลิซึมที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ โดยการเกิดปฏิกิริยากับเซลล์หรือหนองเหนียวการเจริญของจุลินทรีย์นั้น(Fuller, 1989)

2.3.3.2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

แลกดิกแอซิดแบคทีเรียสามารถสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(H_2O_2) ระหว่างการเจริญได้โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยงในเซลล์ที่มีอากาศโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สร้างจะถูกสะสมไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการเจริญเนื่องจากแลกดิกแอซิดแบคทีเรียขาดเอนไซม์คะตะเลส ทำให้ไม่สามารถคะตะเลสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้อย่างกว้างขวาง เช่น *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas* spp. เป็นต้น (Mayra and Bigret, 1993)

2.3.3.3 ไดอะซีทิล

ไดอะซีทิล (2,3-butanedione) เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สร้างมาจากไพรูเวท เป็นสารที่มีกลิ่นหอม สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งยีสต์และแบคทีเรียแกรมลบ เช่น *Listeria monocytogenes*, *L. ivanovi*, *L. innocua*, *Salmonella* Anatum, *S. Typhimurium*, *Yersinia enterocolitica*, *Escherichia coli* และ *Aeromonas hydrophila*(Jay, 1982)

2.3.3.4 คาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลผลิตส่วนใหญ่ที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำตาลแบบ heterofermentation โดยแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนในสภาวะแวดล้อมรอบๆ ทำให้เกิดสภาวะ anaerobe ซึ่งไม่เหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการใช้ออกซิเจน โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อรา นอกจากนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในเซลล์และรอบๆเซลล์ลดลงมีผลทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลาย(พงษ์เทพ, 2546)

2.3.3.5 อะซีทัลดีไฮด์

เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตแบบ heterofermentative ของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียในสภาวะที่ไม่มีเอนไซม์ alcohol dehydrogenase ทำให้เกิดการสร้างและขับอะซีทัลดีไฮด์ออกมาภายนอกเซลล์ โดยผลของอะซีทัลดีไฮด์ต่อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนั้นยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยมากนัก เพียงแต่มีรายงานว่าอะซีทัลดีไฮด์ที่มีความเข้มข้นระหว่าง 10-100 ส่วนในล้านส่วน สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้ (พงษ์เทพ, 2546)

2.3.3.6 แบคเทอริโอซิน

แบคเทอริโอซินจัดเป็นสารต้านจุลชีพ(Antimicrobial substance)(De Vuyst and Vandamme, 1994) มีโครงสร้างเป็นสายเปปไทด์หรือโปรตีนขนาดเล็กซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่มีความไวต่อสารดังกล่าวแต่ไม่ทำลายหรือเป็นพิษต่อเซลล์ที่ผลิต โดยแบ

คเทอริโอซินแต่ละชนิดจะมีจำนวนและชนิดของกรดอะมิโนภายในโมเลกุลที่แตกต่างกัน ในบางครั้งอาจพบกรดอะมิโนที่ไม่พบในโปรตีนทั่วไป เช่น พบ dehydroalanine และ dehydrobutyrine ในไนซิน ซึ่งเป็นแบคเทอริโอซินชนิดหนึ่ง นอกจากนี้แบคเทอริโอซินยังถูกทำลายได้ด้วยเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน(proteolytic enzyme) โดยแบคเทอริโอซินจัดเป็นสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่มีความแตกต่างจากสารปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างแบคเทอริโอซินและสารปฏิชีวนะไว้ในตารางที่ 1



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างแบคทีเรียโพรไบโอติกและสารปฏิชีวนะ

ลักษณะและคุณสมบัติ	แบคทีเรียโพรไบโอติก	สารปฏิชีวนะ
การนำไปใช้งาน	ทางอาหาร	ทางการแพทย์
กระบวนการสังเคราะห์	ผลิตจากโพรไบโอติก	ผลิตผ่าน secondary metabolite
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียเป้าหมายที่หลากหลาย	น้อย	มาก
การสร้างระบบภูมิคุ้มกันตนเองของเซลล์ผู้ผลิต	มี	ไม่มี
การต่อต้านของเซลล์เป้าหมาย	ปรับสภาพองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์	การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ปฏิกิริยาต่อเซลล์เป้าหมาย	ทำให้เกิดรูที่เยื่อหุ้มเซลล์	ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์หรือโครงสร้างภายในเซลล์
ความเป็นพิษของผลข้างเคียง	ยังไม่มีรายงาน	มี

ที่มา : พงษ์เทพ, 2546

2.3.4 กลไกการออกฤทธิ์ของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (คณิงนิจ, 2540)

2.3.4.1 เมื่อสัตว์กินจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกเข้าไปแบคทีเรานั้นจะแพร่พันธุ์และเกาะผนังทางเดินอาหารเป็นผลให้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเกาะผนังลำไส้ยากขึ้น

2.3.4.2 แลคติกแอซิดแบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลให้ค่า pH ในระบบทางเดินอาหารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลดังกล่าวไม่เหมาะกับการยึดเกาะและเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

2.3.4.3 การสร้างเอนไซม์ แบคทีเรียบางชนิด เช่น Lactobacilli สร้างแล็กเทสและอะไมเลส ทำให้ได้รับเอนไซม์มากขึ้นเป็นผลทำให้การย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยมีการทำงานแบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis ของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหาร

2.3.4.4 การสร้างวิตามินบี จุลินทรีย์ที่เป็นโพรไบโอติกสามารถสร้างวิตามินบีหลายชนิดในทางเดินอาหาร ทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์ดีขึ้น เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอะมิโน การสร้างโปรตีน และยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทส่วนกลาง

2.3.4.5 การสร้างสารต้านจุลชีพ มีผู้พบสารต้านจุลชีพหลายชนิดจากสายพันธุ์ที่แน่นอนของ *Lactobacilli* และ *Streptococci* ดังนี้ Acidophilin, Lactocidin, Acidolin, Lactolin, Nisin and diplococcin

2.3.4.6 การเปลี่ยนจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร โดยเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ตั้งแต่แรกเกิดเพื่อปรับจุลินทรีย์ประจำถิ่นในทางเดินอาหาร เป็นการช่วยควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค

2.3.4.7 การแข่งขันเพื่อยับยั้งการออกฤทธิ์ ในปี 1988 และปี 1989 Stark และ Wilkinson ได้วิจัยการแข่งขันการเกาะ การจับและการก่อตัวในทางเดินอาหารของสุกรและไก่ของ *Lactobacilli* และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทางเดินอาหาร พบว่า *Lactobacilli* จะแย่งจับและก่อตัวในทางเดินอาหารทำให้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคไม่สามารถเกาะหรือก่อตัวในทางเดินอาหาร หรือป้องกันการเกาะตัวโดยตรงต่อเซลล์ทางเดินอาหารยับยั้งการออกฤทธิ์ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทำให้สัตว์มีสุขภาพดี

2.3.4.8 กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (Non-specific Immunomodulator) ในลูกสุกรที่ให้กิน *Lactobacilli* พบว่า *Lactobacilli* จะทำหน้าที่เหมือนตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบางชนิดในทางเดินอาหาร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนินการศึกษา

แลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากระพงขาว

Lates calcarifer

3.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

3.1.1 วัสดุอุปกรณ์

- เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) รุ่น Centrikon T-42K ของบริษัท Kontron Instrument., Germany
- เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) รุ่น J2-21 ของบริษัท Beckman, USA
- เครื่องวัดค่าพีเอช (pH meter) HANNA instruments รุ่น HI 8424
- เครื่องผสมสาร (Vortex mixer) รุ่น G560E ของบริษัท Scientific Industries, Inc., Switzerland
- หม้ออบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) รุ่น HA-36 ของบริษัท Hirayama Manufacturing Corporation, Japan
- ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) รุ่น RO-8 ของบริษัท Memmert, Western Germany
- เครื่องเขย่า (Shaker)
- เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น A200S บริษัท Sartorius, Germany
- ชุดเครื่องมือทำอะกาโรสเจลอิเล็กโทรไฟรีซิส ของบริษัท Biorad, USA
- เครื่องส่องเจลด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต ของบริษัท Biorad, USA
- ชุดทดสอบความเป็นด่าง AQUA-VBC ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชุดทดสอบไนโตรท, ไนเตรท, ฟอสเฟต และ แอมโมเนียรวม ของบริษัท SERA, Germany

3.1.2 เคมีภัณฑ์

- อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวแลกโตแบซิลไล เอ็ม อาร์ เอส (Lactobacilli MRS broth) ของบริษัท Difco Laboratories, USA

- อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวทริปติกชอย (Tryptic soy broth) ของบริษัท Difco Laboratories, USA
- อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งทริปติกชอย (Tryptic soy Agar) ของบริษัท Difco Laboratories, USA
- อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งไทโอซัลเฟตซิเตรทบายซอลท์ (Thiosulfate citrate bile salt agar) ของบริษัท Difco Laboratories, USA

3.1.3 สารเคมีสำหรับการศึกษา Immunohistochemistry

- เอทิลแอลกอฮอล์ 70, 80, 90 และ 95 %(ปริมาตร/ปริมาตร)
- นอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์
- ไซลีน
- ฟอร์มัลดีไฮด์
- 0.15 โมลาร์ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.2
- สารละลาย P₁⁺ (calf bovine serum:PBS dilution 1:10)
- ไดอะมิโนเบนซีนเตตระไฮโดรคลอไรด์
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 %(ปริมาตร/ปริมาตร)
- อีโอซิน 0.02 %(น้ำหนัก/ปริมาตร)
- ฮีมาทอกไซลีน
- พาราพลาส พลัส พาราฟิน
- สารละลายเคลือบสไลด์เจลาติน
- Davidson's fixative
- โซเดียมไฮดรอกไซด์
- กรดไฮโดรคลอริก
- เปอร์เม้าท์
- โมโนโคลและโพลีโคลต่อ *Aeromonas hydrophila* เอื้อเฟื้อจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3.1.4 สารเคมีสำหรับการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 16S rDNA

- โซเดียมคลอไรด์ 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร)
- บัฟเฟอร์ TE
- Tris-HCl
- อะกาโรสเจล
- บัฟเฟอร์ TBE
- สารละลายเอทีเอ็มโบรไมด์
- สารละลาย dNTP

3.2 วิธีดำเนินการทดลอง

3.2.1 การคัดแยกแลกติกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว

นำปลากะพงขาวที่จับได้จากธรรมชาติและจากฟาร์มเลี้ยงแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดสดสามย่าน ตลาดสดมหาชัย กระชังเพาะเลี้ยงปลาในจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร บ่อเลี้ยงในจังหวัดสมุทรสาคร สะพานปลาในจังหวัดตรัง ขนาด 3-5 กิโลกรัม มาตัดทางเดินอาหารโดยวิธีปลอดเชื้อ จากนั้นนำทางเดินอาหารมาผ่าออกเพื่อเปิดทางเดินอาหาร ใส่ลงในอาหารเหลว MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง แล้วนำมากระจายเชื้อในอาหารแข็ง MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) และบรอมเคอเรลเพอเพิล เป็นอินดิเคเตอร์ สังเกตโคโลนีที่มีสีเหลือง เลือกโคโลนีเหล่านั้นมาซิดแยกบนอาหารแข็ง MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อให้ได้แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่บริสุทธิ์

3.2.2 คัดเลือกแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ

3.2.2.1 การเตรียมส่วนใสที่ได้จากแลกติกแอซิดแบคทีเรีย

นำแลกติกแอซิดแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตที่แยกได้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำมาปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ด้วยความเร็ว 8,000 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที นำส่วนใสที่ได้มาผ่านแผ่นกรอง (Millipore Membrane Filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร แบ่ง

ส่วนใสที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับ pH และนำส่วนที่สองมาปรับ pH ให้ได้ 6.5 โดยใช้ 1.0 นอร์มัล โซเดียมไฮดรอกไซด์

3.2.2.2 การเตรียมเชื้อทดสอบ

เชื้อทดสอบที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrionaceae ได้แก่ *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Vibrio fluvialis* และ *Aeromonas hydrophila* เพราะเลี้ยงในอาหารเหลวทริปติกชอยที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บนเครื่องเขย่า ความเร็ว 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นนำแต่ละเชื้อมาปรับความขุ่นให้มีค่าการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร เท่ากับ 0.5 ใช้สำลีพันปลายไม้ swab เชื้อบนอาหารแข็งทริปติกชอยที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ใช้ที่เจาะวุ้นเบอร์ 4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร) เจาะลงบนวุ้นเพาะเชื้อจำนวน 4 หลุม/จานเลี้ยงเชื้อ โดยให้แต่ละหลุมห่างกันพอสมควรหยดส่วนใสที่ได้จากข้อ 2.1 หลุมละ 100 ไมโครลิตร นำจานเพาะเชื้อไปไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปป่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง

3.2.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย

3.2.3.1 ลักษณะการเจริญบนอาหารแข็ง (Cultural Characteristics)

ศึกษาลักษณะและสีของโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) เมื่อป่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.2.3.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological Characteristics)

ศึกษาการย้อมสีแกรมดูการติดสี รูปร่าง ขนาด และการจัดเรียงตัว ด้วยกล้องจุลทรรศน์

3.2.3.3 ลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical Characteristics) ดังต่อไปนี้

- ความสามารถในการสร้างเอนไซม์อะไมเลส (ภาคผนวก ค. หมายเลข 2)
- คุณสมบัติการเป็นแลกดิกแอซิดแบคทีเรียประเภท Homofermentative หรือ Heterofermentative (ภาคผนวก ค. หมายเลข 3)

- ความสามารถในการหมักคาร์โบไฮเดรตบางชนิดโดยใช้น้ำตาลทดสอบ (ภาคผนวก ค. หมายเลข 9)

3.2.3.4 ศึกษาการเจริญของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารที่มีเกลือระดับความเข้มข้นต่างๆ

สังเกตการเจริญของเชื้อโดยใช้อาหารเหลว MRS ที่มีเกลือ (NaCl) ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) pH 6.5-6.8 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยการติดตามดูความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อและการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จากสีม่วงเป็นสีเหลือง(ภาคผนวก ค. หมายเลข 10)

3.2.3.5 ศึกษาการเจริญของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารที่มีเกลือ น้ำตาลระดับความเข้มข้นต่างๆ

สังเกตการเจริญของเชื้อโดยใช้อาหารเหลว MRS ที่มีเกลือ น้ำตาลความเข้มข้น 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) pH 6.5-6.8 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยการติดตามดูความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อและการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์จากสีม่วงเป็นสีเหลือง (ภาคผนวก ค. หมายเลข 11)

3.2.4. การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก (Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว

3.2.4.1 วิเคราะห์ส่วนประกอบแต่ละส่วนของอาหารปลา

หาระดับโปรตีนและไขมันในส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ ปลาป่น, แป้งสาลี, กากถั่วเหลือง, กลูเตน (Wheat gluten), เปลือกกุ้งป่น จากนั้นทำการคำนวณเพื่อให้ได้ระดับโปรตีนและไขมันตามสูตรอาหารที่ต้องการ (Boonyaratpalin, 1997)

3.2.4.2 ผสมส่วนประกอบต่างๆให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม

ผสมปลาเป็ดบด, ปลาป่น, เปลือกกุ้งป่น, กากถั่วเหลือง ให้เข้ากัน แล้วนำแป้งสาลีและกลูเตนที่ละลายในน้ำอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มาผสมให้เข้ากันอีกครั้ง รอให้เย็น จากนั้นเติมน้ำมันทูน่า, น้ำมันพืช, วิตามินรวม, แร่ธาตุรวม, วิตามินซี (Ascorbic acid) และน้ำ นำเข้าเครื่องผสม

3.2.4.3 อัดอาหารปลาด้วยเครื่องอัดอาหารผสมแบบเปียก

นำอาหารที่ได้จากข้อ 4.2 เข้าเครื่องบดเนื้อที่มีรูน้หน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร จะได้อาหารผสมแบบเปียก เก็บอาหารที่ได้ ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์หาระดับความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, เถ้า, โยเยื่อและคาร์โบไฮเดรต ที่ฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.5 การหาค่าความเข้มข้นของเชื้อทดสอบที่ทำให้ปลาตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (Median Lethal concentration; LC_{50}) ตามวิธีของสมบัติ, 2542

3.2.5.1 การเตรียมเชื้อทดสอบ

เลี้ยง *A. hydrophila* ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวทริปติกชอย ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บนเครื่องเขย่า ความเร็ว 200 รอบ/นาที นาน 18 ชั่วโมง หาจำนวน *A. hydrophila* ใน 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธี Total plate count โดยใช้อาหารแข็งทริปติกชอย ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) เพื่อใช้คำนวณจำนวนเซลล์ที่ต้องการในน้ำเลี้ยงปลา

3.2.5.2 ทดสอบหาความเข้มข้นที่ทำให้ปลาตาย 50 %

แบ่งปลากะพงขาวอายุ 30 วัน จำนวน 360 ตัว ใส่ตู้กระจกที่บรรจุน้ำ 20 ลิตร ความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน ให้อากาศตลอดเวลา เลี้ยงตู้ละ 30 ตัว จำนวน 12 ตู้ แยกเป็น 4 กลุ่ม ทดลอง กลุ่มละ 3 ตู้ เติม *A. hydrophila* ที่เตรียมได้จากข้อ 5.1 ลงในน้ำเลี้ยงปลาปรับให้มีความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับใน 3 กลุ่มทดลอง และอีก 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มควบคุมไม่มีการเติม *A. hydrophila* เก็บตัวอย่างน้ำจากทุกตู้หลังเติม *A. hydrophila* เพื่อหาจำนวน *A. hydrophila* ที่แน่นอนในน้ำ ด้วยวิธี Total plate count โดยใช้อาหารแข็งทริปติกชอย ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร)

ตลอดการทดลองปลาทุกกลุ่มการทดลองจะได้รับอาหารที่เตรียมได้จากข้อ 4 วันละ 2 ครั้ง บันทึกจำนวนปลาที่ตายในแต่ละกลุ่ม ที่เวลา 0, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง นำข้อมูลไปคำนวณหา LD_{50} โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โพรบิทอะนาลิซิส (probit analysis)

3.2.5.3 ตรวจหา *Aeromonas hydrophila* ในปลาที่ตาย

นำปลาที่ตายมาล้างด้วยน้ำเกลือปลอดเชื้อ 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) (NSS 0.85 %) ตีปนด้วยเครื่อง Stomacher ในอัตราส่วนปลาต่อ NSS 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) เท่ากับ 1:9 ทำการเจือจางลำดับส่วน (10-fold dilution) และใช้วิธี plate count โดยใช้อาหารแข็งทริปติกชอย ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร)

3.2.6 การผสมแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อใช้เลี้ยงในตู้กระจก

3.2.6.1 เตรียมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย

เชื้อโคโลนีเดี่ยวของแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้มาเพาะในอาหารเหลว MRS ที่มี โซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

3.2.6.2 ผสมเซลล์แลกติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารปลากะพงขาว

ผสมเซลล์สดที่เตรียมได้จากข้อ 6.1 กับอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวให้ได้ปริมาณเซลล์ประมาณ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร

3.2.6.3 ตรวจนับปริมาณเซลล์ที่มีชีวิตในอาหารปลากะพงขาว

(จากข้อ 6.2)

นำอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว 1 กรัม มาแขวนลอยใน NSS 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เจือจางตามลำดับนำค่าการเจือจางที่เหมาะสม 0.1 มิลลิลิตร มากระจายเชื้อบนอาหารแข็ง MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจนับจำนวนเซลล์มีชีวิต

เก็บอาหารที่ได้ ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์หาระดับความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, เถ้า, โยเยื่อและคาร์โบไฮเดรต ที่ฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจก

เลี้ยงปลากะพงขาวอายุ 30 วัน ในตู้กระจกที่บรรจุน้ำ 20 ลิตร ความเค็ม 20 ส่วนในพัน ส่วน ให้อากาศตลอดเวลา เลี้ยงตู้ละ 20 ตัว ปรับสภาพปลาก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ การทดลอง แบ่งเป็น 6 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 2 ซ้ำ ได้แก่ กลุ่มควบคุม เลี้ยงปลากะพงขาวโดยให้อาหารที่ไม่มี การผสมแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย และ กลุ่มทดลองที่ 1-5 เลี้ยงปลากะพงขาวโดยให้อาหารที่ผสม ด้วยแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้ โดยทุกกลุ่มเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย ความเข้มข้น 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร ทุกกลุ่มทดลองให้อาหารวันละ 2 ครั้ง โดยให้อาหารครั้งละ 10 % (น้ำหนักอาหารแห้ง/น้ำหนักปลา) ทำการบันทึกผลการทดลองทุก 15 วัน โดยติดตาม น้ำหนัก, ความยาวของปลา, แบคทีเรียและคุณภาพน้ำในน้ำเลี้ยงปลา เปรียบเทียบน้ำหนักและ ความยาวของปลากะพงขาวทุกกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ANOVA และ Duncan's multiple range test

3.2.8 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการ เหนียวน้ำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila*

เลี้ยงแบคทีเรียก่อโรค *A. hydrophila* ในอาหารเหลวทริปติกชอยที่มีโซเดียมคลอไรด์ 2 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บนเครื่องเขย่า ความเร็ว 200 รอบ/นาที นาน 18 ชั่วโมง นำมาทดสอบความ ต้านทานต่อการเกิดโรคโดยวิธีแช่ (Immersion challenge) ใช้ *A. hydrophila* ความเข้มข้น 10^7 เซลล์/มิลลิลิตร เติมนลงในตู้เลี้ยงปลาทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยปลาที่ใช้ทดสอบได้จาก การรวบรวมปลาที่รอดชีวิตจากการเลี้ยงในข้อ 7 ทดสอบเป็นระยะเวลา 7 วัน ติดตามจำนวนปลาที่ รอดชีวิตวันละ 1 ครั้ง, แบคทีเรียในน้ำและในทางเดินอาหาร, อาการของปลาและยืนยันว่าปลาติดเชื้อ *A. hydrophila* ด้วยวิธี plate count (เช่นเดียวกับข้อ 5.2)

3.2.9 การผสมแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้กับอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อใช้เลี้ยงในกระชัง

3.2.9.1 เตรียมแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย

เชื้อโคโลนีเดี่ยวของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้มาเพาะในอาหารเหลว MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 0.4 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่ 37 องศา เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการขยายขนาดการเลี้ยงแลกดิกแอซิดแบคทีเรียใน อาหารเหลว MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 0.4 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ปริมาตร 500 มิลลิลิตร บ่มที่ 37

องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

3.2.9.2 ผสมเซลล์แลกติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารปลากระพงขาว

ผสมเซลล์สดที่เตรียมได้จากข้อ 9.1 กับอาหารเลี้ยงปลากระพงขาวให้ได้ปริมาณเซลล์ประมาณ 10^5 , 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร

3.2.9.3 ตรวจนับปริมาณเซลล์ที่มีชีวิตในอาหารปลากระพงขาว

(จากข้อ 9.2)

นำอาหารเลี้ยงปลากระพงขาว 1 กรัม มาแขวนลอยใน NSS 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เจือจางตามลำดับนำค่าการเจือจางที่เหมาะสม 0.1 มิลลิลิตร มากระจายเชื้อบนอาหารแข็ง MRS ที่มีไรโบเดียมคลอไรด์ 0.4 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจนับจำนวนเซลล์มีชีวิต เก็บอาหารที่ได้ ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์หาระดับความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, เถ้า, โยเยื่อและคาร์โบไฮเดรตที่ฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.10 การเลี้ยงปลากระพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชัง

3.2.10.1 สถานที่เลี้ยง

เลี้ยงในบ่อเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ที่ตำบล บึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ความเค็มของน้ำในบ่อ 4 ส่วนในพันส่วน โดยใช้วงไนลอนสีฟ้าขนาดตา 1 มิลลิเมตร ขนาด $1.5 \times 1.5 \times 1.0$ เมตร สูงจากก้นบ่อ 0.5 เมตร ทั้งหมด 18 กระชัง

3.2.10.2 การเลี้ยงปลาในกระชัง

เลี้ยงปลากระพงขาวอายุ 60 วัน กระชังละ 60 ตัว ปรับสภาพปลาก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ การทดลองแบ่งเป็น 3 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 6 ซ้ำ ได้แก่ กลุ่มควบคุม เลี้ยงปลากระพงขาวด้วยอาหารที่ไม่ผสมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย กลุ่มทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากระพงขาวด้วยอาหารที่ผสมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย 10^5 เซลล์/กรัมอาหาร(LAB-4/5) และกลุ่มทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากระพงขาวที่ผสมแลกติกแอซิดแบคทีเรีย 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร(LAB-4/7) ทุกกลุ่มทดลองให้

อาหารวันละ 2 ครั้ง โดยให้อาหารครั้งละ 10 % (น้ำหนักอาหารแห้ง/น้ำหนักปลา) ทำการบันทึกผล การทดลองทุก 15 วัน โดยติดตามน้ำหนัก, ความยาวของปลา, แบบที่เรียและคุณภาพน้ำในน้ำ เลี้ยงปลา เปรียบเทียบน้ำหนักและความยาวของปลากะพงขาวทุกกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ผลทาง สถิติโดยใช้ ANOVA และ Duncan's multiple range test

3.2.11 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการ เหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila*

เลี้ยงแบบที่เรียก่อโรค *A. hydrophila* ในอาหารเหลวทริปติกชอยที่มีโซเดียมคลอไรด์ 0.4 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บนเครื่องเขย่า ความเร็ว 200 รอบ/นาที นาน 18 ชั่วโมง เหยียงแยกเซลล์ ที่ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาทีแล้วล้างเซลล์ด้วย NSS 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) นำมาทดสอบความต้านทานต่อการเกิดโรคโดยวิธีฉีดเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal injection challenge) ให้ *A. hydrophila* ความเข้มข้น 10^7 เซลล์/มิลลิลิตร โดย ปลาที่ใช้ทดสอบได้จากการรวบรวมปลาที่รอดชีวิตจากการเลี้ยงในข้อ 10 ทดสอบเป็นระยะเวลา 7 วัน ติดตามจำนวนปลาที่รอดชีวิตวันละ 1 ครั้ง, แบบที่เรียในน้ำและในทางเดินอาหาร, อาการของ ปลาและยืนยันว่าปลาดิตเชื้อ *A. hydrophila* ด้วยเทคนิค Immunohistochemistry

3.2.12 การตรวจดูแบบที่เรียในทางเดินอาหารปลากะพงขาว โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

เมื่อเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ครบ 60 วันแล้ว เก็บตัวอย่างปลาทั้ง 3 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มควบคุม กลุ่ม LAB-4/5 และ LAB-4/7 มาส่งดูแบบที่เรียในทางเดินอาหารเพื่อตรวจหา LAB-4 โดยส่งตรวจที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีเตรียมตัวอย่างเพื่อ ศึกษาด้วย SEM มีดังนี้

3.2.12.1 การเก็บตัวอย่างและการรักษาตัวอย่าง

นำตัวอย่างทางเดินอาหารส่วนลำไส้เล็กของปลาทดลองมาล้างในน้ำเกลือหรือ บัฟเฟอร์ปลอดเชื้อ ดองตัวอย่างในน้ำยาประเภทอัลดีไฮด์ หรือ Primary fixation ชนิดอื่น หลังการ ดองล้างด้วยน้ำยาบัฟเฟอร์ชนิดเดียวกับที่ใช้เป็นตัวทำละลายใน fixation ทำการดองในน้ำยาออสเมียม (post fixation)

3.2.12.2 การขจัดน้ำออก (dehydration) และการทำให้แห้ง (drying)

ขจัดน้ำออกโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือ อะซิโตน จากความเข้มข้นขั้นต่ำ (30 %) ไปจนถึงความเข้มข้นสูง (100 %) และทำให้แห้งในอากาศธรรมดาหรือวิธี critical point drying (CPD) วางแผ่นตัวอย่าง บนแผ่นวางตัวอย่าง (specimen stub)

3.2.12.3 การฉาบผิวด้วยโลหะหนัก (metal coating)

นำตัวอย่างที่แห้งแล้ววางลง Stub ใช้กาวเชื่อมผิวล่างของตัวอย่างให้ติดบน stub กาวที่ใช้จะเป็นโลหะผสม หรือสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (conductive agent) เช่น ผงถ่าน เรียกว่า carbon colloidal adhesive การติดตัวอย่างบน stub นี้ เรียกว่า mounting หลังจากนั้น นำตัวอย่างไปฉาบผิวด้วยโมเลกุลของโลหะหนัก (metal coating) เช่น ทองผสมพลาสมาเดียวใน vacuum evaporator หรือ sputtering unit

3.2.12.4 การใช้กล้อง scanning electron microscope (SEM)

- เปิดระบบไฟฟ้าและเปิดสวิตช์ระบบสุญญากาศให้ได้สุญญากาศที่เหมาะสม
- ตรวจสอบสภาพเครื่อง โดยใช้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ(control sample) วางบน stage ภายใน specimen chamber
- เลือก High voltage ที่เหมาะสมหลังจากได้ทำให้มีสุญญากาศที่เหมาะสมแล้วทำให้เกิด electron beam
- ที่กำลังขยาย 1,000-2,000 เท่า เริ่มทำการปรับลำแสง electron และ aperture ให้มีแนวเดียวกัน ขั้นตอนนี้เรียกว่า beam alignment
- แก้ไข astigmatism ที่กำลังขยายสูง(ประมาณ 80,000-100,000 เท่า) จนภาพคมชัด
- ปิด electron beam และ high voltage
- เปลี่ยนตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
- เปิด high voltage และ electron beam
- ตรวจสอบตัวอย่างตามกำลังขยายที่ต้องการ
- เลือกบริเวณตัวอย่างที่ต้องการศึกษาและถ่ายภาพ
- เพิ่มกำลังขยายของภาพที่บริเวณนั้นและทำการ focus ให้ภาพคมชัด

- ลดกำลังขยายลงตามต้องการเพื่อถ่ายภาพ
- เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ลดกำลังขยายของกล้อง(1,000 เท่า) ปิด electron beam และ high voltage ปิดสวิตช์เครื่องเมื่อเสร็จการใช้งาน

3.2.13 วิชาการของปลาที่ได้รับ *Aeromonas hydrophila* และการตรวจเนื้อเยื่อด้วย Immunohistochemistry

สังเกตลักษณะภายนอกและอวัยวะภายในของปลาที่ได้รับเชื้อและตรวจเนื้อเยื่อด้วย Immunohistochemistry โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

3.2.13.1 การเตรียมเนื้อเยื่อทาง histology

- นำตัวอย่างปลาและอวัยวะภายในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อส่วนไขมันและเนื้อเยื่อบุลาไส้ มาแช่ในน้ำยา Davidson's fixative เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ล้างโดยให้น้ำประปาไหลผ่านเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อล้างให้น้ำยาออก
- ขั้นตอนการดึงน้ำออกจากเนื้อเยื่อ (dehydrate) ด้วยแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่างๆกัน ดังนี้ แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 70 % เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 90 % เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % จำนวน 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำออกไปแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % ที่ผสมกับนอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ปริมาณ 1:1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แช่กับนอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แช่ในนอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ที่ผสมกับไซลีน ปริมาณ 1:1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- ขั้นตอนนำสารใหม่เข้ามาแทนที่ (clearing) โดยแช่ไซลีน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ขั้นตอนการแช่ให้แข็งตัว (impregnation) ในพาราพลาสต์ โดยแช่ในไซลีนที่ผสมกับพาราพลาสต์หุลอมเหลวปริมาณ 1:1 เก็บในตู้อบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แช่ในพาราพลาสต์หุลอมเหลว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที
- ขั้นตอนการฝังพาราพลาสต์ (embedding) นำอวัยวะในแต่ละส่วนของปลา จัดเรียงในก้นพิมพ์สี่เหลี่ยม จัดให้อวัยวะอยู่ตรงกลาง จากนั้นเทพาราพลาสต์หุลอมเหลวลงไปให้เต็มพิมพ์ ปิดด้วยกรอบพลาสติกด้านบน ที่ต้องนำไปใช้ในการตัดเนื้อเยื่อด้วยเครื่องมือโครโตม รอยน แข็งตัวจึงแกะพิมพ์ออก

- ขั้นตอนการตัดเนื้อเยื่อ(sectioning) โดยตัดเนื้อเยื่อจากอวัยวะที่ฝังใน พาราพลาสติกด้วยเครื่องมือโครโตมแบบใช้มือหมุน (rotary microtome) ให้แต่ละชิ้นมีความหนา 8 ไมครอน เรียงต่อกัน นำแผ่นเนื้อเยื่อที่ได้มาติดบนสไลด์แก้วที่ผ่านการเคลือบด้วยสารละลายเจลาติน โดยหยดน้ำกลั่นสะอาดลงบนสไลด์ 1 แผ่น ให้พอดีกับขนาดเนื้อเยื่อ 3 ชิ้น จากนั้นนำเนื้อเยื่อลงวางบนหยดน้ำ แล้วนำไปวางบนแท่นอุ่นสไลด์ที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 50 องศาเซลเซียสเพื่อให้เนื้อเยื่อแผ่ขยายจนตั้งเรียบ จากนั้นดูดน้ำออกซับให้แห้ง จะได้เนื้อเยื่อที่ติดตรึงบนสไลด์ แล้วนำไปอบในตู้อบ 40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.2.13.2 กระบวนการย้อมโดยวิธี Indirect peroxidase immunohistochemistry

- ขั้นตอนการเอาพาราพลาสติกออก(deparaffination) โดย นำสไลด์ที่ได้จากขั้นตอนข้างต้น วางบนตะกร้า(slide basket) แช่ในไซลีน 3 ครั้ง ครั้งละ 10, 5 และ 5 นาที
- ขั้นตอนการเติมน้ำเข้าสู่เนื้อเยื่อ (hydration) ด้วยแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่างๆ โดยแช่ในไซลีนที่ผสมนอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 1:1 เป็นเวลา 5 นาที นอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 95 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 90 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 80 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 70 % เป็นเวลา 5 นาที น้ำกลั่น เป็นเวลา 5 นาที สารละลายฟอสฟอไรน ความเข้มข้น 10 % เป็นเวลา 10 นาที ล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
- ขั้นตอนการใส่แอนติบอดีที่ 1 โดยนำสไลด์แต่ละแผ่นมาดูของเหลวส่วนเกินรอบนอกเนื้อเยื่อโดยใช้ปั๊มสูญญากาศ หยดสารละลาย P₁⁺ คลุมแต่ละเนื้อเยื่อด้วยไมโครปิเปต บ่มเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกันการจับกันของโปรตีนแบบไม่จำเพาะ โดยวางสไลด์ในกล่องที่ปิดฝาภายในตู้ด้วยกระดาษทิชชูที่เปียกชื้นเพื่อรักษาความชื้นตลอดเวลา ดูดสารละลาย P₁⁺ ในแต่ละเนื้อเยื่อออก ยกเว้นเนื้อเยื่อที่ 2 ให้เป็นเนื้อเยื่อควบคุม หยดแอนติบอดีที่ 1 ให้คลุมเนื้อเยื่อที่ 1 และ 3 โดยแอนติบอดีที่ใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดี โดยแอนติบอดีทั้งสองชนิดเจือจางด้วยสารละลาย P₁⁺ ปริมาณ 1:5 เก็บในกล่องป้องกันความชื้น นำไปบ่มที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
- ขั้นตอนการใส่แอนติบอดีที่ 2 โดยล้างแอนติบอดีที่ 1 ออกจากเนื้อเยื่อด้วยน้ำกลั่นอย่างรวดเร็ว แช่สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที นำสไลด์แต่ละแผ่นมาดูของเหลวส่วนเกินรอบนอกเนื้อเยื่อโดยใช้ปั๊มสูญญากาศ หยดแอนติบอดีที่ 2 ได้แก่

Goat antimouse IgG heavy และ light chain horseradish peroxidase conjugate(GAM-HRP) ที่เจือจางในสารละลาย P₁⁺ ปริมาณ 1:1000 ในทุกเนื้อเยื่อเก็บในกล่องป้องกันความชื้นนำไปปรมที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

- ขั้นตอนในการใส่ซับสเตรท โดยล้างแอนติบอดีที่ 2 ออกจากเนื้อเยื่อด้วยน้ำกลั่นอย่างรวดเร็ว แช่สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที นำเนื้อเยื่อแต่ละสไลด์มาทำปฏิกิริยากับ 3,3' ไดอะมิโนเบนซิดีนเตตระไฮโดรคลอไรด์(DAB) 0.03 % ปริมาณ 15 มิลลิกรัม และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.006 % ปริมาณ 10 ไมโครลิตร ที่ละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 50 มิลลิตร เป็นเวลา 5 นาที ถึงขั้นนี้เมื่สังเกตเห็นจากกล้องจุลทรรศน์บริเวณที่ให้ผลบวกจะสามารถเห็นเป็นสีน้ำตาล ล้างเนื้อเยื่อด้วยน้ำกลั่น 5 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที

- ขั้นตอนการย้อมสีฮีมาทอกซาลิน (hematoxylin) โดยนำเนื้อเยื่อ 3 แผ่นแรก หรือ 1 ชุด มาย้อมสีฮีมาทอกซาลิน และอีก 1 ชุด ย้อมสีอีโอซินเพียงอย่างเดียว นำเนื้อเยื่อชุดแรกมาย้อมสีฮีมาทอกซาลิน เป็นเวลา 10 นาที แช่เนื้อเยื่อในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.05 % เพื่อล้างสีส่วนเกินออกอย่างรวดเร็ว แช่เนื้อเยื่อในน้ำกลั่น เป็นเวลา 1 นาที แช่เนื้อเยื่อในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 % ให้เนื้อเยื่อที่ได้เป็นสีน้ำเงินจาง แช่เนื้อเยื่อในน้ำกลั่น เป็นเวลา 1 นาที

- ขั้นตอนการดึงน้ำออกจากเนื้อเยื่อ (dehydrate) ด้วยแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่างๆ โดยแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 70 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 80 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 90 % เป็นเวลา 5 นาที เอทิลแอลกอฮอล์ 95 % เป็นเวลา 5 นาที ย้อมสีทับ (counterstain) ในเนื้อเยื่อด้วยอีโอซิน 0.02 % ในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % ล้างสีส่วนเกินออกด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % จากนั้นแช่ในนอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 5 นาที นอร์มัลบิวทิลแอลกอฮอล์ที่ผสมกับไซลีน ปริมาณ 1: 1 เป็นเวลา 5 นาที ไซลีน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที

3.2.13.3 การทำสไลด์ถาวร

แผ่นสไลด์โดยหยดเปอร์เม้าท์ ประมาณ 3 หยดบนสไลด์ นำกระจกสไลด์มาปิดโดยแตะขอบด้านหนึ่งเพียงท่ามุม 45 องศา แล้วค่อยๆวางลงโดยไม่ให้มีฟองอากาศ จากนั้นจึงนำสไลด์เนื้อเยื่อที่ได้มาทำการตรวจหาตำแหน่งการติด *A. hydrophila* ด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตการติดสีน้ำตาลจากปฏิกิริยาของแอนิเมอร์ออกซิเดสในบริเวณต่างๆของเนื้อเยื่อปลา

3.2.14 การวิเคราะห์หากรดแลกติกในส่วนน้ำไซที่ได้จากแลกติกแอซิดแบคทีเรียโดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Lefebvre et al., 2002 และ Staniforth et al., 1999)

3.2.14.1 การเตรียมส่วนไซที่ได้จากแลกติกแอซิดแบคทีเรีย

นำแลกติกแอซิดแบคทีเรียมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 0.4 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำมาปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ด้วยความเร็ว 8,000 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที นำส่วนไซที่ได้มาผ่านแผ่นกรอง (Millipore Membrane Filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร

3.2.14.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแลกติกความเข้มข้นต่างๆ

เตรียมสารละลายกรดแลกติกความเข้มข้น 1.0 มิลลิโมลาร์ จากนั้นทำการเจือจางลำดับส่วนให้มีความเข้มข้นของกรดแลกติกเท่ากับ 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 มิลลิโมลาร์ ตามลำดับ และใช้อาหารเหลว MRS เป็นสารมาตรฐานที่ไม่มีกรดแลกติก

3.2.14.3 สภาวะที่ใช้

โครมาโทกราฟีที่ใช้วิเคราะห์เป็นของบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น ตัวฉีด (injector) รุ่น Shimadzu CTO-2A บีม(pump)วิเคราะห์ของเหลว รุ่น Shimadzu LC-3A ตัวตรวจวัดด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร(210 nm UV Detector) รุ่น LDC analytical Spectro Monitor®4100 คอลัมน์ที่ใช้เป็นแบบ reversed phase MERCK 50942 LiChroCART®C₈ 125-4 ความยาว 12.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร ขนาดอนุภาค(particle size) 5 ไมครอน ตัววิเคราะห์ข้อมูล รุ่น Shimadzu C-R1A chromatopac ตัวชะ(mobile phase) ที่ใช้ คือ กรดฟอสโฟริก(H₃PO₄) pH 2.38 อัตราการไหล(flow-rate) 0.6 มิลลิลิตร/นาที และปริมาตรที่ฉีด 50 ไมโครลิตร

3.2.15 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ (16S ribosomal DNA) ของแบคทีเรีย (Heilig et al.,2002; Kabadjova et al.,2002; Temmerman et al.,2004)

3.2.15.1 การสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอของแบคทีเรีย

เชื้อโคลนีเดี่ยวของแบคทีเรีย ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MRS ปริมาตร 9 มิลลิลิตร แล้วนำไปปั่นที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ถ่ายเชื้อลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ หลอดละ 0.5 มิลลิลิตร นำไปเหวี่ยงด้วยความเร็ว 4,000 g นาน 2 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ล้างตะกอนด้วย NSS 0.85 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) นำไปเหวี่ยงที่สภาวะเดิมอีกครั้ง จากนั้นละลายตะกอนด้วย TE buffer (1.0 mM EDTA; 10 mM Tris-HCl, pH=8.0) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นำไปต้มในน้ำเดือด นาน 15 นาที นำสารละลายที่ได้มาทำการเจือจางด้วย Tris-HCl (10 mM, pH=8) เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตามวิธีของ Araujo et al.,2004

3.2.15.2 การตรวจหาจีโนมิกดีเอ็นเอด้วยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส

เตรียมอะกาโรสเจลเข้มข้น 0.8 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ที่หลอมในกรดอะซิติก เทลงในแม่พิมพ์ซึ่งมีหัวเสียบอยู่ ปล่อยให้อะกาโรสเจลแข็งตัว วางชิ้นอะกาโรสเจลลงในแชมเบอร์เท TBE buffer (1.0 mM EDTA; 10 mM Tris-HCl; 10 mM Boric acid, pH=8.0) ให้ท่วมเหนือผิวหน้าของอะกาโรสเจล ผสมสารละลายดีเอ็นเอกับสีติดตาม นำมาหยดลงในช่องวิ่ง โดยใช้ความเข้มข้นของจีโนมิกดีเอ็นเอที่แตกต่างกันในแต่ละช่องวิ่ง นำเข้าเครื่องอิเล็กโทรโฟเรซิส หลังจากแยกจนสีติดตามเคลื่อนที่ลงมาเกือบถึงขอบล่างเจล ปิดเครื่องแล้วนำอะกาโรสเจลไปย้อมด้วยสารละลายเอทีเดียมโบรไมด์เข้มข้น 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นเวลา 10 นาที ตรวจสอบแถบสีดีเอ็นเอด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต

3.2.15.3 การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อหาอัตราการเจือจางที่เหมาะสมของดีเอ็นเอ

ทำการผสมส่วนประกอบต่างๆ ในหลอด Master mix ดังนี้

1. น้ำกลั่น	46.0	ไมโครลิตร
2. 10X PCR buffer	10.0	ไมโครลิตร
3. สารละลาย dNTP	100.0	ไมโครโมลาร์

4. สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl ₂)	2.0	ไมโครโมลาร์
5. Forward primer 10F 5'-AGTTTGATCCTGGCTC-3'	0.2	ไมโครโมลาร์
6. Reverse primer 1540R 5'-AAGGAGGTGATCCAGCC-3'	0.2	ไมโครโมลาร์

ไมโครโมลาร์

7. Taq DNA polymerase	1.0	หน่วย
8. DNA (ไม่เจือจาง, เจือจาง 10, 100, 1000 เท่า)	2.0	ไมโครลิตร

ปริมาตรรวม 100 ไมโครลิตร แบ่งใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์หลอดละ 25

ไมโครลิตร นำเข้าเครื่อง PCR Thermohybrid PxE 0.2 สภาวะที่ใช้ ดังนี้

Hot start	อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที
Denaturation	อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที
Annealing	อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที
Extension	อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1.30 นาที
Final	อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 7 นาที

ทำการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอทั้งหมด 35 รอบ

3.2.15.4 การแยกดีเอ็นเอด้วยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส

เตรียมอะกาโรสเจลเข้มข้น 1.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ที่หลอมใน TBE buffer เทลงในแม่พิมพ์ซึ่งมีหัวเสียบอยู่ ปลอຍให้อะกาโรสเจลแข็งตัว วางชิ้นอะกาโรสเจลลงในแอมเบอร์ เท TBE buffer ให้ท่วมเหนือผิวหน้าของอะกาโรสเจล ผสมสารละลายดีเอ็นเอกับดีดีตาม หยดลงในช่องวิ่ง โดยใช้ความเข้มข้นของดีเอ็นเอที่แตกต่างกันในแต่ละช่องวิ่ง นำเข้าเครื่องอิเล็กโทรโฟเรซิส หลังจากแยกจนดีดีตามเคลื่อนที่ลงมาเกือบถึงขอบล่างเจล ปิดเครื่องแล้วนำอะกาโรสเจลไปย้อมด้วยสารละลายเอทีเดียมโบรไมด์และตรวจดูแถบดีดีเอ็นเอด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต

3.2.15.5 การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอโดยเทคนิค Polymerase Chain

Reaction (PCR) เพื่อนำดีเอ็นเอไปหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ

ทำการผสมส่วนประกอบต่างๆ ในหลอด Master mix ดังนี้

1. น้ำกลั่น	46.0	ไมโครลิตร
2. 10X PCR buffer	10.0	ไมโครลิตร
3. สารละลาย dNTP	100.0	ไมโครโมลาร์
4. สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl ₂)	2.0	ไมโครโมลาร์

5. Forward primer 10F 5'-AGTTTGATCCTGGCTC-3' 0.2 ไมโครโมลาร์
 6. Reverse primer 1540R 5'-AAGGAGGTGATCCAGCC-3' 0.2 ไมโครโม

ลาร์

7. Taq DNA polymerase 1.0 หน่วย
 8. DNA (เจือจาง 100 เท่า) 2.0 ไมโครลิตร
 ปริมาตรรวม 100 ไมโครลิตร แบ่งใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์หลอดละ 25

ไมโครลิตร นำเข้าเครื่อง PCR Thermohybrid PxE 0.2 สภาวะที่ใช้ ดังนี้

- Hot start อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที
 Denaturation อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที
 Annealing อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที
 Extension อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1.30 นาที
 Final อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 7 นาที
 ทำการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอทั้งหมด 35 รอบ

3.2.15.6 การแยกดีเอ็นเอด้วยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟเรซิส

เตรียมอะกาโรสเจลเข้มข้น 1.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ที่หลอมใน TBE buffer เทลงในแม่พิมพ์ซึ่งมีหัวเสียบอยู่ ปล่อยให้อะกาโรสเจลแข็งตัว วางชิ้นอะกาโรสเจลลงในแชมเบอร์ เท TBE buffer ให้ท่วมเหนือผิวหน้าของอะกาโรสเจล ผสมสารละลายดีเอ็นเอกับสีติดตาม นำมาหยดลงใน 5 ช่องวิ่ง เพื่อให้ได้ดีเอ็นเอปริมาณมากพอที่จะนำไปหาลำดับนิวคลีโอไทด์ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ โดยแบ่ง 4 ช่องวิ่งไว้ไม่ต้องนำไปย้อมสารละลายเอทีเดียมโบรไมด์และตรวจแถบสีด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตเพื่อไม่ให้ดีเอ็นเอถูกทำลาย ส่วนอีก 1 ช่องวิ่งและดีเอ็นเอมาตรฐานให้นำไปย้อมเอทีเดียมโบรไมด์และตรวจหาแถบสีด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดีเอ็นเอของ 4 ช่องวิ่งที่ไม่ได้ทำการย้อม จากนั้นตัดเจลบริเวณเดียวกับที่เกิดแถบสีบน 1 ช่องวิ่งที่ถูกย้อมและบนดีเอ็นเอมาตรฐาน

3.2.15.7 การแยกดีเอ็นเอออกจากอะกาโรสเจลด้วยชุดแยกดีเอ็นเอ

สำเร็จรูป QIA quick® Gel extraction kit

- นำอะกาโรสเจลที่ตัดได้ในข้อ 15.6 มาทำการแยกดีเอ็นเอ ตามขั้นตอน ดังนี้
- ชั่งน้ำหนักอะกาโรสเจล
 - เติม QG buffer ปริมาตร 3 เท่าของน้ำหนักอะกาโรสเจล

- บ่มในอ่างน้ำอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที หรือจนอะกาโรสเจลละลายหมด เชย้าทุก 2-3 นาที
- ปิเปตสารละลายดีเอ็นเอ ปริมาตร 800 ไมโครลิตร ลงใน QIAquick column เหยียงด้วยความเร็ว 13,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที
- ปิเปต QG buffer ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงใน QIAquick column เหยียงด้วยความเร็ว 13,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที
- ปิเปต PE buffer ปริมาตร 0.75 มิลลิลิตร ลงใน QIAquick column เหยียงด้วยความเร็ว 13,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที
- เททิ้งและเหยียงอีกครั้ง
- ย้าย QIA column มาไว้ในหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ใหม่
- ชะดีเอ็นเอด้วย EB buffer ปริมาตร 15 ไมโครลิตร โดยให้ปิเปตลงตรงกลางเยื่อเลือกผ่าน ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 นาที เหยียงด้วยความเร็ว 13,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที ได้สารละลายดีเอ็นเอที่ต้องการ

3.2.15.8 การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ

หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ ที่เตรียมได้จากข้อ 15.7 โดยใช้บริการจากหน่วยบริการชีวภาพ (BIOSERVICE UNIT, BSU) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของแลกดิกแซคไซด์แบบคิรีเรียโดยใช้อิเล็กโตรนิวคลีโอไทด์ไพร์เมอร์ forward และ reverse ดังแสดงในตารางที่ 2 เพื่ออ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอจนครบ 1,500 นิวคลีโอไทด์

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ด้วยโปรแกรม Bioedit และนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ที่มีรายงานไว้ใน Gen Bank โดยโปรแกรม Blast

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2 นิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์ที่ใช้สำหรับหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสโรโบโซมัลดีเอ็นเอ
ของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย

ไพรเมอร์	ลำดับนิวคลีโอไทด์(5'-3')	เอกสารอ้างอิง
10F	AGTTTGATCCTGGCTC	Auburn University Environment Institute, 2002
350F	TACGGGAGGCAGCAG	Weber et al., 2001
1240R	CCATTGTAGCACGTGT	Laurie et al., 2002
1540R	AAGGAGGTGATCCAGCC	Lambert et al., 1998



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว

Lates calcarifer

4.1 คัดแยกแลกดิกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว

ใช้ปลากะพงขาวทั้งหมด 20 ตัว และจากการนับจำนวนแบคทีเรียที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS พบว่า มีจำนวน 9.5×10^6 - 5.5×10^8 เซลล์/กรัมของทางเดินอาหาร เลือกโคโลนีที่มีสีเหลืองและสร้างกรด มาทำการแยกซ้ำจนได้เชื้อที่บริสุทธิ์มาทดสอบการสร้างเอมไซม์อะไมเลส เก็บโคโลนีที่ให้ผลการทดสอบอะไมเลสเป็นลบไว้ในอาหารกึ่งแข็ง MRS โดยเทพาราฟินปิดทับบนผิวหน้าของอาหาร เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถในการเป็นโพรไบโอติกต่อไป จากการทดลองสามารถเก็บแลกดิกแอซิดแบคทีเรียได้ทั้งหมด 74 ไอโซเลต

4.2 คัดเลือกแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ

นำส่วนใสที่ได้จากแลกดิกแอซิดแบคทีเรียในข้อ 1 มาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งปรับ pH ให้เป็น 6.5 อีกส่วนหนึ่งไม่ปรับ pH มาศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อทดสอบ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Vibrio fluvialis* และ *Aeromonas hydrophila* พบว่า มี 5 ไอโซเลต (กำหนดให้เป็น LAB-1 – LAB-5) ที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้โดยส่วนน้ำใสทั้ง 2 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 3

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 ขนาดความกว้างของบริเวณยับยั้งที่เกิดจากเชื้อทดสอบโดยส่วนน้ำใสของ LAB

แลกดิกแอซิด แบคทีเรียที่ได้ ส่วนน้ำใสที่ pH ปกติ และ pH 6.5	บริเวณยับยั้งที่เกิดขึ้นกับเชื้อทดสอบ(มิลลิเมตร)			
	<i>V. paraahaemolyticus</i>	<i>V. vulnificus</i>	<i>V. flurialis</i>	<i>A. hydrophila</i>
LAB-1 pH 4.5	11.0	10.0	10.0	16.5
pH 6.5	0	0	0	13.5
LAB-2 pH 4.5	12.0	10.0	12.0	12.0
pH 6.5	0	0	0	10.0
LAB-3 pH 4.5	12.0	0	0	14.0
pH 6.5	0	0	0	11.0
LAB-4 pH 4.5	0	11.0	11.0	19.5
pH 6.5	0	0	0	11.5
LAB-5 pH 4.5	0	0	0	14.5
pH 6.5	0	0	0	11.0

4.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย

เมื่อได้ LAB-1 – LAB-5 แล้วนำมาทดสอบสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที่ 4-7 จากตารางทั้ง 3 ตารางแสดงให้เห็นว่าทั้ง 5 ไอโซเลต เซลล์ติดสีน้ำเงินของแกรมบวก มีทั้งรูปร่างแท่ง(rod) รูปร่างกลม(cocci) รี(coccobacilli) ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ คะตะเลสและออกซิเดสเป็นลบ ซึ่งเป็นสมบัติเบื้องต้นของแลกดิกแอซิดแบคทีเรีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพและทางชีวเคมีของ LAB-1 – LAB-5

ลักษณะที่ทดสอบ	ผลการทดสอบ				
	LAB-1	LAB-2	LAB-3	LAB-4	LAB-5
Gram's stain	+	+	+	+	+
Shape	แท่ง	แท่ง	กลม	รี	รี
Motile	-	-	-	-	-
Catalase test	-	-	-	-	-
Oxidase test	-	-	-	-	-
Indole test	-	-	-	-	-
Methyl red test	-	-	+	-	-
Voges proskauer test	-	-	-	-	-
Ornithin test	-	-	-	-	-
Citrate test	-	-	-	-	-
Esculin hydrolysis	+	-	+	-	+
Homofermentative	-	-	+	-	+
Heterofermentative	+	+	-	+	-

ตารางที่ 5 การใช้คาร์โบไฮเดรตของ LAB-1 – LAB-5

คาร์โบไฮเดรต	ผลการใช้คาร์โบไฮเดรต				
	LAB-1	LAB-2	LAB-3	LAB-4	LAB-5
Arabinose	-	+	-	-	+
Glucose	+	+	+	+	+
Sucrose	+	+	+	+	+
Mannitol	-	-	+	-	+
Lactose	-	-	+	-	+
Inositol	-	-	-	-	-

ตารางที่ 6 การเจริญของ LAB-1 – LAB-5 ในอาหารที่มีเกลือระดับความเข้มข้นต่างๆ

ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ (% น้ำหนัก/ปริมาตร)	ความสามารถในการเจริญ				
	LAB-1	LAB-2	LAB-3	LAB-4	LAB-5
0	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	+
6	+	+	-	-	+
8	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-

ตารางที่ 7 การเจริญของ LAB-1 – LAB-5 ในอาหารที่มีเกลือระดับความเข้มข้นต่างๆ

ความเข้มข้นเกลืออนัตติ (% น้ำหนัก/ปริมาตร)	ความสามารถในการเจริญ				
	LAB-1	LAB-2	LAB-3	LAB-4	LAB-5
0	+	+	+	+	+
0.1	+	+	-	+	+
0.3	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-
0.7	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-

4.4 การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก(Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว

ทำการวิเคราะห์ระดับโปรตีนและไขมันของส่วนประกอบต่างๆ ในอาหารปลา ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ระดับโปรตีนและไขมันของส่วนประกอบต่างๆในอาหารปลา

ส่วนประกอบ	%โปรตีน	%ไขมัน
ปลาป่น	61.4	8.91
แป้งสาลี	11.53	2.12
กากถั่วเหลือง	44.88	3.15
กลูเตน	79.07	1.63
เปลือกกุ้งป่น	48.67	6.35

จากนั้นคำนวณส่วนประกอบต่างๆ ที่จะใช้ผสมเพื่อให้ได้ระดับโปรตีน 40-45 % และไขมัน 12-18 % จะได้ส่วนประกอบดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ส่วนประกอบของอาหารปลากะพงขาวในการทดลอง

ส่วนประกอบ	%(น้ำหนัก/น้ำหนัก)
ปลาป่น	57
แป้งสาลี	20
เปลือกกุ้งป่น	2
กากถั่ว	4.4
กลูเตน (Wheat gluten)	5
วิตามินรวม	2
แร่ธาตุรวม	2
วิตามินซี (Ascorbic acid)	0.1
น้ำมันทูน่า	6
น้ำมันพืช	1.5
น้ำ	30

การเตรียมอาหารปลาครั้งแรกนี้ อาหารปลาแห้งและแข็งเกินไป เมื่อนำไปให้ปลากินพบว่า ปลากินอาหารที่เตรียมได้ จึงทำการปรับสูตรอาหารโดยเพิ่มปลาเปิดบดลงไปเพื่อเป็นการ

เพิ่มกลิ่นคาวปลาและปรับความชื้นในอาหารให้เหมาะสม โดยได้ส่วนผสมทั้งหมดเหมือนเดิม แต่ลดปริมาณปลาปนลงเหลือ 20 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) แล้วใส่ปลาเปิดบดลงไป 37 % (น้ำหนัก/น้ำหนัก) เมื่อนำไปให้ปลากิน พบว่า ปลากินอาหารได้ดี จึงใช้อาหารที่เตรียมครั้งที่ 2 นี้ตลอดการทดลอง ผลการวิเคราะห์อาหารปลา โดยฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารปลาแบบเปียก (Moist diet)

องค์ประกอบ	ระดับ(%)
ความชื้น	50.28
โปรตีน	21.04
ไขมัน	3.37
เถ้า	5.08
เยื่อใย	1.61
คาร์โบไฮเดรต	18.62

ผลวิเคราะห์อาหารปลาที่แสดงในตารางที่ 10 เป็นผลวิเคราะห์อาหารเปียกซึ่งมีระดับความชื้นประมาณ 50 % เมื่อดำเนินการในรูปอาหารแห้ง พบว่า องค์ประกอบต่างๆในอาหารปลาจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว เนื่องจากในอาหารปลามีความชื้นอยู่ 50.28 %


4.5 การหาค่าความเข้มข้นของเชื้อทดสอบที่ทำให้ปลากะพงขาวตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (Median Lethal concentration; LC_{50})

ปลาที่ใช้ทดสอบนี้อายุ 30 วัน น้ำหนักเฉลี่ย 0.35 กรัม ความยาวเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ตรวจนับจำนวนปลาที่ตายในแต่ละกลุ่มซึ่งมีความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ที่แตกต่างกัน แสดงผลในตารางที่ 11 นำผลไปวิเคราะห์ค่า LC_{50} โดยโปรแกรมโพธิท อะนาลิซิส ได้ค่า LC_{50} ของ *A. hydrophila* เท่ากับ 7.76, 7.47, 7.26 \log_{10} เซลล์/มิลลิลิตร ที่ 72, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลำดับ นับจำนวน *A. hydrophila* จากปลาที่ตายได้ $1.0 \times 10^7 - 1.29 \times 10^8$ เซลล์/มิลลิลิตร

นำ LC_{50} ที่ได้จากการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โพธิทอะนาลิซิส ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์กับเวลาได้ผลดังรูปที่ 2

ตารางที่ 11 จำนวนปลาที่ตายหลังจากเติม *A. hydrophila* ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ใน น้ำเลี้ยงปลา เป็นเวลา 120 ชั่วโมง

<i>A. hydrophila</i> (เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร)	log cell number	N(ตัว)	จำนวนปลาตายสะสม(ตัว)					
			0 ชม.	24 ชม.	48 ชม.	72 ชม.	96 ชม.	120 ชม.
0(ควบคุม)	-	30	0	0	0	0	0	0
7.1×10^6	6.85	30	0	0	0	0	0	0
8.1×10^6	6.91	30	0	0	0	0	0	0
8.2×10^6	6.91	30	0	0	0	0	0	0
4.0×10^7	7.60	30	0	0	0	4	23	30
4.3×10^7	7.63	30	0	0	0	4	25	30
5.4×10^7	7.73	30	0	0	0	6	27	30
1.8×10^8	8.26	30	0	0	29	30	30	30
2.1×10^8	8.32	30	0	0	0	30	30	30
3.0×10^8	8.48	30	0	0	0	30	30	30



รูปที่ 2 ค่า LC₅₀ ของ *A. hydrophila* ที่ทำให้ปลากะพงขาวตายที่เวลาต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ค่า LC_{50} แสดงให้เห็นว่าเมื่อปลาได้รับ *A. hydrophila* ความเข้มข้น $7.76 \log_{10}$ เซลล์/มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง จะทำให้ปลาตาย 50 % ส่วนช่วงเวลาที่ 96 และ 120 นั้นความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ที่จะทำให้ปลาตาย 50 % คือ $7.47, 7.26 \log_{10}$ เซลล์/มิลลิลิตร ตามลำดับ ดังนั้นจึงนำความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ที่ได้จากการทดลองนี้ไปใช้ในการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคในการทดลองขั้นต่อไป

4.6 การผสมแลกดติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้เลี้ยงปลา ในตู้กระจก

เมื่อนำแลกดติกแอซิดแบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลต (LAB-1 – LAB-5) มาผสมกับอาหารปลาให้ได้รับความเข้มข้น 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร ให้เข้ากัน ทำการตรวจหาจำนวนเซลล์ในอาหารปลาทุก 7 วัน เป็นเวลา 28 วัน แสดงผลดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ปริมาณแลกดติกแอซิดแบคทีเรียเฉลี่ยในอาหารปลา (น้ำหนักเปียก)

LAB	ปริมาณเซลล์ใน 1 กรัมอาหาร(น้ำหนักเปียก)				
	วันที่ 0	วันที่ 7	วันที่ 14	วันที่ 21	วันที่ 28
0(ควบคุม)	1.7×10^3	1.5×10^3	1.2×10^3	2.0×10^3	2.1×10^3
1	1.5×10^7	1.3×10^7	1.3×10^6	2.0×10^6	3.5×10^6
2	8.1×10^7	8.0×10^7	1.5×10^7	1.5×10^7	1.5×10^6
3	3.0×10^7	2.6×10^7	1.5×10^7	2.3×10^6	1.8×10^6
4	1.1×10^7	1.0×10^7	1.1×10^7	1.7×10^6	1.2×10^6
5	3.0×10^7	2.8×10^7	2.9×10^7	3.0×10^6	2.5×10^6


4.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจก

นำแลกดติกแอซิดแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* มาผสมในอาหารปลาเพื่อเลี้ยงปลากะพงขาวอายุ 30 วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยทุกๆ 15 วัน จะทำการชั่งน้ำหนัก วัดความยาวของปลาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเลี้ยงปลา พบว่า วันที่ 0 น้ำหนักเฉลี่ยของปลากลุ่ม LAB-2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) กับปลากลุ่ม LAB-3

และ LAB-4 ในด้านของความยาวเฉลี่ย ปลาในกลุ่ม LAB-5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) กับปลากลุ่มควบคุมและกลุ่ม LAB-1 แต่เมื่อเลี้ยงไป 15 วัน น้ำหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาแต่ละกลุ่มจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) และเมื่อเลี้ยงปลาครบ 30 วัน ปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 4 (LAB-4) มีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ยของปลากลุ่มควบคุมและปลากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ความยาวเฉลี่ยของปลากลุ่ม LAB-4 ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลากลุ่มควบคุม, LAB-1, LAB-2, LAB-3 และ LAB-5 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงจากวันที่ 0 และวันที่ 15 น้ำหนักเฉลี่ยของปลาแสดงในตารางที่ 13 และ/หรือ รูปที่ 3 ความยาวเฉลี่ยของปลาแสดงในตารางที่ 14 และ/หรือ รูปที่ 4 เมื่อพิจารณาจำนวนปลาที่รอดชีวิต พบว่า ปลาในกลุ่ม LAB-4 มีจำนวนปลาที่รอดชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จำนวนปลาที่รอดชีวิตแสดงในรูปที่ 5 และผลตรวจคุณภาพน้ำแสดงในตารางที่ 15 ซึ่งสมบัติต่างๆ ของน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะพงขาว ยกเว้นปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างอันตราย จึงได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 50 % ของปริมาตรน้ำในตู้ทุกๆ 2 วัน

ตารางที่ 13 น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* ในตู้กระจก


กลุ่ม	วันที่	น้ำหนักเฉลี่ย(กรัม)		
		0	15	30
ควบคุม		0.58 ^{ab} ± 0.20	0.73 ^a ± 0.31	0.57 ^b ± 0.35
LAB-1		0.60 ^{ab} ± 0.18	0.64 ^a ± 0.36	0.63 ^b ± 0.27
LAB-2		0.74 ^a ± 0.25	0.83 ^a ± 0.21	0.53 ^b ± 0.11
LAB-3		0.48 ^b ± 0.24	0.68 ^a ± 0.31	0.55 ^b ± 0.21
LAB-4		0.54 ^b ± 0.20	0.73 ^a ± 0.35	0.97 ^a ± 0.36
LAB-5		0.67 ^{ab} ± 0.16	0.73 ^a ± 0.24	0.63 ^b ± 0.29




รูปที่ 3 น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* ในตู้กระจก

ตารางที่ 14 ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* ในตู้กระจก

กลุ่ม	วันที่	ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)		
		0	15	30
ควบคุม		$3.19^b \pm 0.24$	$3.63^a \pm 0.26$	$3.82^{ab} \pm 0.60$
LAB-1		$3.29^b \pm 0.51$	$3.54^a \pm 0.46$	$3.65^b \pm 0.57$
LAB-2		$3.44^{ab} \pm 0.52$	$3.87^a \pm 0.37$	$3.88^{ab} \pm 0.32$
LAB-3		$3.36^{ab} \pm 0.52$	$3.67^a \pm 0.52$	$3.68^b \pm 0.43$
LAB-4		$3.46^{ab} \pm 0.49$	$3.90^a \pm 0.58$	$4.18^a \pm 0.60$
LAB-5		$3.67^a \pm 0.20$	$3.78^a \pm 0.36$	$3.81^{ab} \pm 0.42$



รูปที่ 4 ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* ในตู้กระจก




รูปที่ 5 การรอดชีวิตวันที่ 30 ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ ที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* ในตู้กระจก

ตารางที่ 15 คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในตู้กระจก เป็นระยะเวลา 30 วัน

คุณภาพน้ำ	ช่วงค่าคุณภาพน้ำ (ต่ำสุด-สูงสุด)					
	ควบคุม	LAB-1	LAB-2	LAB-3	LAB-4	LAB-5
ไนโตรเจน (mg/l)	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
ไนเตรท (mg/l)	10-20	10-20	10-20	10-20	5-20	10-20
ฟอสเฟต (mg/l)	0.1-0.25	0.1-0.25	0.1-0.25	0.1-0.25	0.1-0.25	0.1-0.25
อุณหภูมิ (°C)	28.5-29.5	28.5-29.5	28.5-29.5	28.5-29.5	28.5-29.5	28.5-29.5
pH	7.7-8.0	7.7-8.0	7.7-8.0	7.7-8.0	7.7-8.0	7.7-8.0
ความเค็ม (ppt)	20	20	20	20	20	20
อัลคาไลน์ (mg/l)	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90	80-90
แอมโมเนีย (mg/l)	0	0	0	0	0	0
ออกซิเจนที่ละลาย ในน้ำ (mg/l)	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0

4.8 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila* ในตู้กระจก

หลังการเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไฮโซเลตต่างๆที่ ให้ผลยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* พบว่า เมื่อเลี้ยงครบ 30 วัน ปลากะพงขาวในกลุ่ม LAB-4 มีจำนวนปลาที่รอดชีวิตสูงสุด มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและดีกว่าปลาในกลุ่มควบคุม ดังนั้นจึงนำปลาในกลุ่ม LAB-4 มาเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* ความเข้มข้นประมาณ 10^7 เซลล์/มิลลิลิตร (ค่า LC_{50} จากข้อ 5) ด้วยวิธีแช่ (Gildberg, 1998; Rengpipat, 1998; Phianphak, 1999) โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า ที่ 24 ชั่วโมง ปลาในกลุ่มควบคุมมีการตายสะสม 37.5 % กลุ่ม LAB-4 มีการตายสะสม 20 % และที่ 48 ชั่วโมง ปลาในกลุ่มควบคุมมีการตายสะสม 100 % ในขณะที่กลุ่ม LAB-4 มีการตายสะสม 30, 40 และ 50 % ที่ 48, 72 และ 96 ชั่วโมง ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 นับจำนวน *A. hydrophila* จากปลาที่ตายได้ $1.3 \times 10^6 - 4.2 \times 10^7$ เซลล์/มิลลิลิตร



รูปที่ 6 ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวนำไปเกิดโรคด้วย *A. hydrophila* หลังการเลี้ยงในตู้กระจก เป็นระยะเวลา 30 วัน

จากการทดลองข้างต้น(ข้อที่ 7 และ 8) จะได้ว่า การเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ(LAB-1, LAB-2, LAB-3, LAB-4 และ LAB-5) ในตู้กระจกซึ่งเป็นระบบการเลี้ยงแบบปิดนั้น ปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 4(LAB-4) สามารถเสริมการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวได้ โดยพิจารณาจากน้ำหนักและความยาวของปลา รวมทั้งสามารถต้านทานโรคที่เกิดจาก *A. hydrophila* ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม ดังนั้น จึงเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 4(LAB-4) มาผสมในอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อนำไปเลี้ยงปลาในกระชังต่อไป โดยจะทำการทดลอง 2 ความเข้มข้น ได้แก่ 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร

4.9 การผสม LAB-4 กับอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้เลี้ยงปลาในกระชัง


นำ LAB-4 มาผสมในอาหารปลาโดยเตรียมทุก 7 วัน ให้ได้ความเข้มข้น 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร ทำการตรวจหาจำนวนเซลล์ในอาหารปลาวันที่ 0 และ 7 พบว่า กลุ่มควบคุมมีแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 1.3×10^3 - 2.1×10^3 เซลล์/มิลลิลิตร และอาหารปลาในกลุ่มทดลองมีความเข้มข้นของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 2.0×10^5 - 6.6×10^5 และ 2.3×10^7 - 4.3×10^7 เซลล์/กรัมอาหาร

4.10 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชัง

เลี้ยงปลากะพงขาวอายุ 60 วัน ด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชังเป็นระยะเวลา 60 วัน โดยแบ่งกระชังออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 กระชัง (ตำแหน่งของกระชังแสดงในภาคผนวก ง. หมายเลข 1) ทำการชั่งน้ำหนัก วัดความยาวของปลา และตรวจสอบคุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ทุก 15 วัน พบว่า วันที่ 0, 15 และ 30 น้ำหนักและความยาวของปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกกลุ่มทดลอง แต่พบว่าวันที่ 45 ของการเลี้ยง ปลาในกลุ่มควบคุมมีน้ำหนักและความยาวมากกว่าปลาในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไฮโซเลตที่ 4 ทั้ง 2 ความเข้มข้น คือ 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร (LAB-4/5 และ LAB-4/7) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) และทั้งน้ำหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) ในทุกกลุ่มทดลองในวันที่ 60 ของการเลี้ยง น้ำหนักเฉลี่ยของปลาแสดงในตารางที่ 16 และ/หรือ รูปที่ 7 ความยาวเฉลี่ยของปลาแสดงในตารางที่ 17 และ/หรือ รูปที่ 8 จำนวนปลาที่รอดชีวิตหลังจากเลี้ยงครบ 60 วัน แสดงดังรูปที่ 9 เห็นได้ว่าปลาทั้ง 3 กลุ่มมีปลาที่รอดชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) และผลตรวจคุณภาพน้ำแสดงในตารางที่ 18 ซึ่งสมบัติต่างๆของน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะพงขาว

ตารางที่ 16 น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชัง

กลุ่ม วันที่	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)				
	0	15	30	45	60
ควบคุม	$3.18^a \pm 1.40$	$3.47^a \pm 1.80$	$8.51^a \pm 5.34$	$24.37^a \pm 14.19$	$42.90^a \pm 2.62$
LAB-4/5	$2.93^a \pm 1.49$	$3.54^a \pm 2.07$	$8.61^a \pm 5.77$	$20.42^b \pm 13.12$	$42.71^a \pm 24.28$
LAB-4/7	$2.85^a \pm 1.25$	$3.97^a \pm 2.79$	$7.91^a \pm 5.24$	$20.18^b \pm 14.00$	$40.97^a \pm 23.45$




รูปที่ 7 น้ำหนักเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชัง


ตารางที่ 17 ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชัง

กลุ่ม วันที่	ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)				
	0	15	30	45	60
ควบคุม	$6.11^a \pm 0.88$	$6.72^a \pm 1.34$	$8.57^a \pm 1.71$	$12.48^a \pm 2.57$	$15.29^a \pm 2.80$
LAB-4/5	$6.18^a \pm 1.08$	$6.56^a \pm 1.22$	$8.47^a \pm 1.70$	$11.55^b \pm 2.58$	$15.21^a \pm 2.86$
LAB-4/7	$6.06^a \pm 0.89$	$6.74^a \pm 1.30$	$8.50^a \pm 1.84$	$11.24^b \pm 2.55$	$14.68^a \pm 2.83$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 8 ความยาวเฉลี่ยของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชัง



รูปที่ 9 การรอดชีวิตวันที่ 60 ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร ในกระชัง


ตารางที่ 18 คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน

คุณภาพน้ำ	ช่วงค่าคุณภาพน้ำ (ต่ำสุด-สูงสุด)		
	ควบคุม	LAB-4/5	LAB-4/7
ไนโตรท์ (mg/l)	0.1-0.3	0.1-0.3	0.1-0.3
ไนเตรท (mg/l)	0.0	0.0	0.0
ฟอสเฟต (mg/l)	0.25-0.50	0.25-0.50	0.25-0.50
อุณหภูมิ (°C)	30.0-32.0	30.0-32.0	30.0-32.0
pH	7.5-8.5	7.5-8.5	7.5-8.5
ความเค็ม (ppt)	4.0	4.0	4.0
อัลคาลินิตี้ (mg/l)	110-150	110-150	110-150
แอมโมเนีย (mg/l)	0.009-0.03	0.009-0.03	0.009-0.03
ออกซิเจนที่ละลาย ในน้ำ (mg/l)	8.50-8.59	8.50-8.59	8.50-8.59


4.11 การทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนียวน้ำให้ เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila*

หลังการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเป็นระยะเวลา 60 วัน นำปลาที่เหลือมาเหนียวน้ำให้
เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* ความเข้มข้นประมาณ 10^7 CFU/ml ด้วยวิธีฉีดเข้าช่องท้อง (Austin,
1995; Nikoskelainen, 2001) โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า ปลาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม, LAB-4/5 และ LAB-4/7 มีจำนวนปลาตายสะสมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
($p > 0.05$) ส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้ฉีด *A. hydrophila* ไม่มีการตาย ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 11

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 10 ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวนำไปเกิดโรคด้วย *A. hydrophila* หลังการเลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน ด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^5 (LAB-4/5) เซลล์/กรัมอาหาร




รูปที่ 11 ปริมาณการตายสะสมของปลากะพงขาวที่เหนียวนำไปเกิดโรคด้วย *A. hydrophila* หลังการเลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 60 วัน ด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ความเข้มข้น 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร

4.12 การตรวจดูแบคทีเรียในทางเดินอาหารปลากะพงขาว โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)


เมื่อนำลำไส้ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วย LAB-4 ทั้ง 2 กลุ่ม (LAB-4/5 และ LAB-4/7) และกลุ่มควบคุม ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า บริเวณเยื่อลำไส้มีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ (villi) ซึ่ง villi เหล่านี้ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร ทำให้ภาพที่เห็นจากกล้องนั้นเป็นด้านบนของ villi แบคทีเรียในทางเดินอาหารของปลาทั้ง 3 กลุ่มมีอยู่น้อยมาก แต่ในกลุ่ม LAB-4/5 และ LAB-4/7 นั้นจะพบกลุ่มของแบคทีเรียรูปร่างรียัดเกาะอยู่บน villi ในขณะที่ไม่พบกลุ่มของแบคทีเรียเหล่านี้ในกลุ่มควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 12a, 12b และ 12c



รูปที่ 12a



รูปที่ 12b



รูปที่ 12c


รูปที่ 12 a-c การยัดเกาะของแบคทีเรียภายในลำไส้ของปลากะพงขาวโดยรูปที่ 12a เป็นลำไส้ของปลากลุ่มควบคุม (ตำแหน่งของลูกศร คือ villi) 12b เป็นลำไส้ของปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียความเข้มข้น 10^5 เซลล์/กรัมอาหาร (LAB-4/5) และ 12c เป็นลำไส้ของปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียความเข้มข้น 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร (LAB-4/7) (ตำแหน่งของลูกศรในรูปที่ 12 b และ c คือ แบคทีเรียที่ยัดเกาะภายในลำไส้ของปลา)

4.13 วิจัยของโรคและการตรวจหา *A. hydrophila* ด้วย Immunohistochemistry

ปลาที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วยวิธีฉีดเข้าช่องท้องจะมีแผลตามลำตัวและมีอาการตกเลือดที่อวัยวะภายใน ส่วนปลาในกลุ่มควบคุมจะไม่มีอาการดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 13




รูปที่ 13a



รูปที่ 13b




รูปที่ 13c




รูปที่ 13d

รูปที่ 13 a-d วิจัยของโรคที่เกิดจากการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* โดยรูป 13a และ 13b เป็นปลาในกลุ่มควบคุม 13c และ 13d เป็นปลาในกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรค(ตำแหน่งลูกศร คือ แผลภายนอกและอาการตกเลือดที่อวัยวะภายใน)


จากนั้นเก็บตัวอย่างปลาที่ตายหลังจากการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* มาตรวจดูพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โดยนำเนื้อเยื่อมาตรวจด้วยแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ (monoclonal antibody) ต่อ *A. hydrophila* พบว่า เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของปลาที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* สามารถตรวจพบบริเวณติดเชื้อซึ่งมีลักษณะสีน้ำตาลในเนื้อเยื่อต่างๆได้ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าปลาที่ตายจากการทดลองนั้นมีสาเหตุมาจาก *A. hydrophila* ดังแสดงในรูปที่ 14.




รูปที่ 14a




รูปที่ 14b




รูปที่ 14c



รูปที่ 14d



รูปที่ 14e



รูปที่ 14f

รูปที่ 14 a-f เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของปลากะพงขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* โดยรูปที่ 14a(AH-44,IgG2a) และ 14b(AH-29,IgG2a)เนื้อเยื่อบริเวณกล้ามเนื้อ(Muscle)ของปลากลุ่มควบคุมและปลากลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย *A. hydrophila* ตามลำดับ หลังการย้อมด้วยอิโซซิน 14c(AH-2,IgG2b)เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(Connective tissue) และเนื้อเยื่อส่วนไขมัน(Adipose tissue) 14d(AH-2,IgG2b)เนื้อเยื่อบริเวณหลอดเลือด(Blood vessel) 14e(AH-2,IgG2b)เนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุลำไส้(Intestinal Epithelium tissue) 14f(AH-2,IgG2b)เนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุลำไส้ที่สามารถมองเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดง(Red Blood Cell) ของกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำหลังการย้อมด้วยฮีมาทอกซิลินและอิโซซิน

4.14 การวิเคราะห์หากรดแล็กติกในส่วนน้ำไอที่ได้จาก LAB-4 โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

จากการทดลองในข้อที่ 3 ทำให้ทราบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ LAB-4 จึงนำคุณสมบัติที่ได้ไปเทียบเคียงกับที่มีรายงานไว้ใน Bergey's Manual of Determinative Bacteriology-9 หลังจากการเทียบเคียงแล้ว พบว่า คุณสมบัติของ LAB-4 นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการระบุสายพันธุ์ของ LAB-4 ในเบื้องต้นนั้นทราบเพียงแต่ว่าเป็นแบคทีเรียในกลุ่มแล็กติก จึงทำการวิเคราะห์ส่วนน้ำไอที่ได้จากการเพาะเลี้ยง LAB-4 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในที่ที่มีปริมาณออกซิเจนจำกัด เพื่อเป็นการตรวจสอบและหาปริมาณของกรดแล็กติกที่ LAB-4 สร้างขึ้น จากผลการทดลอง พบว่า LAB-4 มีการสร้างกรดแล็กติก ความเข้มข้น 730 mM (จากกราฟมาตรฐานสารละลายกรดแล็กติก ภาคผนวก ง. หมายเลข 2)

4.15 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16เอส โรโบโซมัลดีเอ็นเอของ LAB-4

หลังจากที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า LAB-4 สามารถสร้างกรดแล็กติกได้ จึงทำการสกัดและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของ LAB-4 ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใช้นิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งจะได้เป็น PCR product และเมื่อส่ง PCR product ไปวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ 16S ribosomal DNA แล้ว นำลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาเชื่อมต่อกัน ได้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ดังนี้

```
5' CGCTTTGTGGTTCAACTGACTTTGAAGAGCTTGCTCAGATATGACGATGGACATTGC
AAAGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGGGAAACCTACCTCTTAGCAGGGGATA
ACATTTGGAAACAGATGCTAATACCGTATAACAATGACAACCGCATGGTTGTTATTTAA
AAGATGGTTCTGCTATCACTAAGAGATGGTCCC GCGGTGCATTAGCTAGTTGGTAAGG
TAATGGCTTACCAAGGCGATGATGCATAGCCGAGTTGAGAGACTGATCGGCCACAAT
GGGACTGAGACACGGCCCATACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACA
ATGGGCGAAAGCCTGATGGAGCAACGCCGCGTGTGTGATGAAGGGTTTCGGCTCGT
AAAACACTGTTGTAAGAGAAGAATGACATTGAGAGTAACTGTTCAATGTGTGACGGTA
TCTTACCAGAAAGGAACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTTCC
CAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGACGGTTATTTAAGTCTG
AAGTGAAAGCCCTCAGCTCAACTGAGGAATTGCTTTGGAAACTGGATGACTTGAGTG
```

CAGTAGAGGAAAGTGGAAGTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGA
 ACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGTAAGTACGTTGAGGCTCGAAAGTG
 TGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACCGTAAACGATGAGTGCTA
 GGTGTTTGAGGGTTCCGCCCTTAAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCT
 GGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGC
 GGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCCTTATCCAGGTCTTGACAT
 CCCTTGACAACTCCAGAGATGGAGCGTTCCCTTCGGGGACAAGGTGACAGGTGGTG
 CATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCA
 ACCCTTATTACTAGTTGCCAGCATTAGTTGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACA
 AACCGGAGGAAGGTGGGGATGAAGTCAGATCATCATAGCCCCTTATGACATGGGGCT
 ACACACGTAGTCTACAATGGCGATATAACAAGCGACGTTGTCCAACACCGCCGAAGGG
 TGAGCTAATCTCATTAAAGTACGCTCTCAGTTCGGACCGTATGGTTGCAACCTGGCCT
 ACAAGCAATGCTCGGAATGCAGCCTAGTAATACTGCGGATCAGCAGCGCTCGCGGT
 GTATACGTTACCCGGGTGGTTGACTATCACCGTCCTGTCTACATCCACGAGAGCTTT
 GTAACAGCCCAAAGTCCGTTGGGGTTACCCGATCGGGAGCCAGCCGCTTATAAGGT
 GGGACTAGGATG 3'

รูปที่ 15 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ LAB-4

จากนั้นนำไปเทียบเคียงกับลำดับนิวคลีโอไทด์ที่มีรายงานไว้ใน Genbank พบว่า ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มีความคล้ายกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของ *Weissella confusa* โดยมีค่า $E = 0.0$ และ ระดับความคล้าย (Identities) 99 % (ภาคผนวก ง. หมายเลข 3)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

แลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว

Lates calcarifer

5.1 กัดแยกแลกดิกแอซิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารปลากะพงขาว

เมื่อนำทางเดินอาหารส่วนต่างๆ (ลำไส้, กระเพาะ, ไข่แดง) ของปลากะพงขาวทั้ง 20 ตัว จากที่จับได้ในทะเล แหล่งน้ำกร่อยและจากการเพาะเลี้ยงในกระชังมาทำการแยกหาแลกดิกแอซิดแบคทีเรียโดยปลาที่คัดเลือกมานั้นจะมีขนาด 3.0-5.0 กิโลกรัม อายุ 2-3 ปี ซึ่งเป็นช่วงขนาดและอายุของการผสมพันธุ์และวางไข่(สนใจ, 2527) เป็นปลาที่มีสุขภาพดี สังเกตจากลักษณะภายนอกของปลาต้องไม่มีแผล เก็ด็ดไม่หลุด หางไม่เปื่อย ลักษณะการว่ายน้ำของปลาต้องปราศเปรียวว่องไว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของปลากะพงขาว มาแยกหาแลกดิกแอซิดแบคทีเรียบนอาหารแข็ง MRS พบแบคทีเรียจำนวน $9.5 \times 10^6 - 5.5 \times 10^8$ เซลล์/กรัมของทางเดินอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Jankauskiene (1995), Ringo and Gatesoupe (1998) รายงานว่าแลกดิกแอซิดแบคทีเรียหลายสายพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้ของปลาที่มีสุขภาพดี Hagi et al. (2004) ศึกษาสายพันธุ์ของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียในลำไส้ของปลาน้ำจืด 4 ชนิดที่เลี้ยงในบ่อโดยใช้น้ำจากทะเลสาบ Kasumigaura และให้อาหารปลาปกติ (commercial diet) พบว่า สายพันธุ์ของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียจะแตกต่างกันตามฤดูกาลและไม่ขึ้นกับชนิดของปลา กล่าวคือ ในฤดูร้อน (อุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส) พบ *Lactococcus lactis* $9.0 \times 10^5 - 4.8 \times 10^7$ CFU/ กรัมลำไส้ ฤดูหนาว (อุณหภูมิของน้ำ 4-10 องศาเซลเซียส) พบ *Lactococcus raffinolactis* $5.2 \times 10^5 - 3.9 \times 10^6$ CFU/ กรัมลำไส้ ส่วนในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง (อุณหภูมิของน้ำ 13 และ 17 องศาเซลเซียส) ไม่พบว่ามีสายพันธุ์ใดของแลกดิกแอซิดแบคทีเรียที่มีจำนวนสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆอย่างโดดเด่น ในขณะที่จำนวนแบคทีเรียทั้งหมดมี $1.3 \times 10^6 - 1.9 \times 10^9$ CFU/ กรัมลำไส้ เห็นได้ว่าสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่พบในทางเดินอาหารของปลานั้นขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยง ได้แก่ น้ำ อาหาร และกลไกการด้านแบคทีเรียของปลา (Olafsen, 2001; Jankauskiene, 2000a)

5.2 คัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบ

นำแบคทีเรียที่แยกได้มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในปลา ได้แก่ *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Vibrio fluvialis* และ *Aeromonas hydrophila* ด้วยเทคนิค well agar diffusion พบว่า ส่วนน้ำใสของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย มีค่า pH 3.5 - 4.5 ซึ่งมีภาวะเป็นกรดที่สร้างโดยแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จึงทำการปรับ pH ให้ได้ค่าประมาณ 6.5 เพื่อศึกษาความสามารถของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการยับยั้งเชื้อก่อโรคลงจัดอิทธิพลของกรด ส่วนการที่จะระบุประเภทของสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจะต้องทำการศึกษาค่าต่อไป จาก 74 ไอโซเลต พบ 5 ไอโซเลต ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ *A. hydrophila* และพบว่าส่วนน้ำใสของแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่ไม่ได้ผ่านการปรับ pH (pH 3.5-4.5) มีความสามารถในการยับยั้ง *A. hydrophila* มากกว่า (บริเวณใสกว้างกว่า) ส่วนน้ำใสที่ผ่านการปรับ pH เป็น 6.5 เนื่องจากผลของกรดแลคติกร่วมกับสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคประเภทอื่นๆ การคัดเลือกโพรไบโอติกด้วยเทคนิค well agar diffusion นี้เป็นวิธีพื้นฐานที่ทำกันอย่างแพร่หลาย (ฐิติพงศ์, 2538; วรนิภา, 2539; Joseph et al., 1998; วิลาวัลย์, 2543; ศิริเพ็ญ, 2546) ข้อดีของวิธีนี้คือ ง่ายสะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาน้อย ส่วนข้อเสียคือ สารที่ทดสอบต้องมีความสามารถในการยับยั้งสูง เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความไว (sensitivity) สูง ถ้าความเข้มข้นของสารต้านจุลชีพที่อยู่ในส่วนน้ำใสนี้ต่ำ อาจทำให้ไม่เกิดการยับยั้ง หากใช้วิธีนี้ในการคัดเลือกโพรไบโอติกจึงควรลดปริมาณน้ำในส่วนน้ำใสและใช้ส่วนใสที่นำน้ำออกแล้วในปริมาณที่กำหนดไว้ (100 ไมโครลิตร) เพื่อให้สารต้านจุลชีพมีความเข้มข้นมากขึ้น มีรายงานหลายฉบับที่ใช้เทคนิคการคัดเลือกโพรไบโอติกที่แตกต่างจากนี้ ดังเช่น Gibson et al. (1998) ศึกษาความสามารถของ Bacteriocin-like inhibitory substance ที่สร้างจาก *Aeromonas media* A199 ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำและมนุษย์ ด้วยเทคนิค diametric-streak เพื่อดูการเกิดบริเวณยับยั้ง Jacobsen et al. (1999) คัดเลือก *Lactobacillus* spp. 47 สายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในคนในเบื้องต้นทำการทดสอบในระดับหลอดทดลอง (*in vitro*) ด้วยวิธี agar spot เพื่อหา Antimicrobial activity นอกจากนั้นยังทดสอบความสามารถในการเกาะติด ความทนทานต่อ pH และน้ำดี Nikoskelainen et al. (2001) คัดเลือกโพรไบโอติกโดยใช้สมบัติการยึดติดบนเมือก การเกาะทะลุเมือก การยับยั้งการเจริญและการยึดติดของแบคทีเรียก่อโรค ด้วยการติดฉลากสารกัมมันตรังสี [methyl-1,2-³H]thymidine บนแบคทีเรียที่สนใจ นอกจากนี้ยังหาความสามารถในการต้านทานต่อน้ำดีอีกด้วย Villamil et al. (2003) ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคด้วย extracellular products (EPCs) ของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ใน 96-well plate โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อดูเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต

ของแบคทีเรียก่อโรค โดยใช้สมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระดับหลอดทดลอง (*in vitro*) ดังนั้น ควรเพิ่มเกณฑ์ในการคัดเลือก โพรไบโอติก เช่น การทดสอบความสามารถในการเกาะติดกับเยื่อทางเดินอาหารในระดับหลอดทดลอง ความสามารถในการทนเกลือ (NaCl) และเกลือน้ำดี (bile salt) ในภาวะจำลองที่คล้ายคลึงกับภาวะภายในทางเดินอาหารของปลา หรือการใช้เทคนิคต่างๆ มากกว่า 1 เทคนิคในการยืนยันผลการทดสอบ

5.3 ศึกษาสมบัติบางประการของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย

นำ 5 ไอโซเลต ที่ให้ผลยับยั้ง *A. hydrophila* มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมี พบว่า ผลการทดสอบของ 5 ไอโซเลต เป็นแกรมบวก มีทั้งรูปร่างแท่ง (rod), กลม (cocci) และรี (coccobacilli) ไม่เคลื่อนที่ ผลทดสอบกะตะเลสและออกซิเดสเป็นลบ โดยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่มีรายงานไว้ใน Bergey's Manual of Determinative Bacteriology 9th พบว่า สมบัติเหล่านี้เป็นลักษณะของแบคทีเรียกลุ่มแลคติก ส่วนความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรต พบว่า ทั้ง 5 ไอโซเลต สามารถใช้น้ำตาลกลูโคสและซูโครสเป็นแหล่งพลังงานได้ มีบางไอโซเลตที่สามารถใช้น้ำตาลอะราบิโนส, แมนนิทอล และแลกโทสได้ และไม่มีไอโซเลตใดที่สามารถใช้น้ำตาลอินซิทอลได้ นอกจากนี้ยังพบว่าทุกไอโซเลตทนเกลือ (NaCl) ได้ในช่วง 4-6 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) และทนเกลือน้ำดี (bile salt) ได้ 0.1 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ยกเว้น LAB-3 ที่ไม่สามารถทนเกลือน้ำดีได้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ Bergey's Manual of Determinative Bacteriology 9th พบว่า สมบัติของ LAB-4 ยังไม่เพียงพอที่จะระบุสายพันธุ์ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้ การที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์จาก Bergey's Manual of Determinative Bacteriology 9th ได้นั้นอาจเนื่องจากสมบัติทางชีวเคมีชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ทดสอบนั้นน้อยเกินไปและการแบ่งกลุ่มของแบคทีเรียกลุ่มแลคติกนั้นมีการจัดจำแนกใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น ในการหาเอกสารทางวิชาการอ้างอิงเพื่อระบุสายพันธุ์ของแบคทีเรียกลุ่มแลคติกนั้นจึงควรเป็นเอกสารที่มีรายงานในปัจจุบันไม่ควรนำเอกสารเก่าๆ มาใช้อ้างอิง

5.4 การเตรียมอาหารผสมแบบเปียก (Moist Diet) สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว

หลังจากนั้นเตรียมอาหารปลาผสมแบบเปียก (Moist Diet) ให้มีระดับโปรตีน 45-50 % และ ระดับไขมัน 13-18 % (วิเชียร และคณะ, 2532; Catacutan et al., 1997, Boonyaratpalin, 1997; Williams et al., 2003) โดยการเตรียมอาหารปลาครั้งแรกใช้สูตรอาหารของ

Boonyaratpalin, 1997 ซึ่งไม่มีปลาเบ็ดคดเป็นส่วนประกอบ ฝึกให้ปลากินอาหารผสมมี้อละ น้อยๆก่อนโดยให้ร่วมกับปลาเบ็ดคดซึ่งเป็นอาหารเดิมที่ปลากินอยู่ และค่อยๆเพิ่มปริมาณอาหาร ผสมและลดปริมาณปลาเบ็ดคด ปรากฏว่า ปลาไม่ยอมกินอาหารผสม ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย จึง ต้องทำการคัดแปลงสูตรอาหาร โดยเพิ่มปลาเบ็ดคดลงไปในสูตรอาหารด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นกลาว เมื่อ นำมาให้ปลากินปรากฏว่าปลากินได้ดีขึ้นแต่ยังน้อยกว่าการให้อาหารสด (ปลาเบ็ดคด) สาเหตุที่ต้อง ใช้อาหารผสมแบบเปียกเนื่องจากสามารถระบุระดับความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, เถ้า, เยื่อใย และ คาร์โบไฮเดรตที่แน่นอนได้ และจากการวิเคราะห์อาหารผสมแบบเปียก พบว่า ในอาหารปลา 1 กรัม(น้ำหนักเปียก) มีโปรตีน, ไขมันและความชื้น 21.04, 3.37 และ 50.28 % ตามลำดับ ซึ่งเมื่อ คำนวณโปรตีนและไขมัน ในอาหารปลา 1 กรัม(น้ำหนักแห้ง) จะพบว่ามีโปรตีน 42.08 % ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้นและได้โปรตีนในระดับที่ต้องการ ส่วนไขมันมี 6.74 % ซึ่งต่ำกว่าที่ ต้องการ คือ 13-18 % ปลาที่ได้รับไขมันไม่เพียงพอจะแสดงอาการบริเวณครีบและผิวหนัง ตา ผิดปกติ เกิดการช็อก เบื่ออาหาร โดง้ำ คับขวมและอ่อน (Boonyaratpalin, 1997) แต่ปลาที่เลี้ยง ในครั้งนี้ไม่แสดงอาการดังกล่าวอาจเป็นเพราะระยะเวลาที่เลี้ยงสั้น คือ ในตู้กระจก 30 วัน ใน กระชัง 60 วัน และใช้อาหารเดียวกันในทุกกลุ่มทดลอง ข้อเสียของการให้อาหารผสมแบบเปียก คือ อัตราการเจริญเติบโตของปลาจะต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสดและน้ำเสียกว่าอาหารสดที่ปลา มักจะกินหมดในทันที โดยปกติแล้วจะให้อาหารปลา(น้ำหนักแห้ง) 5-10 %ของน้ำหนักปลา (สโมสรคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้อาหารปลาผสม แบบเปียกที่คัดแปลงจาก Boonyaratpalin, 1997 ในการเลี้ยงปลา

5.5 การหาค่าความเข้มข้นที่ทำให้ปลากระพงขาวตาย 50 % (Median Lethal concentration; LC₅₀)

การหาค่า Median lethal concentration(LC₅₀) ของ *A. hydrophila* ต่อปลากระพงขาว โดย ทำการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *A. hydrophila* เป็นแบคทีเรียที่พบได้ในน้ำทั่วไป สัตว์และคนปกติ (เกรียงศักดิ์และคณะ, 2533) มีรายงานว่าพบโรคที่เกิดจาก *A. hydrophila* ทั้งใน สัตว์และคนเป็นครั้งแรกในไทยเมื่อปี 1976 และ อีกครั้งในปี 1979 ความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ในน้ำที่สามารถก่อให้เกิดโรคระบาดในปลา คือ 10³-10⁵ เซลล์/มิลลิลิตร และ Saitanu et al. 1976 รายงานว่า 24 ชั่วโมงหลังจากที่ปลา clariid catfish ได้รับ *A. hydrophila* ความ เข้มข้น 8 x 10⁶ เซลล์ ด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection) จะสร้างสารที่ทำให้

หลอดเลือดของปลาได้รับความเสียหาย (hemorrhagic lesion) (Saitanu, 1986) เกรียงศักดิ์และคณะ, 2533 รายงานค่าความเข้มข้นที่ทำให้ปลาติดเชื้อ 50 % (Infective dose 50 % : ID₅₀) ของ *A. hydrophila* 4 สายพันธุ์ ในปลาคูค้ำและปลาช่อน พบว่า ในปลาทั้ง 2 ชนิดและ *A. hydrophila* ทั้ง 4 สายพันธุ์ มีค่า ID₅₀ อยู่ในช่วง $9.49 \times 10^5 - 5.08 \times 10^8$ จากรายงานต่างๆจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ที่น่าจะทำให้ปลาตาย 50 % (LC₅₀) จะอยู่ในช่วง $10^6 - 10^8$ หรือ 6-8 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร ดังนั้น จึงทำการทดลองโดยใช้ความเข้มข้นของ *A. hydrophila* ในช่วงดังกล่าว พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เหนี่ยวนำด้วยความเข้มข้นของ *A. hydrophila* 6.85 และ 6.91 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร ไม่มีปลาตาย ตลอด 120 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 7.60, 7.63, 7.73, 8.26, 8.32 และ 8.48 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร ปลาตายทั้งหมดที่เวลา 120 ชั่วโมง จึงได้ว่า 7.76, 7.47, 7.26 log₁₀ เซลล์/มิลลิลิตร เป็นค่า LC₅₀ ที่เวลา 72, 96 และ 120 ชั่วโมง ตามลำดับ นำค่า LC₅₀ นี้ ไปใช้ในการทดลองต่อไป ยืนยันสาเหตุการตายของปลาด้วยวิธี plate count พบ *A. hydrophila* $1.0 \times 10^7 - 1.29 \times 10^8$ เซลล์/มิลลิลิตร

5.6 การผสมแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อใช้เลี้ยงปลาในตู้กระจกและกระชัง

การผสมแบคทีเรียในอาหารปลา การทดลองในระดับตู้กระจกใช้อาหารที่ไม่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (กลุ่มควบคุม) และอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียความเข้มข้น 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร (กลุ่มทดลอง LAB 1-5) ทานที่ผสมแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารปลากลุ่มทดลองเรียบร้อยแล้ว (วันที่ 0) ทำการตรวจนับปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารแต่ละกลุ่ม พบว่า ในอาหารกลุ่มควบคุมมีแลคติกแอซิดแบคทีเรียอยู่ 10^3 เซลล์/กรัมอาหาร เนื่องจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติและพบมากในอินทรีย์สาร เช่น พืชที่เน่าเปื่อย ลำไส้หรืออวัยวะขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Sillanpaa, 2001) ดังจะเห็นได้ว่าในอาหารปลาผสมที่ทำการเตรียมขึ้นมานั้นประกอบไปด้วยอินทรีย์สารมากมาย ได้แก่ ปลาเป็ดสดบด ปลาป่น เปลือกกุ้งป่น น้ำมันทูน่า แต่เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS พบว่าแต่ละโคโลนีจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บางโคโลนีมีขนาดใหญ่ ผิวหน้าและขอบเรียบ บางโคโลนีมีขนาดเล็กและขอบหยาบ เป็นต้น และลักษณะของโคโลนีไม่เหมือนกับแลคติกแอซิดแบคทีเรียในกลุ่มทดลอง จึงเชื่อได้ว่าแบคทีเรียที่พบในอาหารกลุ่มควบคุมนั้นไม่ใช่แลคติกแอซิดแบคทีเรียสายพันธุ์เดียวกับกลุ่มทดลองแต่น่าจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆที่มาจากส่วนประกอบต่างๆของอาหาร และเมื่อตรวจนับปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง พบว่า ทุกกลุ่ม

ทดลองที่ให้อาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 1 - 5 (LAB-1, LAB-2, LAB-3, LAB-4 และ LAB-5) มีปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร และลักษณะของโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS เป็นลักษณะเดียวกันทั้งงานเพาะเชื้อ หลังจากนั้นทำการตรวจนับปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารทุก 7 วัน เป็นเวลา 28 วัน พบว่า กลุ่มควบคุมมีปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียเท่าเดิม คือ 10^3 เซลล์/กรัม ตลอด 28 วัน ส่วนในกลุ่มทดลอง วันที่ 7 ปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในทุกกลุ่มทดลองยังคงที่ (เท่ากับวันที่ 0) วันที่ 14 กลุ่ม LAB-1 มีปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารลดลง 1 log cycle ในขณะที่กลุ่มอื่นๆยังคงที่ (เท่ากับวันที่ 0) วันที่ 21 ปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหาร ทุกกลุ่มทดลองลดลง 1 log cycle ยกเว้นกลุ่ม LAB-2 วันที่ 28 ปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียลดลง 1 log cycle ทุกกลุ่มทดลอง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไม่ควรเตรียมอาหารปลาที่ผสมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไว้นานเพราะปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียจะลดลง ดังนั้น เมื่อคัดเลือกได้แล้วว่าจะนำไอโซเลตที่ 4 มาขยายขนาดการเลี้ยงในกระชังเราจึงทำการผสมแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอาหารทุกๆ 7 วัน เพื่อให้ปลาได้รับแลคติกแอซิดแบคทีเรียตามที่ต้องการ และการทดลองในระดับกระชังจะมีอาหาร 3 กลุ่มด้วยกัน คือ อาหารที่ไม่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (กลุ่มควบคุม) อาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียความเข้มข้น 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร (กลุ่ม LAB-4/5 และ LAB-4/7) เมื่อตรวจนับปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในกลุ่มควบคุม พบว่ามีแลคติกแอซิดแบคทีเรียอยู่ 10^3 เซลล์/กรัมอาหาร และในแต่ละงานเพาะเชื้อจะพบลักษณะของโคโลนีแตกต่างกันไป เมื่อตรวจนับปริมาณแลคติกแอซิดแบคทีเรียในกลุ่ม LAB-4/5 และ LAB-4/7 มีปริมาณ 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร ตามลำดับ

5.7 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 30 วัน ในตู้กระจกและการทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila* ในตู้กระจก

เลี้ยงปลากะพงขาวอายุ 30 วัน ในตู้กระจกด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตด้วยความเข้มข้น 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถเสริมการเจริญเติบโตของปลา และต้านทานโรคได้ ชั่งน้ำหนัก วัดความยาวและนับจำนวนปลาที่รอดชีวิตทุก 15 วัน พบว่า น้ำหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาที่นำมาทดลองนั้นในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) เนื่องจากปลากะพงขาวเป็นปลาที่มีการแตกขนาดมากแม้ว่าจะเป็นปลาที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์และเวลาเดียวกันก็ตามและจากการเลี้ยงปลากะพงขาวจะสังเกตเห็นว่า หากปลาตัวไหนมีขนาดใหญ่ก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนตัวเล็กก็จะเล็กจนสังเกตเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน และจากข้อจำกัดด้านจำนวนลูกพันธุ์ปลาที่ซื้อจากฟาร์มทำให้ไม่สามารถคัดขนาดปลาให้มีขนาดใกล้เคียงกันในทุกกลุ่มทดลองได้ แต่เมื่อเลี้ยงปลาไป 15 วัน น้ำหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาในทุกกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน และเมื่อเลี้ยงปลาครบ 30 วัน ปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 4 (LAB-4) มีน้ำหนักและความยาวเพิ่มขึ้นแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) และเมื่อพิจารณาจำนวนปลาที่รอดชีวิต พบว่า ปลาในกลุ่มควบคุมมีการรอดชีวิต 57.5 % ส่วนในกลุ่มทดลอง LAB-1, LAB-2, LAB-3, LAB-4 และ LAB-5 มีปลารอดชีวิต 67.5, 57.5, 62.5, 77.5 และ 60.0 % ตามลำดับ ซึ่งเห็นได้ว่าปลาในกลุ่ม LAB-4 มีปลารอดชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆด้วย ดังนั้น จึงเลือกไอโซเลต LAB-4 นี้ไปเลี้ยงปลาในกระชังต่อไป สาเหตุที่ปลาในกลุ่มควบคุมมีจำนวนปลารอดชีวิตต่ำอาจมาจากอาหารซึ่งปกติแล้วปลากะพงขาวเป็นปลากินเนื้อ (carnivore) กินอาหารสดหรืออาหารที่มีชีวิต คือ ในช่วงของการอนุบาล ปลาจะกิน โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย เมื่อปลาโตขึ้นก็จะกินเศษปลาหรือปลาเบ็ดได้ดี แต่ในงานวิจัยนี้ใช้อาหารผสมแบบเปียกซึ่งมีข้อเสีย คือ ทำให้ปลามีความสามารถในการต้านทานโรคต่ำกว่าปลาที่กินอาหารสด และเมื่อเทียบปริมาณอาหารที่ปลากินก็พบว่าปลาจะกินอาหารสดได้ในปริมาณมากกว่าอาหารผสม ข้อดี คือ สามารถควบคุมระดับของสารอาหารและจำนวนแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้ และโดยทั่วไปแล้วการอนุบาลปลาขนาด 1-2 เซนติเมตร จนถึง 10 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะทำการอนุบาลในกระชังเพราะปลามีอัตราการรอดสูงกว่าการเลี้ยงในบ่อ ด้วยเหตุที่ว่าปลาในกระชังได้อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว การอนุบาลในบ่ออาจเกิดโรคได้ง่ายเพราะปลามักว่ายน้ำไปชนข้างบ่อทำให้เกิดแผลได้ง่าย (สมใจ, 2527) ทำให้ปลาอ่อนแอและตายได้ง่าย จากนั้นนำปลาที่เหลือจากกลุ่มควบคุมและกลุ่ม LAB-4 มาทดสอบความสามารถในการต้านทานโรคด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจาก *A. hydrophila* ด้วยวิธีแช่ (Immersion challenge) พบว่า ที่เวลา 24 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมมีปลาตายสะสม 37.5 % ในขณะที่กลุ่ม LAB-4 มีปลาตายสะสม 20 % ที่เวลา 48 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมมีปลาตายสะสม 100 % กลุ่ม LAB-4 มีปลาตายสะสม 30 % เห็นได้ว่า กลุ่ม LAB-4 สามารถต้านทานโรคได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Nikoskelainen et al., 2001; Villamil et al., 2003 ในด้านคุณภาพน้ำปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับค่อนข้างอันตรายเนื่องจากมีเศษอาหารเหลือในตู้ จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำครั้งละ 50 % ของปริมาตรน้ำในตู้ ทุกๆ 2 วัน ส่วนปริมาณไนเตรท ฟอสเฟต อุณหภูมิ ทีเอช ความเค็ม อัลคาลินิตี แอมโมเนียรวม และออกซิเจนที่ละลายในน้ำนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา

หลังจากการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* ความเข้มข้น 10^7 เซลล์/มิลลิลิตร ด้วยวิธีแช่ในระดับตู้กระจก พบว่า ปลาไม่แสดงอาการจากการติดเชื้อ *A. hydrophila* เราจึงทำการตรวจหา *A. hydrophila* จากปลาที่ตายด้วยวิธี plate count พบ *A. hydrophila* $1.3 \times 10^6 - 4.2 \times 10^7$ เซลล์/มิลลิลิตร

5.8 การเลี้ยงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 60 วัน ในกระชังและการทดสอบความสามารถของปลากะพงขาวในการต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค *Aeromonas hydrophila* รวมทั้งการตรวจดูแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และ Immunohistochemistry

เลี้ยงปลากะพงขาวอายุ 60 วัน ในกระชังด้วยอาหารที่เสริม LAB-4 ด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 2 ความเข้มข้น คือ 10^5 (LAB-4/5) และ 10^7 (LAB-4/7) เซลล์/กรัมอาหาร เป็นระยะเวลา 60 วัน ทุกๆ 15 วัน พบว่า วันที่ 0, 15 และ 30 น้ำหนักและความยาวของปลาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) ในทุกกลุ่มทดลอง แต่พบว่าวันที่ 45 ของการเลี้ยง ปลาในกลุ่มควบคุมมีน้ำหนักและความยาวมากกว่าปลาในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมแลคติกแอซิดแบคทีเรียไอโซเลตที่ 4 ทั้ง 2 ความเข้มข้น คือ 10^5 และ 10^7 เซลล์/กรัมอาหาร (LAB-4/5 และ LAB-4/7) อย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) และทั้งน้ำหนักและความยาวของปลาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) ในทุกกลุ่มทดลองในวันที่ 60 ของการเลี้ยง และสมบัติต่างๆของน้ำเลี้ยงปลาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะพงขาว

ทำการตรวจเยื่อในด้านในของลำไส้ปลาเพื่อดูความสามารถในการเกาะติดเยื่อลำไส้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) พบว่า เยื่อลำไส้มีลักษณะเป็น villi มีกลุ่มของแบคทีเรียที่เกาะอยู่บน villi น้อยแต่สามารถพบกลุ่มแบคทีเรียที่มีลักษณะคล้ายกับ LAB-4 ในลำไส้ปลากลุ่ม LAB-4 ทั้ง 2 ความเข้มข้นแต่ไม่พบแบคทีเรียลักษณะเดียวกันในกลุ่มควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 12 การที่ปลาทั้ง 3 กลุ่มทดลองให้ผลในการเจริญเติบโตและความสามารถในการต้านโรคไม่แตกต่างกันอาจเกิดจากการเลี้ยงปลาในกระชังที่ปักอยู่ในบ่อคินเป็นแบบระบบเปิด แบคทีเรียในน้ำน่าจะมีผลต่อสุขภาพปลามากกว่า LAB-4 ที่เสริมในอาหาร เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของปลาจะมีการเข้า-ออกของน้ำในบ่อเลี้ยงตลอดเวลา หรืออาจเกิดจากการที่ลำไส้ของปลานั้นยาว ทำให้การใช้แบคทีเรียเพียงสายพันธุ์เดียว (monoculture) เพื่อปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร โดยวิธีการผสมแบคทีเรียลงในอาหารนั้น ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพปลาขนาดใหญ่

เมื่อทำการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* ความเข้มข้น 10^7 เซลล์/มิลลิลิตร ด้วยวิธีฉีดเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal injection challenge) พบว่า ปลาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม, LAB-4/5 และ LAB-4/7 มีจำนวนปลาตายสะสมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) ส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้ฉีด *A. hydrophila* ไม่มีการตาย จากนั้นนำเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของปลาที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วย *A. hydrophila* มาตรวจหา *A. hydrophila* โดยใช้เทคนิค Immunohistochemistry พบว่า สามารถตรวจพบ *A. hydrophila* ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของปลาซึ่งมีลักษณะสีน้ำตาลในเนื้อเยื่อต่างๆ การเกิดสีน้ำตาลในเนื้อเยื่อ ดังแสดงในรูปที่ 14

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธีการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคจากวิธีแช่มาเป็นวิธีฉีดเข้าช่องท้องเนื่องจากขนาดของปลาหลังเลี้ยงในกระชังครบ 60 วัน มีน้ำหนักเฉลี่ย 42.21 กรัม ความยาวเฉลี่ย 15.06 เซนติเมตร และเลี้ยงในถังน้ำปริมาตร 100 ลิตร หากเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วยวิธีการแช่จะทำให้ต้องเตรียมเชื้อปริมาณมากจึงเห็นว่าวิธีการฉีดเป็นวิธีที่เหมาะสมกับปลาขนาดของปลาและปลาได้รับเชื้อโดยตรง ปลาที่ได้รับเชื้อจะมีแผลข้างลำตัวและจะมีจ้ำเลือดที่อวัยวะภายใน (Camus et al., 1998; Cipriano, 2001) ดังแสดงในรูปที่ 13 ซึ่งแตกต่างจากการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วยวิธีแช่ซึ่งไม่พบแผลบริเวณลำตัวแต่อวัยวะภายในมีจ้ำเลือด และเมื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของปลาไปตรวจพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อด้วยเทคนิค Immunohistochemistry โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ *A. hydrophila* (AH-2, IgG2b; AH-29, IgG2a และ AH-44, IgG2a) พบว่า สามารถตรวจพบการติด *A. hydrophila* ที่บริเวณต่างๆของเนื้อเยื่อในเนื้อเยื่อของปลาทุกกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคซึ่งมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลในเนื้อเยื่อ วิธี Immunohistochemistry นี้เป็นวิธีเดียวกับ Gildberg et al. ในปี 1998 ใช้ในการยืนยันว่า *Carnobacterium divergens* สามารถเกาะติดในทางเดินอาหารของปลาได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า *C. divergens* มีความสามารถในการเป็นโปรไบโอติก เนื่องจากสามารถตรวจพบ *C. divergens* ได้ในเนื้อเยื่อต่างๆของปลา การยืนยันผลด้วยวิธีนี้มีต้นทุนสูงและผู้ทำต้องมีความชำนาญ ข้อดี คือ มีความถูกต้องสูง

5.9 การวิเคราะห์กรดแลกติกในส่วนน้ำใสที่ได้จาก LAB-4 โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ 16เอสไรโบโซมัล ดีเอ็นเอ ของ LAB-4

ตรวจหาความสามารถในการสร้างกรดแลกติกและหาปริมาณของกรดแลกติกที่สร้างจาก LAB-4 ด้วยเทคนิค HPLC พบว่า หลังการเพาะเลี้ยง LAB-4 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถตรวจพบกรดแลกติกได้ 730 mM ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการระบุว่า LAB-4 เป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างกรดแลก

ดิกอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของแบคทีเรียกลุ่มแลคติกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Staniforth et al., 1998; Lefebvre et al., 2002; Magnusson et al., 2003 ที่ใช้เทคนิค HPLC ในการตรวจหากรดแลคติกในสารตัวอย่าง จากนั้นใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเพื่อวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA ของ LAB-4 แล้วนำไปเปรียบเทียบกับที่มีรายงานไว้ใน Genbank พบว่า ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มีความคล้ายคลึงกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของ *Weissella confusa* โดยมีค่า E = 0.0 และมีระดับความคล้าย (Identities) 99% ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง (Kabadjova et al., 2002; Heilig et al., 2002; Magnusson et al., 2003; Japoni et al., 2004) ปี 2002 Nam et al. รายงานว่า *W. confusa* strain PL9001 มีความสามารถในการยับยั้ง *Helicobacter pylori* ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ สาเหตุของโรกระเพาะอาหารอักเสบและมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยใช้เทคนิคการย้อมสีแกรม (Gram staining) และตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อดูความสามารถในการยึดเกาะของ *H. pylori* บน human gastric-cell line MKN-45 cells หลังบ่มด้วยสารปฏิชีวนะ (amoxicillin) ส่วนน้ำใสของ PL9001 ทั้งที่ปรับ pH และไม่ปรับ pH พบว่า ปริมาณของ *H. pylori* ในกลุ่มที่บ่มด้วยส่วนน้ำใสของ PL9001 ที่ไม่ปรับ pH มีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มที่บ่มด้วยส่วนน้ำใสของ PL9001 ที่ปรับ pH และที่บ่มด้วยสารปฏิชีวนะ ตามลำดับ ดังนั้น *W. confusa* strain PL9001 จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโพรไบโอติกได้

จากผลการทดลองที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า *Weissella* sp. ที่คัดเลือกได้นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากระพงขาว แต่ควรเลี้ยงในระบบปิดที่มีการหมุนเวียนของโพรไบโอติกตลอดเวลาเนื่องจากการให้โพรไบโอติกต่อสัตว์น้ำควรให้อย่างต่อเนื่องและหากจะให้ผลดีควรให้ตั้งแต่วัยอ่อนโดยเสริมลงไปให้อาหาร เช่น ในปลากระพงขาววัยอ่อนจะกินอาหารจำพวกไรดิเฟอร์หรืออาร์ทีเมีย จึงควรเพาะไรดิเฟอร์หรืออาร์ทีเมียที่จะนำไปเลี้ยงปลาด้วยโพรไบโอติกเพื่อให้โพรไบโอติกไปเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในทางเดินอาหาร ทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถยึดเกาะบนเยื่อทางเดินอาหารได้ หากต้องการให้โพรไบโอติกกับปลาในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีระบบทางเดินอาหารยาว น่าจะมีการปรับจากการใช้แบคทีเรียเพียงสายพันธุ์เดียว (monoculture) ในการผสมกับอาหารเลี้ยงปลามาเป็นการใช้แบคทีเรียที่มีสมบัติเป็นโพรไบโอติกหลายๆสายพันธุ์ผสมกัน (cocktail culture) แล้วจึงผสมลงในอาหารเลี้ยงปลาเพื่อไม่เป็นการปรับแบคทีเรียประจำถิ่นในทางเดินอาหารของปลามากเกินไป

รายการอ้างอิง

- กฤษณ์ เสรีรัตน์. 2545. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตปลากะพงขาวในกระชังในจังหวัดสงขลาปีการผลิต 2543. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เกรียงศักดิ์ พูนสุข, นิคม ชัยศิริ, โสมทัต วงศ์สว่าง และ เกรียงศักดิ์ สายธนู. 2533. การศึกษาการก่อโรคของเชื้อ แอร์โร โมนาส ไฮโครฟีลา : 1. ภูมิไวรัสในปลาคุณาด้านและปลาช่อนต่อเชื้อสายพันธุ์ที่มาจากแหล่งต่างๆกัน. ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง, กรมประมง. 2535. ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย. องค์การคำครูสภา.
- จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์, สมภพ รุ่งสุภา, วีรา เกษพุดชา และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต. 2534. การเพิ่มผลผลิตปลากะพงขาวโดยใช้วิธีป้องกันโรคด้วยวัคซีนด้านเชื้อแบคทีเรีย I : ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย. ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จิราภรณ์ โพธิ์เวชกุล. 2546. การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำคืมเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- จิตติพงษ์ ธารวัชการนนท์. 2538. การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมอาหารไก่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ดวงพร คันธโชติ. 2537. อนุกรมวิธานของแบคทีเรียและปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
- ปัญญาธิ ประคองศิลป์. 2541. การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พงษ์เทพ วิไลพันธ์. 2546. แบคทีเรียโอซินจากแบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมอาหาร. วารสารอาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3: 173-180.
- มันสิน ดัฒกุลเวศม์, ไพพรรณ พรประภา. 2539. การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่น. เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

- วรรณิกา เพ็ญนภักดิ์. 2539. การใช้แบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเสริมในอาหารกุ้ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิมล เหมะจันทร์. 2540. ชีววิทยาปลา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
- วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล. 2543. ฤทธิ์ด้านแบคทีเรียของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้านภาคใต้ของไทย. วารสารสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์ 2: 178-189.
- วิเชียร สาคเรศ, มะลิ บุญยรัตนผลิน และ นันทิยา อุ่นประเสริฐ. 2532. ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลากะพงขาว-II. เอกสารวิชาการ. 9/2532 มิถุนายน. สถานีประมงน้ำกร่อย กองประมงน้ำกร่อย กรมประมง.
- วิเศษ ชมเดช และ วิไลวรรณ เหมศิริ. 2529. การเพาะสัตว์น้ำชายฝั่ง. กรมประมง เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง เอกสารประกอบการบรรยาย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศิริเพ็ญ สังข์ชัย. 2546. โพรไบโอติกแบคทีเรียสำหรับเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อป้องกัน *Vibrio harveyi*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมบัติ รักประทานพร. 2542. การเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำ *Penaeus monodon* ด้วยบาซิลลัสสายพันธุ์ S11. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมใจ พงษ์ศักดิ์สถาพร. 2527. ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุภาพร สุกสีเหลือง. 1999. มินิวทยา. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- สโมสรณิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2531. การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว(หลักการและการปฏิบัติ). โครงการหนังสือเผยแพร่ความรู้ทางการประมง.
- Araujo, L.W., Angellis, D.A.D. and Azevedo, L.J. 2004. Direct RAPD evaluation of bacteria without conventional DNA extraction. Brazilian archives of biology and technology 47: 375-380.

- Auburn University Environmental Institute. 2002. Identification of bacteria in the environment[online]. Available from : <http://www.auburn.edu/academic/classes/biol/4600/dale/Lab%20project.htm>
- Austin, B., Stuckey, L.F., Robertson, P.A.W., Effendi, I., and Griffith, D.R.W. 1995. A probiotic strain of *Vibrio alginolyticus* effective in reducing diseases caused by *Aeromonas salmonicida*, *Vibrio anguillarum* and *Vibrio ordalii*. Journal of fish disease 18: 93-96.
- Axelsson, L. 1998. Lactic acid bacteria:classification and physiology. In:Salminen S & von Wright A (eds.) Lactic acid bacteria Microbiology and functional aspects,(pp 1-72) New York : Marcel Dekker.
- Boonyaratpalin, M. 1988. Seabass feed. In:Manual for Training Provincial Fisheries Officers. Prachuab Khiri Khun Coastal Aquaculture Research and Development Center, Thailand, 21 pp. (in Thai).
- Boonyaratpalin, M. 1997. Nutrient requirements of marine food fish cultured in southeast Asia. Aquaculture 151: 283-313.
- Camus, A.C., Durborow, R.M., Hemstreet, W.G., Thune, R.E. and Hawke, P.J. 1998. *Aeromonas* bacterial infections-motile *Aeromonas* septicemia. Southern regional aquaculture center. 478.
- Catacutan, M.R., Coloso, R.M. 1997. Growth of juvenile Asian seabass, *Lates calcarifer*, fed varying carbohydrate and lipid levels. Aquaculture 149: 137-144.
- Christensen, J.E., Dudley, E.G., Pederson, J.A. and Steele, J.L. 1999. Peptidase and amino acid catabolism in lactic acid bacteria. Antonie van Leeuwenhoek 76: 217-246.
- Cipriano, R.C. 2001. *Aeromonas hydrophila* and motile aeromonad septicemias of fish. Fish disease leaflet. 68.
- De Vyust, L. and Vandamme, E.J. 1994. Bacteriocins of Lactic Acid Bacteria, London : Chapman&Hall.
- Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals. Journal Applied Bacteriology 66: 365-378.
- Fuller, R. 1992. Probiotics:The scientific basis. Chapman and Hall, London, England.

- Gatesoupe, F.J. 1999. Review: The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture 180: 147-165.
- Gatesoupe, F.J. 2002. Probiotic and formaldehyde treatments of *Artemia* nauplii as food larval Pollack, *Pollachius pollachius*. Aquaculture 212: 347-360.
- Gibson, L.F., Woodworth, J., and George, A.M. 1998. Probiotic activity of *Aeromonas media* on the Pacific oyster, *Crassostrea gigas*, when challenged with *Vibrio tubiashii*. Aquaculture 169: 111-120.
- Gildberg, A., Mikkelsen, H. 1998. Effects of supplementing the feed to Atlantic cod (*Gadus morhua*) fry with lactic acid bacteria and immuno-stimulating peptides during a challenge trial with *Vibrio anguillarum*. Aquaculture 167: 103-113.
- Gildberg, A., Johansen, A., and Bogwald, J. 1995. Growth and survival of Atlantic salmon *Salmo salar* fry given diets supplemented with fish protein hydrolysate and lactic acid bacteria during a challenge trial with *Aeromonas salmonicida*. Aquaculture 138: 23-34.
- Gilliland, S.E. 1979. Beneficial interrelationships between certain microorganisms and human: candidate microorganism for use or dietary adjunct. Journal Food Protein 42: 164-167.
- Hagi, T., Tanaka, D., Iwamura, Y., and Hoshino, T. 2004. Diversity and seasonal changes in lactic acid bacteria in the intestinal tract of cultured freshwater fish. Aquaculture 234: 335-346.
- Heilig, H.G.H.J., Zoetendal, E.G., Vaughan, E.E., Marteau, P., Akkermans, A.D.L., and M. de Vos, W. 2002. Molecular diversity of *Lactobacillus* spp. and other lactic acid bacteria in the human intestine as determined by specific amplification of 16S ribosomal DNA. Applied and Environmental Microbiology 68: 114-123.
- Holt, J.G., Krieg, N.R., Sneath, P.H.A., Staley, J.T., and Williams, S.T. (eds.). 1994. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology 9th edition. Baltimore London. Williams and Wilkins.
- Jacobsen, C.N., Rosenfeldt Nielsen, V., Hayford, A.E., Moller, P.L., Michaelsen, K.F., Paerregaard, A., Sandstrom, B., Tvede, M., and Jakobsen, M. 1999. Screening of probiotic activities of forty-seven strains of *Lactobacillus* spp. By In vitro techniques and evaluation

- of the colonization ability of five selected strains in humans. Applied and Environmental Microbiology 65: 4949-4956.
- Jankauskiene, R. 1995. The lactoflora on the content of carps intestinal tract. Ecology 1: 59-63.
- Jankauskiene, R. 2000a. Defence mechanisms in fish: *Lactobacillus* genus bacteria of intestinal wall in feeding and hibernating carps. Ecology 1: 3-6.
- Japoni, A., Alborzi, A., Rasouli, M. and Pourabbas, B. 2004. Modified DNA extraction for rapid PCR detection of methicillin-resistant staphylococci. Iranian Biomedical Journal 8: 161-165.
- Jay, J.M. 1982. Antimicrobial properties of diacetyl. Applied Environmental Microbiology 44: 525-532.
- Joseph, P.J., Dave, R.I., and Shah, N.P. 1998. Antagonism between yoghurt bacteria and probiotic bacteria isolated from commercial starter cultures, commercial yoghurts and a probiotic capsule. Food Australia 50(1): 20-23.
- Kabadjova, P., Dousset, X., Cam, V.L., and Prevost, H. 2002. Differentiation of closely related *Carnobacterium* food isolates based on 16S-23S ribosomal DNA intergenic spacer region polymorphism. Applied and Environmental Microbiology 68: 5358-5366.
- Lambert, L.H., Cox, T., Mitchell, K., Rossello-Mora, R.A., Del Cueto, C., Dodge, D.E., Cano, R.J. 1998. *Staphylococcus succinus* sp.nov., isolated from dominican amber. International Journal of Systematic Bacteriology 48: 511-518.
- Laurie, A.A., Jennifer, C., and Michael, T.M. 2002. Photosynthetic and phylogenetic primers for detection of anoxygenic phototrophs in natural environments. Applied and Environmental Microbiology 67: 2922-2926.
- Lefebvre, D., Gabriel, V., Vayssier, Y., and Fontagne-Faucher, C. 2002. Simultaneous HPLC determination of sugars, organic acids and ethanol in sourdough process. Lebensm. Wiss. u. Technology 35: 407-414.
- Mayra-Makinen, A. and Bigret, M. 1993. Industrial use and production of lactic acid bacteria. In S. Saminen and A.V. Wright(eds.), Lactic Acid Bacteria. New York : Marcel Dekker.
- Magnusson, J., Strom, K., Roos, S., Sjogren, J. and Schurer, J. 2003. Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiology Letters 219: 129-135.

- Nam, H., Ha, M., Bae, O. and Lee, Y. 2002. Effect of *Weissella confusa* strain PL9001 on the adherence and growth of *Helicobacter pylori*. Applied and Environmental Microbiology 68: 4642-4645.
- Nikoskelainen, S., Ouwehand, A., Salminen, S., and Bylund, G. 2001. Protection of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) from furunculosis by *Lactobacillus rhamnosus*. Aquaculture 198: 229-236.
- Nikoskelainen, S., Salminen, S., Bylund, G., and OuweHand, A.C. 2001. Characterization of the properties of human – and dairy – derived probiotics for prevention of infectious diseases in fish. Applied and Environmental Microbiology 67: 2430-2435.
- Olafsen J.A. 2001. Interactions between fish larvae and bacteria in marine aquaculture. Aquaculture 200: 223-247.
- Powell, B.D. 2000. The handbook of experimental animal "The laboratory fish". In G. K. Ostrander (ed.), Common diseases and treatment, pp. 79-91. Maryland : Academic Press.
- Ouwehand, A.C., Kirjavainen, P.V., Gronlund, M.-M., Isolauri, E., and Salminen, S.J. 1999. Adhesion of probiotic micro-organisms to intestinal mucus. International Dairy Journal 9: 623-630.
- Phianphak, W., Rengpipat, S., Piyatiratitivorakul, S., and Menasveta, P. 1999. Probiotic use of *Lactobacillus* spp. for black tiger shrimp, *Penaeus monodon*. Journal science research Chulalongkorn university 24: 42-51.
- Rengpipat, S., Phianphak, W., Piyatiratitivorakul, S., and Menasveta, P. 1998. Effect of a probiotic bacterium on black tiger shrimp *Penaeus monodon*. Aquaculture 167: 301-313.
- Ringo, E., Gatesoupe, F.J. 1998. Lactic acid bacteria in fish:a review. Aquaculture 160: 177-203.
- Saitanu, K. 1986. *Aeromonas hydrophila* infections in Thailand. Paper presented at the First Asian Fisheries Forum. Asian Fisheries Society, Manila, Philippines.

- Sillanpaa, J. 2001. Tissue-Adherence in Lactic Acid Bacteria: Identification and Characterization of the Collogen-Binding S-Layer Protein of *Lactobacillus crispatus*. Department of Biosciences Faculty of science University of Helsinki.
- Stanifourth, M., O'Hanlon, M., and Khong, T.M. 1999. Comparative study of lactic acid and polylactides using static headspace, gas chromatography and high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography 833: 195-208.
- Temmerman, R., Huys, G., and Swings, J. 2004. Identification of lactic acid bacteria: culture-dependent and culture-independent methods. Trends in Food Science and Technology 15: 348-359.
- Villamil, L., Figueras, A., Planas, M., and Novoa, B. 2003. Control of *Vibrio alginolyticus* in *Artemia* culture by treatment with bacterial probiotics. Aquaculture 219: 43-56.
- Vine, N.G., Leukes, W.D., and Kaiser, H. 2004. In vitro growth characteristics of five candidate aquaculture probiotics and two fish pathogens grown in fish intestinal mucus. FEMS Microbiology Letters 231: 145-152.
- Weber, S., Stubner, S., and Conrad, R. 2001. Bacteria population colonizing and degrading rice straw in anoxic paddy soil. Applied and Environmental Microbiology 67: 1318-1327.
- Williams, K.C., Barlow, C.G., Rodgers, L., Hockings, I., Agcopra, C., and Ruscoe, I. 2003. Asian seabass *Lates calcarifer* perform well when fed pelleted diets high in protein and lipid. Aquaculture 225: 191-206.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย