

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กจำนวน 21 คน โดยได้ทำการทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest)

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายและนำเสนอ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

ตอนที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

2.2 คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ดูแล ระหว่างก่อน และหลังได้รับ โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว จำแนกตามเพศ

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	ผู้ป่วยชาย (n = 18)		ผู้ป่วยหญิง (n = 3)		รวม (n = 21)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก						
7 ปี	2	9.50	1	4.80	3	14.30
8 ปี	9	42.90	0	.00	9	42.90
9 ปี	7	33.30	2	9.50	9	42.90
การวินิจฉัยโรค						
ADHD	10	47.60	2	9.50	12	57.10
Autistic	8	38.10	0	.00	8	38.10
โรคอื่น ๆ (MR & psychotic)	0	.00	1	4.80	1	4.80
จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล						
น้อยกว่า 10 ครั้ง	10	47.60	0	.00	10	47.60
11-20 ครั้ง	3	14.30	2	9.50	5	23.80
มากกว่า 20 ครั้ง	5	23.80	1	4.80	6	28.60
ระยะเวลาภายใน 1 เดือน แสดงความก้าวร้าวทางพฤติกรรม (ทางคำพูด ร่างกายตนเอง ร่างกายผู้อื่น ทำลายสิ่งของ) จำนวน/ครั้ง						
6 – 18 ครั้ง	7	33.30	0	.00	7	33.30
19 – 31 ครั้ง	9	42.90	3	14.30	12	57.10
32 – 44 ครั้ง	2	9.50	0	.00	2	9.50

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.70 อยู่ในช่วงอายุ 8 ปี ร้อยละ 42.90 มาับการรักษาน้อยกว่า 10 ครั้ง ร้อยละ 47.60 สำหรับเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 9 ปี มามากในช่วง 11 - 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.50 โดยพบว่าภายใน 1 เดือน มีพฤติกรรมก้าวร้าว 19 - 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.10 ทั้งสองมาด้วยโรค ADHD เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.10

ตอนที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาประสบการณ์ในการดูแล และประวัติการถูกทำร้าย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มเป้าหมาย (n = 21)	
	จำนวน	ร้อยละ
เพศของผู้ดูแล		
ชาย	7	33.30
หญิง	14	66.70
อายุของผู้ดูแล		
31 – 43 ปี	14	66.70
44 – 56 ปี	5	23.80
57 – 69 ปี	2	9.50
ระดับการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	17	81.00
ปริญญาตรี	4	19.00
อาชีพ		
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	3	14.30
รับจ้าง	13	61.90
แม่บ้าน	5	23.80
ระยะเวลาประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก		
1-5 ปี	9	42.90
6-10 ปี	12	57.10
ประวัติการถูกผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (ภายในระยะเวลา 2 ปี)		
ไม่เคย	2	9.50
เคย	19	90.50

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มเป้าหมาย (n = 21)	
	จำนวน	ร้อยละ
กรณีที่เคยถูกผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว		
ทางคำพูด	4	19.00
ทางร่างกาย	4	19.00
ทั้งสองอย่าง	13	61.90

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 43 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 61.90 มีระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 6 - 10 ปี มาก คิดเป็นร้อยละ 51.10 และจากประวัติการถูกผู้ป่วยจิตเวชเด็กทำร้ายรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 90.50 โดยแสดงออกทั้งทางคำพูด และทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 61.90

ตอนที่ 2 ส่วนที่ 2 คะแนนการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ดูแล ระหว่างก่อนและหลังจากที่ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กได้รับ โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ดูแล ระหว่างก่อน และหลังได้รับ โปรแกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต (n = 21)

คะแนน กลุ่มทดลอง	ก่อน		หลัง		t - test
	การทดลอง		การทดลอง		
	X	SD.	X	SD.	
การรับรู้ ความสามารถ ของตนเอง	81.76	15.74	93.85	13.43	-2.760*

*p < .05

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ที่ได้รับ โปรแกรมสร้างเสริมความสามารถในการดูแลเด็กของผู้ดูแลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05